

2023 外科护理学理论考核

A1/A2 题型

1.等渗性缺水病人体液的变化特点是() [单选题]。

- A. 细胞内、外液均减少
- B. 细胞内液减少, 细胞外液正常
- C. 细胞外液减少, 细胞内液正常✓
- D. 细胞外液减少, 细胞内液增多
- E. 细胞内液减少, 细胞外液增多

2.若病人出汗湿透一套衬衣裤, 估计其额外失水量约为() [单选题]。

- A. 500ml
- B. 800ml
- C. 1000ml✓
- D. 1500ml
- E. 2000ml

3.为某高渗性缺水病人行补液治疗,首选的液体是() [单选题]。

- A.生理盐水
- B.5%葡萄糖盐水
- C.复方氯化钠溶液
- D. 5%葡萄糖溶液✓
- E.1.25%碳酸氢钠溶液

4.某消化性溃疡合并幽门梗阻病人，自诉四肢软弱无力，测血清钾浓度为 2.6mmol / L，拟给予静脉滴注含钾溶液治疗。要求其每小时尿量不能少于（ ）[单选题]。

A. 20ml

B. 30ml

C.40ml✓

D. 50ml

E. 60ml

5.不属于低钙血症病因的是（ ）[单选题]。

A.甲状旁腺功能亢进✓

B.急性重症胰腺炎

C.消化道瘘

D.降钙素分泌亢进

E.维生素 D 缺乏

6.代谢性酸中毒典型的临床表现是（ ）[单选题]。

A.呼吸深快，呼气时有酮味✓

B.唇干舌燥，眼窝凹陷

C.心率加快，血压下降

D.感觉迟钝，神志不清

E.全身乏力,眩晕

7.与休克代偿期的临床表现不相符的是（ ）[单选题]。

A.烦躁不安

B.尿量减少

C.面色苍白

D.血压下降✓

E.心率加快

8.某休克病人测得 CVP4cmH₂O , BP80 / 60mmHg。正确的处理措施是 () [单选题]。

A.应用血管扩张药

B.应用血管收缩药

C.充分补充液体✓

D.纠正酸中毒

E.应用强心药

9.感染性休克主要的致病因素是 () [单选题]。

A.革兰阳性菌释放的内毒素

B.革兰阴性菌释放的内毒素✓

C.外周血管扩张

D.心脏泵血功能障碍

E.血容量减少

10.利用体质指数判断营养不良的标准是 () [单选题]。

A.小于 16.5kg / m² 为消瘦,大于等于 20kg / m² 为超重

B.小于 18.5kg / m² 为消瘦,大于等于 20kg / m² 为超重

C.小于 18.5kg / m² 为消瘦,大于等于 24kg / m² 为超重✓

D.小于 20.5kg / m² 为消瘦,大于等于 24kg / m² 为超重

E.小于 20.5kg / m² 为消瘦,大于等于 25kg / m² 为超重

11.下列各项关于全胃肠外营养的指征中,不包括 () [单选题]。

- A.短肠综合征
- B.大面积烧伤
- C.急性坏死性胰腺炎
- D.溃疡性结肠炎急性期
- E.肢体外伤性失血✓

12.保持肠内营养喂养管通畅的最有效方法是（ ）[单选题] *

- A.妥善固定、防止扭曲
- B.做好插管长度标记，并班班交接
- C.只用于输注营养液，禁止注入其他药物
- D.使用肠内营养输注泵输入营养液
- E.连续输注过程中每 4 小时以温开水 30ml 冲洗管道✓

13.李先生，72 岁，胃大部切除术后，出现肠内营养不耐受，需进行肠外营养支持。考虑选择输注途径为中心静脉还是周围静脉时，最主要的决定因素是（ ）[单选题] *

- A.病人的经济条件和依从性
- B.病人的基础疾病和手术情况
- C.病人的血管条件
- D.肠外营养的天数和营养素需要量✓
- E.肠外营养的配方

14.冬季，布类物品经高压蒸汽灭菌后，一般可保留（ ）[单选题]。

- A. 3 天
- B. 1 周
- C. 2 周✓

D. 3 周

E. 4 天

15.感染伤口或肛门会阴部皮肤消毒的方法正确的是 () [单选题]。

A 消毒范围在切口周围 10cm

B.延长切口时可不必扩大消毒范围

C.若接触伤口或肛门周围的药液纱布,不可返回消毒✓

D.由内向外涂擦

E.用纱布尽可能多蘸取药液擦拭

16.手术区铺盖无菌布单的正确方法是 () [单选题]。

A.无菌巾先铺相对不洁区或操作者的对侧✓

B 无菌巾铺下后不可由内向外再移动

C.开腹手术的术野区至少铺单 2 层

D.无菌单下垂手术台边缘至少 10cm

E.术中手术巾 (单) 湿透时 , 应尽快结束手术

17.章女士,28 岁,腰麻下行剖宫产术后,护士嘱其去枕平卧,主要目的是 () [单选题]。

A.预防低血压

B.预防头痛✓

C.防止误吸

D.减轻疼痛

E.减少出血

18.王先生,35 岁,硬脊膜外隙麻醉病人,手术过程中突然出现意识不清、血压降低、呼吸急促,并迅速出现昏迷、呼吸心跳停止。应考虑病人出现了 () [单选题]。

- A.大出血
- B.脊髓神经损伤
- C.全脊髓麻醉✓
- D.过敏反应
- E.毒性反应

19.局部麻醉时,可以预防病人出现局麻药毒性反应的措施是() [单选题]。

- A.一次性给足药量
- B.药物直接注入血管
- C.对体弱病人应增加药量
- D.避免麻醉药注射在血流丰富处✓
- E.普鲁卡因中加入大量肾上腺素

20.张女士,50岁,因子宫肌瘤在腰麻下行子宫肌瘤切除术,麻醉过程中出现胸闷,继而心慌、烦躁、恶心呕吐,血压进行性下降,随后出现呼吸困难,心动过缓。应首先考虑为() [单选题]。

- A.注药速度过快
- B.药物剂量过大
- C.麻醉平面过高✓
- D.药物中毒反应
- E.药物过敏反应

21.下列疾病中应行急诊手术的是() [单选题]。

- A 胆囊结石
- A.胰头癌致梗阻性黄疸
- C.胃癌

D.直肠癌

E.乙状结肠癌伴肠梗阻✓

22.最简单而有效的预防术后肺不张的方法是() [单选题]。

A.吸氧

B.应用有效抗生素

C.应用祛痰药物

D.雾化吸入

E.鼓励病人深呼吸、有效咳嗽和咳痰✓

23.下列病人手术时可考虑加用全层腹壁减张缝线的是() [单选题]。

A.血友病

B.糖尿病✓

C.心肌梗死

D.上呼吸道感染

E.高血压

24.危险三角区的疖，挤压后容易导致的严重并发症是(D) [单选题] *

毒血症✓

菌血症

脓毒症

颅内海绵状静脉窦炎

休克

25.口底、颌下及颈部蜂窝织炎的最严重后果是()

全身性感染

呼吸困难、窒息

吞咽困难[单选题] *

D.高热

E.化脓性海绵状静脉窦炎✓

26.破伤风最早出现的临床表现是() [单选题] *

A.苦笑面容

B.呼吸困难

C.张口困难✓

D.颈项强直

E.角弓反张

27.烧伤后 48 小时内发生休克的主要抢救措施是() [单选题]。

A.镇静镇痛

B.应用激素

C.应用抗生素

D.及时清创包扎

E.静脉补液✓

28.控制烧伤全身性感染的关键措施是() [单选题]。

A.及时,足量,快速输液

B.正确处理创面✓

C.早期大剂量应用有效抗生素

D.密切观察病情变化

E.维持病室内适宜的温度和湿度

29.赵先生,火焰烧伤,一手和双足全部烧伤,其面积为() [单选题]。

- A. 8%
- B. 8.5%
- C. 9%
- D. 9.5%✓
- E. 10%

30.确诊恶性肿瘤,最重要的依据是() [单选题]。

- A.症状和体征
- B.有关的化验阳性
- C.B 超检查
- D.CT 检查
- E 病理学检查✓

31.肿瘤根治性手术是指() [单选题]。

- A.肿瘤广泛切除术
- B.肿瘤局部切除术及区域淋巴结的清除术
- C.肿瘤整块切除术及区域淋巴结的清除术✓
- D.受累脏器整个切除及区域淋巴结的清除术
- E.肿瘤及其远处转移灶的广泛切除术及区域淋巴结的清除术

32.心肺移植属于() [单选题]。

- A.单一移植
- B 联合移植✓
- C.多器官移植

D.器官簇移植

E.单独移植

33.按移植物植入的部位分类,肾移植多为() [单选题]。

A.原位移植

B.异位移植✓

C.原位旁移植

D.结构移植

E.联合移植

34.急性排斥反应治疗不彻底或反复发生,可导致() [单选题] *

A.超急性排斥反应

B.加速性急性排斥反应

C.移植物抗宿主

D.慢性排斥反应✓

E.延迟性超急性排斥反应

35.肾移植病人术后 24 小时内最关键的监测指标是() [单选题]。

A.尿量✓

B.营养

C.活动

D.体温

E.睡眠

36.腹腔镜手术时,气腹压力过高时可导致() [单选题]。

A.腹腔内出血

B 腹腔感染

C.高碳酸血症及酸中毒✓

D.吻合口瘘

E.切口裂开

37.枕骨大孔疝不同于小脑幕切迹疝的临床表现是 () [单选题]。

A 头痛剧烈

B. 呕吐频繁

C.意识障碍

D.呼吸骤停出现早✓

E.血压升高,脉缓有力

38.赵女士,43 岁,被汽车撞倒,头部受伤,唤之睁眼,回答问题错误,针刺肢体回缩,其格拉斯哥昏迷评分为 () [单选题]。

A.15 分

B. 12 分

C.11 分✓

D. 8 分

E. 5 分

39.颅底骨折病人忌腰椎穿刺和堵塞耳道是为了防止 () [单选题]。

A.脑疝

B.头痛

C.脑水肿

D.颅内压增高

E.颅内继发感染✓

40.张女士,33岁,头部损伤后,乳突部皮下和咽结膜下有淤血,耳部有脑脊液流出,听力丧失,眩晕。正确的处理是() [单选题]。

A.应用利尿脱水剂

B.给予镇静镇痛药

C.用棉球堵塞外耳道

D.头低足高位卧床休息

E.用生理盐水棉球清洁外耳道✓

41.关于短暂性脑缺血发作的临床特点,错误的是() [单选题]。

A.突然发病

B.可有碎倒

C.持续时间短暂

D.可有眩晕

E.常有后遗症✓

42.观察脑出血病人时,常提示出血已停止的表现是() [单选题]。

A.瞳孔先缩小后散大

B.意识障碍变浅✓

C.血压继续升高

D.呼吸不规则

E.脉搏变慢

43.诊断椎管内肿瘤最有价值的辅助检查方法是() [单选题]。

A.脑脊液检查

B.脊髓 MRI✓

C.脊髓造影

D.脊髓 CT

E.X 线脊柱平片

44.诊断颅内肿瘤首选的辅助检查是 () [单选题]。

A.头部 CT 或 MRI✓

B.颅骨 X 线

C.PET

D.脑脊液检查

E.B 超

45.一侧喉返神经损伤可出现 () [单选题]。

A.音调变低

B.声音嘶哑✓

C.咳嗽反射消失

D.严重呼吸困难

E.失音

46.甲亢术前服用碘剂的作用是 () [单选题]。

A.抑制甲状腺素合成

B.对抗甲状腺素作用

C.促进甲状腺素合成

D.抑制甲状腺素释放✓

E.减少促甲状腺激素分泌

47.护士注意甲状腺切除术后病人发音和吞咽情况是为了评估有无() [单选题]。

- A.伤口出血
- B.神经损伤✓
- C.麻醉清醒
- D.气管塌陷
- E.痰液阻塞

48.乳腺癌最易发生于乳腺的() [单选题]。

- A.外上象限✓
- B.外下象限
- C.内上象限
- D.内下象限
- E.乳头和乳晕区

49.乳腺癌病人出现乳头凹陷的原因是() [单选题]。

- A.肿物压迫
- B.局部皮肤粘连
- C.癌肿侵及乳腺导管✓
- D.癌肿侵及 Cooper 韧带
- E.癌细胞堵塞表浅淋巴管

50.王先生,25岁,被车辆撞击胸部,致胸部损伤,B超示胸腔大量积液,胸腔闭式引流管放置的正确位置是() [单选题]。

- A.锁骨中线第2肋间
- B.锁骨中线第3肋间

C.锁骨中线第 4~5 肋间

D.腋中线和腋后线之间第 6 或第 7 肋间✓

E.腋前线第 6~8 肋间

51.下列胸部损伤类型,可出现胸廓反常呼吸运动的是() [单选题]。

A 开放性气胸

B 闭合性气胸

C.张力性气胸

D.多根多处肋骨骨折✓

E 损伤性血胸

52.慢性脓胸可出现的体征是() [单选题]。

A.肋间隙饱满

B. 叩诊鼓音

C.支气管及纵隔偏向患侧✓

D.支气管及纵隔偏向健侧

E.下胸部叩诊过清音

53.慢性脓胸术后病人的护理措施,正确的是() [单选题]。

A 胸廓成形术后病人易发生大量渗血,需快速输新鲜血液

B 胸膜纤维板剥脱术后病人,不需胸带包扎

C.引流管应选用细管,减少刺激

D.指导病人做腹式深呼吸✓

E.引流管应插入较深的位置

54.李先生,20岁,因肺炎合并右侧脓胸,多次胸腔穿刺,抽出稠厚脓液,发热等感染中毒症状难控制。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267031162025006041>