

临床三基测试题与参考答案

一、单选题（共 84 题，每题 1 分，共 84 分）

1. 护理程序最先在什么时候提出()

- A、1965 年
- B、1959 年
- C、1950 年
- D、1955 年
- E、1977 年

正确答案：D

2. 多发性硬化最主要的临床特点是()

- A、患病前数周或数月多有疲劳、肌肉或关节隐痛,感染、外伤等可为本病诱因
- B、首发症状多为一个或多个肢体麻木无力,单眼或双眼视力减退,甚至失明
- C、可伴发痛性痉挛发作、三叉神经痛、构音障碍、痛性感觉异常
- D、缓解复发性病程,多发性病灶
- E、Charcot 三联症(共济失调、构音障碍、意向性震颤)是本病特征表现

正确答案：D

3. 换药室地面上溅有患者血液,应()

- A、用含氯消毒剂拖洗,然后将拖把丢弃
- B、用干拖把拖净

- C、用含氯消毒剂拖洗,然后将拖把洗净
- D、用含氯消毒剂拖洗,然后将拖把先消毒、再洗净
- E、用湿拖把拖净

正确答案: D

4. 寒性和凉性药物的主要作用是()

- A、温里散寒
- B、回阳救逆
- C、清热泻火
- D、燥湿祛湿
- E、软坚散结

正确答案: C

5. 下列各项检查对诊断 COPD 最有意义的是()

- A、X 线胸片
- B、血常规检查
- C、肺功能
- D、纤维支气管镜
- E、痰细胞学检查

正确答案: C

6. 肝火犯肺属于五行传变中的哪类()

- A、相克
- B、相生
- C、相侮

D、相乘

E、母病及子

正确答案：C

7. 对治疗性沟通的描述正确的是()

A、事先无明确的沟通目标和目的

B、围绕患者的健康问题展开

C、以护士为中心

D、沟通不需要护患双方的自我暴露

E、沟通的发生以人的意志为转移

正确答案：B

8. 缺铁性贫血为()

A、小细胞低色素性贫血

B、大细胞正常色素性贫血

C、正常细胞正常色素性贫血

D、小细胞正常色素性贫血

E、大细胞低色素性贫血

正确答案：A

9. 食管最狭窄处是()

A、食管接贲门处

B、主动脉弓压迫食管左侧壁处

C、食管入口

D、食管通过横膈裂孔处

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267064166164010005>