

2023WORKSUMMARY

# 产科产后出血护理

汇报人：xxx

20xx-03-22

# 目录

CATALOGUE

- 产后出血概述
- 产后出血护理评估
- 急性期护理干预措施
- 康复期护理策略实施
- 并发症预防与处理方案
- 总结反思与持续改进计划

# PART 01



# 产后出血概述

# 定义与分类

## 定义

产后出血是指胎儿娩出后24小时内，yin道分娩者出血量 $\geq 500\text{ml}$ ，剖宫产者出血量 $\geq 1000\text{ml}$ ，是分晚期严重的并发症。

## 分类

根据出血时间可分为早期产后出血和晚期产后出血。早期产后出血发生在胎儿娩出后至产后2小时内，晚期产后出血则发生在产后2小时至24小时内。





# 发病原因及危险因素

## 子宫收缩乏力

是最常见的原因，与产妇精神紧张、产程延长、子宫肌纤维过度伸展等因素有关。

## 胎盘因素

包括胎盘滞留、胎盘植入、胎盘部分残留等，均可影响子宫收缩而导致出血。

## 软产道裂伤

在分娩过程中，由于胎儿过大、急产、手术助产等因素可能导致软产道裂伤而引起出血。

## 凝血功能障碍

产妇若患有全身性出血倾向性疾病，如血小板减少症、再生障碍性贫血等，或因胎盘早剥、羊水栓塞等引起的凝血功能障碍，均可导致产后出血。

# ●●●● 临床表现与诊断依据

## 临床表现

主要为胎儿娩出后yin道大量流血，可伴有头晕、乏力、面色苍白等贫血症状，严重者可出现休克、昏迷等现象。


## 诊断依据

根据产妇病史、临床表现及体格检查，结合辅助检查如血常规、凝血功能检查等，可明确诊断。






# 预防措施重要性



01

## 加强孕期保健


通过孕期保健，及时发现并治疗妊娠合并症及并发症，降低产后出血风险。



02

## 提高分娩质量

加强产程观察，正确处理产程，避免产程延长和急产等现象发生，减少软产道裂伤机会。



03

## 做好产后观察

产后密切观察产妇生命体征及yin道出血情况，及时发现并处理产后出血。



04

## 加强健康教育

提高产妇对产后出血的认识和重视程度，增强自我保健意识和能力。

## PART 02



# 产后出血护理评估



# 产妇基本情况评估

年龄、孕产次、分娩方式  
等基本信息收集。



01

既往病史、手术史、家族  
出血史等了解。



02

药物使用、过敏史及相关  
检查结果分析。



03





# 出血量及速度评估



01

产后出血量的测量与记录，包括称重法、容积法等

02

出血速度的评估，如观察血液颜色、流动速度等。

03

出血原因的初步判断，如子宫收缩乏力、产道裂伤等。



# 生命体征监测与观察

血压、心率、呼吸、  
体温等生命体征的实  
时监测。



尿量、液体出入量的  
记录与分析。



意识状态、皮肤颜色  
及温度等观察。



# 心理状态及需求了解



产妇情绪状态的评估，如是否焦虑、恐惧等。



疼痛程度及镇痛需求的了解与满足。



产妇及家属对产后出血相关知识的认知程度评估。



## PART 03



# 急性期护理干预措施

# 迅速建立静脉通道补液治疗



立即建立两条以上的静脉通道，确保输液、输血通畅。

根据产妇的病情和失血量，合理调整输液速度和输血量，以维持有效的循环血量。



密切观察产妇的生命体征，包括血压、心率、呼吸、体温等指标，及时调整治疗方案。


## 按摩子宫促进宫缩止血操作



在无菌操作下，通过按摩子宫的方式刺激子宫收缩，以达到止血的目的。



按摩时要注意手法和力度，避免过度刺激引起子宫损伤。



同时配合应用宫缩剂等药物，以增强止血效果。



## 遵医嘱应用止血药物和宫缩剂

根据产妇的病情和医嘱，合理应用止血药物和宫缩剂。



宫缩剂包括缩宫素、麦角新碱等，可促进子宫收缩，达到止血的目的。



止血药物包括氨甲环酸、酚磺乙胺等，可有效减少出血量。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/267114012154010001>