

甘肃省徽县整理《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试大全【真题汇编】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 痛风急性发作期选用的抗痛风药物

- A: 别嘌醇
- B: 呋塞米
- C: 阿司匹林
- D: 秋水仙碱

答案：D

2. 雷尼替丁

- A: 可使驾驶员出现定向力障碍
- B: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- C: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- D: 可导致驾驶员多尿或多汗

答案：A

3. 关于现代药学的发展,临床药学阶段的特征是

- A: 以药品工业化生产为中心
- B: 以新药研制为中心
- C: 以促进合理用药为主
- D: 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作

答案：C

4. (2019 年真题) 患者，女，80 岁，高血压病史 28 年，近日自觉感憋气，昨夜出现呼吸困难，不能平躺，喘憋，咳粉红色泡沫样痰，诊断为心力衰竭，应选用的药物是

- A: 氟桂利嗪
- B: 硝酸异山梨酯
- C: 胺碘酮
- D: 呋塞米

答案：D

5. 男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 利伐沙班
- B: 肝素
- C: 氯吡格雷
- D: 华法林

答案：C

6. 阿糖腺苷属于

- A: 抗真菌药
- B: 抗肿瘤药
- C: 抗病毒药
- D: 抗过敏药

答案：C

7. 在中国，具有"规范处方行为和指导合理用药的法规性和专业性文件"属性的药物专著是

- A: 中国药学文摘
- B: 新编药物学

C: 中国国家处方集

D: 国家基本药物处方集

答案: C

8. 亚胺培南

A: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用

B: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫

C: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药

D: 与呋塞米合用可加重肾功能损害

答案: B

9. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

A: 泼尼松

B: 氨茶碱

C: 吗啡

D: 痰液稀释剂

答案: B

10. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 生理盐水

A: DOL

B: NS

C: LD

D: 0

答案: B

11. 丝裂霉素的主要毒副作用是 ()

- A: 出血性膀胱炎
- B: 心脏毒性
- C: 溶血性尿毒症
- D: 肺纤维化

答案：C

12. 有关依从性的说法错误的是

- A: 依从性仅限于药物治疗
- B: 患者如缺乏依从性可能会干扰临床试验结果
- C: 采用缓释或控释制剂给药有利于提高患者的依从性
- D: 药师加强对患者的用药指导可提高其依从性

答案：A

13. 患者，男，72 岁，因病毒性感冒而致发热，体温 39.2℃，伴轻咳、痰多且黏稠。今日“支气管哮喘”宿疾复发。家人前来药店购买对乙酰氨基酚片、右美沙芬片、氨溴索片、沙丁胺醇气雾剂。药师提供的用药指导中，错误的是

- A: 右美沙芬和氨溴索同时服用
- B: 右美沙芬宜睡前服用
- C: 沙丁胺醇气雾剂每次 1~2 喷，第 1 小时内每 20 分钟给药一次，随后调整为每 3~4h 一次
- D: 服药期间禁止饮酒

答案：A

14. 痉挛性便秘

- A: 开塞露
- B: 比沙可啶
- C: 羧甲基纤维素钠

D: 乳果糖

答案: C

15. 评价房颤患者抗凝出血风险的方法是

A: CHA₂-DS₂-VASc 评分

B: FEV₁ 占预计值%

C: HAS-BLED 评分

D: CTP 分级

答案: C

16. 服用他汀类调节血脂药可能导致

A: 血清总胆固醇升高

B: 血白细胞计数降低

C: 血清碱性磷酸酶升高

D: 血清白蛋白升高

答案: C

17. 患者,女,30岁,妊娠7个月,既往有磺胺药过敏史。近日双眼沙眼症状加剧,发痒、分泌物多,有烧灼感。去年曾用酞丁安滴眼液治疗相似症状,疗效较好,今天到药店想再次购买该药。药师给予的用药建议是()

A: 硫酸锌滴眼液

B: 酞丁安滴眼液

C: 利巴韦林滴眼液

D: 磺胺醋酰钠滴眼液

答案: A

18. 吸附力强、可阻止毒物吸收,但是对氰化物无效的洗胃液是

- A: 鸡蛋白
- B: 1%硫酸镁溶液
- C: 药用炭混悬液
- D: 牛奶-水混合液

答案：C

19. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是

- A: 番泻叶
- B: 多库酯
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 硫酸镁

答案：A

20. 除解热镇痛药外，可推荐给长期精神紧张的头痛患者应用的处方药是

- A: 地西泮
- B: 卡马西平
- C: 氟西汀
- D: 谷维素

答案：A

21. 肠外营养 1g 氮能提供的热量是

- A: 9kcal
- B: 7kcal
- C: 3kcal
- D: 4kcal

答案：D

22. 运动员长期使用可促进肌肉发达，但易导致不孕和心脑血管疾病的兴奋剂是

- A: 人促红细胞生成素
- B: 氢氯噻嗪
- C: 苯丙酸诺龙
- D: 可待因

答案：C

23. 苯丙胺类中毒的解救措施不包括

- A: 酸化尿液促进毒物排出
- B: 口服中毒，发生惊厥者催吐、药用炭混悬液洗胃
- C: 严重中毒者可行腹膜透析或血液透析
- D: 如血压明显升高者首选硝苯地平 10mg 舌下含化

答案：B

24. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为（）

- A: 糖耐量异常
- B: 三酰甘油降低
- C: LDL-C 升高
- D: HDL-C 降低

答案：A

25. 可引起粪便红细胞增多的是

- A: 急性胰腺炎
- B: 阻塞性黄疸
- C: 细菌性痢疾
- D: 溶血性黄疸

答案：C

26. 致癌、致畸作用常发生于用药数月或数年后，因此必须

- A: 注意药物的迟发反应
- B: 注意定期监测器官功能
- C: 注意特殊人群用药
- D: 了解患者及家族的过敏史

答案：A

27. (2019 年真题) 患者，女，72 岁，有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频，尿常规检查示大量白细胞，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml，诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑片
- B: 莫西沙星片
- C: 阿莫西林胶囊
- D: 阿奇霉素片

答案：B

28. 若需要 70% 的乙醇 1000ml，现有 95% 的乙醇应如何配制

- A: 取 263.2ml 95% 的乙醇，加 1000ml 水
- B: 取 736.8ml 95% 的乙醇，加 1000ml 水
- C: 取 736.8ml 95% 的乙醇，加水稀释至 1000ml
- D: 取 263.2ml 95% 的乙醇，加水稀释至 1000ml

答案：C

29. 常见老年人 ADR 的药物类别，阿托品、苯海索等致尿潴留

- A: 抗胆碱药
- B: 抗生素
- C: 钙通道阻滞剂

D: β 受体阻断剂

答案：A

30. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A: 复方阿嗟米特肠溶片

B: 胰酶片

C: 胃蛋白酶合剂

D: 莫沙必利

答案：C

31. 应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起的尿常规检查异常是

A: 尿沉渣管型异常

B: 尿沉渣白细胞增多

C: 尿沉渣结晶异常

D: 尿沉渣尿酸盐结晶

答案：A

32. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是由于“药物制剂因素”的是

A: 乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的中枢神经抑制作用

B: 输液中的颗粒物引起肺部异物性肉芽肿

C: 胍乙啶使肾上腺素受体敏感性增强

D: 排钾利尿药增加心脏对强心苷类的敏感性

答案：B

33. 抗真菌药

A: 血红蛋白量增多

- B: 血小板减少
- C: 中性粒细胞减少
- D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：C

34. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度轻度贫血为

- A: 60～90g / L
- B: 90～120g / L
- C: 30～60g / L
- D: 120～160g / L

答案：B

35. 解救氰化物中毒的是

- A: 二巯丁二钠
- B: 单价抗毒血清
- C: 亚硝酸异戊酯
- D: 盐酸戊乙奎醚

答案：C

36. 药师发药时提示患者“不要驾车、操作机器或高空作业等”，针对的药物是

- A: 氯苯那敏
- B: 铋制剂
- C: 氟西汀
- D: 卡托普利

答案：A

37. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

- A: 塞来昔布
- B: 钆贝葡胺
- C: 培高利特
- D: 替加色罗

答案：D

38. 患者，男，46 岁，拟行肠道手术，术前 1 天使用导泻药的方法是()

- A: 50%葡萄糖注射液湿敷
- B: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- C: 50%硫酸镁溶液口服
- D: 5%氯化钙注射液静脉滴注

答案：C

39. 患者女，25 岁，两天前淋雨后开始发热，体温 39.0℃，咳嗽，咳铁锈色黏痰，化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高，诊断为肺炎，经验性抗感染治疗时适宜选用的药物（）

- A: 头孢他啶
- B: 头孢唑林
- C: 阿奇霉素
- D: 阿米卡星

答案：B

40. 可致昏迷及惊厥

- A: 维生素 A
- B: 氯霉素
- C: 抗组胺药

D: 苯妥英钠

答案: C

41. (2017 年真题) 下列药物中适宜在睡前服用的是 ()

A: 辛伐他汀

B: 美洛昔康

C: 泼尼松

D: 多潘立酮

答案: A

42. 患者，男，57 岁，患有冠心病、抑郁症、2 型糖尿病，用药包括二甲双胍、阿托伐他汀、圣约翰草提取物、阿卡波糖、阿司匹林。近日患者在家人陪同下去郊区旅游，日晒后暴露部位的皮肤出现红斑、丘疹，伴灼热、痒痛感，疑与用药有关。最可能引起该过敏反应的药物是

A: 二甲双胍

B: 阿卡波糖

C: 圣约翰草提取物

D: 阿托伐他汀

答案: C

43. 苯二氮

A: 舍曲林

B: 丁螺环酮

C: 阿米替林

D: 艾司唑仑

答案: D

44. 使尿血红蛋白呈阳性的药品是

- A: 两性霉素 B
- B: 阿司匹林
- C: 顺铂
- D: 苯巴比妥

答案：B

45. 对由甲氨蝶呤所引发的贫血者，宜应用的药物是

- A: 富马酸亚铁
- B: 烟酸
- C: 叶酸+维生素 B12
- D: 维生素 B12

答案：C

46. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 1605 中毒
- B: 乐果中毒
- C: 巴比妥类中毒
- D: 3911 中毒

答案：C

47. 可加重帕金森的是

- A: H
- B: 地西泮
- C: 氯苯那敏
- D: 异丙嗪

答案：D

48. 倍他洛尔所致的主要不良反应是

- A: 血钠升高
- B: 支气管痉挛
- C: 外周血肿
- D: 血尿酸升高

答案：B

49. 黄体酮用于排石，属于

- A: 过度治疗用药
- B: 无适应证用药
- C: 超适应证用药
- D: 不合理联合用药

答案：C

50. 典型结核病的临床表现错误的是

- A: 高热
- B: 食欲减退
- C: 乏力
- D: 咳嗽

答案：A

51. 某患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医
- B: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血
- C: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

D: 应注意监测血压变化，防止血压过度降低

答案：C

52. 对缺铁性贫血者应选用

A: 富马酸亚铁

B: 叶酸+维生素 B

C: 维生素 K

D: 甲磺酸去铁胺

答案：A

53. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，Bp108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 硝普钠

B: 西地兰

C: 硝苯地平

D: 多索茶碱

答案：B

54. 患者，女，63 岁，因“突发左上肢麻木，伴头晕 2 小时”入院，诊断为缺血性脑卒中，患者既往有高血压病史 20 年，可选用哪种药物进行溶栓治疗

A: 阿替普酶

B: 巴曲酶

C: 华法林

D: 阿司匹林

答案：A

55. 肿瘤患者在化疗后出现焦虑，可对症给予

- A: 吗啡
- B: 苯海拉明—利多卡因—氢氧化镁铝
- C: 醋酸甲地孕酮—地塞米松
- D: 劳拉西泮

答案：D

56. 可引起 A/G 比值 <1 的是

- A: 各种原因脱水所致的血液浓缩
- B: 摄入不足、消化不良时
- C: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害
- D: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

答案：C

57. 是否通过超链接指明其资料来源，是衡量互联网信息的

- A: 新颖性
- B: 合理性
- C: 权威性
- D: 归因性

答案：D

58. 普通胰岛素的作用峰时为 ()。

- A: 1.5~4 小时
- B: 0.25~0.5 小时
- C: 6~12 小时
- D: 0.6~1.5 小时

答案：A

59. 甲状旁腺素制剂属于

- A: 骨形成刺激剂
- B: 骨吸收抑制剂
- C: 激素替代剂
- D: 促进骨矿化剂

答案：A

60. 长期大剂量应用头孢哌酮治疗慢性感染，需要监测的临床指标是

- A: 血脂
- B: 血压
- C: 凝血功能
- D: 血糖

答案：C

61. 关于胆石症的患者教育，错误的是

- A: 使用抗菌药物
- B: 避免快速减重和不吃早餐
- C: 低胆固醇饮食
- D: 有消化不良症状应做鉴别诊断

答案：A

62. 新生儿血红蛋白(Hb)正常参考区间是

- A: 180~220g / L
- B: 170~200g / L
- C: (5.0~12.0)X10⁹ / L
- D: (15.0~20.0)X10⁹ / L

答案：B

63. 依照药品不良反应程度分级标准，以下属于“中度药品不良反应”的是

- A: 症状不发展
- B: 不良反应症状明显
- C: 一般无需治疗
- D: 重要器官有严重损害

答案：B

64. 患者，男，40岁，体重70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于50ml/min时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐(Cr)130 μmol/L。医师给出的治疗方案是

- A: 不需要调整给药方案
- B: 延长给药间隔时间
- C: 经验剂量的1/2
- D: 经验剂量的3/4

答案：A

65. 患者，男，60岁，身高170cm，体重85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率100次/分、血压160/100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

- A: 140 / 80mmHg
- B: 130 / 80mmHg
- C: 140 / 90mmHg
- D: 150 / 100mmHg

答案：B

66. 减少因人员不足、忙乱无序而带来的调配差错，是针对

- A: 环境整齐、安静
- B: 配备足够的人力
- C: 及时沟通
- D: 规范操作、坚持核对

答案：B

67. HMG-CoA 还原酶抑制剂

- A: 阿昔莫司
- B: 辛伐他汀
- C: 考来烯胺
- D: 吉非贝齐

答案：B

68. 用于缓解胆石症患者疼痛症状的药物是

- A: 头孢曲松与甲硝唑联用
- B: 复方阿嗪米特
- C: 匹维溴铵
- D: 脂肪乳

答案：C

69. 代表乙型肝炎病毒表面抗体的是

- A: HBsAb
- B: HBcAb
- C: HBeAb
- D: HBeAg

答案：A

70. 遭遇蛇类咬伤，最先采取的应急措施是

- A: 就地取材在伤口的远心端捆扎
- B: 用绳索等在伤口的近心端捆扎
- C: 就地取材将伤口捆扎
- D: 用布带等在伤口的近心端 5cm 处捆住

答案：D

71. 能显示药师的文献评价能力和技巧的咨询服务方法步骤是

- A: 对查阅的资料进行评价、分析和整理
- B: 随访工作效果，并建立档案
- C: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- D: 对问题进行确定并归类

答案：A

72. 洋地黄中毒引起的快速性心律失常，首选下列哪种药物

- A: 阿托品
- B: 苯妥英钠
- C: 普鲁卡因胺
- D: 普萘洛尔

答案：B

73. 有关尿液隐血及尿液白细胞的叙述正确的是

- A: 尿液隐血即反映尿液中的血红蛋白和肌红蛋白，正常人尿液中不能测出
- B: 尿液中如混合有 1% 以上的血液时，肉眼可以观察到血尿

C: 白细胞尿中多为炎症感染时出现的嗜酸性粒细胞，已发生退行性改变，又称为脓细胞

D: 正常人的尿液中不含有白细胞

答案：A

74. 流行性结膜炎者宜选用的滴眼液是

A: 磺胺醋酰钠

B: 碘苷

C: 色甘酸钠

D: 维生素 B2

答案：B

75. 患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA) 9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mg tidpo，罗格列酮片 2mg bidpo，甲钴胺片 0.5mg tidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mg bidpo。

A: 门冬胰岛素餐前 30~60min，皮下注射，tid

B: 普通胰岛素餐前 30min，皮下注射，qd

C: 低精蛋白锌胰岛素餐前 30min，皮下注射

D: 甘精胰岛素睡前 30min，皮下注射，qd

答案：D

76. (2015 年真题) 格列齐特片的适宜服药时间是 ()。

A: 清晨

B: 餐中

C: 餐前

D: 餐后

答案：C

77. 以下治疗哮喘疾患的中成药中，不含有麻黄碱成分的是

- A: 防风通圣丸
- B: 止咳定喘膏
- C: 通宣理肺丸
- D: 蛇胆川贝液

答案：D

78. 血小板计数正常值范围是（ /L）

- A: $(150 \sim 200) \times 10^{12}$
- B: $(100 \sim 300) \times 10^9$
- C: $(200 \sim 250) \times 10^{12}$
- D: $(50 \sim 100) \times 10^9$

答案：B

79. 患者，男，身高 180cm，体重 90kg，腰围 100cm，其体重指数(BMI)是()

- A: 20
- B: 27.8
- C: 30.2
- D: 18

答案：B

80. (2019 年真题) 下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 莫沙必利片
- B: 头孢辛酯片
- C: 伊马替尼片
- D: 双氯芬酸钠片

答案：A

81. 关于血清天门冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 天门冬氨酸氨基转移酶（AST）与谷丙转氨酶（GPT）是同一概念
- B: 天门冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能
- C: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT
- D: 天门冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中

答案：D

82. 摄入过多可增加体内血容量，促发充血性心力衰竭或高血压的是

- A: 食盐
- B: 脂肪
- C: 酒
- D: 食醋

答案：A

83. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，X 线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：A

84. 抗蠕虫药不宜长时间应用，如果长时间应用将

- A: 影响糖吸收

- B: 影响糖代谢
- C: 影响脂肪代谢
- D: 影响蛋白代谢

答案：B

85. 患者接受索拉非尼治疗时，药师应重点监测的不良反应是（）

- A: 肝脏毒性
- B: 生殖系统毒性
- C: 肺纤维化
- D: 心脏毒性

答案：B

86. 药师在接受护士用药咨询时，应重点关注的内容是

- A: 注射剂的配制和滴注速度等
- B: 药品经济学知识
- C: 药品的生产厂商和批号
- D: 药物制剂的等效性

答案：A

87. 美国食品药品监督管理局(FDA)根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 氯化钾
- B: 卡马西平
- C: 红霉素
- D: 奥美拉唑

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/267120154000010026>