2024年浙江舟山市岱山医疗健康集团招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、慢性阻塞性肺疾病（COPD）的主要特征是（　　）。

A. 大气道阻塞

B. 小气道阻塞

C. 双肺哮鸣音

D. 桶状胸

E. 胸片示肺野透亮度增加

『正确答案』
B
『答案解析』
COPD系由多种有害因素的长期刺激致终末细支气管远端发生的病变，造成不可逆的小气道阻塞。A项，大气道阻塞见于异物、肿瘤等所导致气流不能进入肺内，与COPD所致的气流呼出不畅相反。C项，双肺哮鸣音虽可见于喘息型慢支，但更多见于支气管哮喘。D项，桶状胸见于严重肺气肿患者，亦可发生于老年或矮胖体型者。E项，胸片示肺野透亮度增加仅能提示肺气肿的存存。

2、患者，女性，33岁，恶心呕吐，体重下降半年。查体：血压90/60mmHg，皮肤色泽暗黑，口腔粘膜、舌可见黑色素沉着，化验：血糖3.0mmol/L，血钠120mmol/L，血钾5.8mmol/L。你认为此病人最可能的诊断是（　　）。

A. 溃疡病

B. 肝硬化

C. 慢性肾上腺皮质功能减退症

D. Cushing病

E. 胰岛细胞瘤

『正确答案』
C
『答案解析』
暂无解析。

3、下列选项中不属于常见的急性二尖瓣关闭不全病因的是（　　）。

A. 感染性心内膜炎

B. 急性心肌梗死

C. 心脏瓣膜手术

D. 扩张型心肌病

E. 二尖瓣置换术后

『正确答案』
D
『答案解析』
二尖瓣关闭不全病因可分为急性和慢性。急性病因为：①瓣叶瓣环：感染性心内膜炎、外伤、人工瓣周漏等；②腱索乳头肌：腱索断裂、感染性心内膜炎或慢性瓣膜病变所致、心肌梗死并发乳头肌功能不全或断裂等。慢性病因为：①瓣叶瓣环：风湿性、黏液性变性、瓣环钙化、结缔组织疾病、先天性二尖瓣裂等；②腱索乳头肌：瓣膜脱垂、乳头肌功能不全等；③心肌：扩张型心肌病、梗阻性肥厚型心肌病、冠心病室壁瘤等。D项，扩张型心肌病是由于左心室逐渐扩大导致的二尖瓣相对关闭不全，不属于急性二尖瓣关闭不全范畴。

4、左向右分流型的先天性心脏病是（　　）。

A. 动脉导管未闭

B. 肺动脉狭窄

C. 主动脉缩窄

D. 右位心

E. 大血管错位

『正确答案』
A
『答案解析』
左向右分流型（潜在青紫型）正常时由于体循环压力高于肺循环，左心的压力高于右心，故血从左向右分流而不出现青紫。当肺循环压力超过体循环时，右心的压力超过动脉高压则永久性青紫。常见有房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭。

5、生物转化的类型中，属于第二相反应的是（　　）。

A. 氧化反应

B. 还原反应

C. 水解反应

D. 结合反应

E. 脱羧反应

『正确答案』
D
『答案解析』
暂无解析。

6、主动脉瓣狭窄患者最重要的体征是主动脉瓣区（　　）。

A. 收缩期喷射性杂音

B. 收缩期叹气样杂音

C. 舒张期喷射性杂音

D. 舒张期隆隆样杂音

E. 舒张期叹气样杂音

『正确答案』
A
『答案解析』
主动脉瓣狭窄患者最重要的体征是胸骨右缘第2肋间可听到粗糙、响亮的喷射性收缩期杂音，呈先递增后递减的菱形，第一心音后出现，收缩中期达到最响，以后渐减弱，主动脉瓣关闭（第二音）前终止；常伴有收缩期震颤。

7、对慢性失眠症的治疗，不正确的是（　　）。

A. 强调定时作息

B. 入夜后避免兴奋

C. 入夜后避免用浓茶、咖啡

D. 应该躺着阅读书刊

E. 尽量改善周围环境

『正确答案』
D
『答案解析』
慢性睡眠障碍的治疗主要是调整生活作息，改变不良习惯为主的治疗方式，睡前应该是减少刺激。而睡前卧床阅读是一种不良的睡眠习惯，会延长入睡时间，并使大脑处于兴奋状态。故本题答案为D项。

8、动脉血气分析结果符合早期换气功能衰竭的是（　　）。

A. PaO_2 50mmHg，$PaCO_2$ 60mmHg

B. PaO_2 80mmHg，$PaCO_2$ 45mmHg

C. PaO_2 50mmHg，$PaCO_2$ 35mmHg

D. PaO_2 35mmHg，$PaCO_2$ 27mmHg

E. PaO_2 80mmHg，$PaCO_2$ 60mmHg

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/268063134003006042