

2023-2024 年湖北省蕲春县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试及完整答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 归属专业学术机构网站的是

A: www.cmt.tom.cn

B: www.ashp.org

C: [www.google](http://www.google.com)

D: www.merck.com

答案：B

2. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系)，铁缺乏时铁剂的吸收率可达

A: 10%~20%

B: 20%~40%

C: 15%~20%

D: 20%~60%

答案：D

3. 孕妇用药应该格外谨慎，在不同孕期药物对胚胎和胎儿的影响不同，一般情况下，用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

A: 21 天之内

B: 3 个月之后

C: 18 天之内

D: 28 天之内

答案：C

4. (2017 年真题) 高血压伴高钾血症患者慎用的药物是 ()

- A: 氨氯地平
- B: 氢氯噻嗪
- C: 依那普利
- D: 美托洛尔

答案: C

5. 引起"肾病患者清除减慢，服用呋喃妥因血药浓度升高，可引起周围神经炎"是

- A: 性别
- B: 遗传因素
- C: 基础疾病
- D: 年龄

答案: C

6. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

- A: 维生素 C
- B: 氯磷定
- C: 阿托品
- D: 维生素 K1

答案: D

7. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是

- A: 很可能?
- B: 可能无关?
- C: 肯定?
- D: 可能?

答案: A

8. 胶囊剂的注意事项是

- A: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息
- B: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适
- C: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的
- D: 用后应漱口

答案: B

9. 审核处方的合法性、规范性与用药的适宜性

- A: 处方审核
- B: 静脉药物配置
- C: 治疗药物监测
- D: 处方点评

答案: A

10. 降钙素属于

- A: 激素替代剂
- B: 促进骨矿化剂
- C: 骨吸收抑制剂
- D: 骨形成刺激剂

答案: C

11. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，是归属于

- A: 药学信息服务工作
- B: 处方审核工作
- C: 参与健康教育工作
- D: 处方点评工作

答案：D

12. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是

- A: 化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松
- C: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药
- D: 化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药

答案：B

13. 吸附力强、可阻止毒物吸收，但是对氰化物无效的洗胃液是

- A: 1%硫酸镁溶液
- B: 牛奶-水混合液
- C: 鸡蛋白
- D: 药用炭混悬液

答案：D

14. 急需查询输液剂的配伍禁忌，首选的书籍是

- A: 《药物流行病学》
- B: 《药物治疗学：病理生理学的方法》

C: 《注射药物手册》

D: 《新编药物学》

答案: C

15. (2018 年真题) 患者, 女, 49 岁, 近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊, 临床诊断为下呼吸道感染, 处方如下:

A: 氨溴索片

B: 左氧氟沙星片

C: 阿司匹林泡腾片

D: 维生素 C 片

答案: C

16. 如“齐二药事件”

A: 药品上市前风险评估

B: 药品上市后风险评估

C: 发现药品质量问题

D: 发现与规避假、劣药流入市场

答案: D

17. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分, 并在处方右上角以文字注明。

A: 中药处方印刷用纸为白色, 右上角标注“中”

B: 二类精神药品处方印刷用纸为白色, 右上角标注“精二”

C: 麻醉药品处方印刷用纸为淡红色、右上角标注“麻醉”

D: 儿科处方印刷用纸为淡黄色、右上角标注“儿科”

答案: B

18. 餐中服用，可以减少对胃肠道刺激的药品是

- A: 二甲双胍片
- B: 复方铝酸铋片
- C: 甲氧氯普胺片
- D: 瑞舒伐他汀片

答案：A

19. 处方是医疗机构的重要医疗文书，具有

- A: 经济性、法律性和合理性
- B: 法律性、技术性和经济性
- C: 技术性、经济性和合法性
- D: 技术性、有效性和经济性

答案：B

20. 关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是

- A: 早晨服用贝特类、而晚上服用他汀类
- B: 晚间服用
- C: 早晚分别服用
- D: 早晨服用

答案：A

21. 以甲硝唑口颊片治疗口腔溃疡，最合理的用药方案是（）

- A: 三餐前 10 分钟含服
- B: 三餐前 1 小时含服
- C: 三餐后含服
- D: 三餐前含服

答案：C

22. 对于铁剂的使用，错误的是

A: 口服铁剂宜选用 2 价铁？

B: 为了补足储存铁，铁剂治疗应该在 Hb 正常后至少再补充铁剂 4~6 个月？

C: 口服铁剂是治疗缺铁性贫血的首选方法？

D: 钙剂可促进铁剂吸收？

答案：D

23. 服药期间宜多喝水的药物

A: 苯溴马隆

B: 左旋多巴

C: 苯妥英钠

D: 琥珀酸亚铁

答案：A

24. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

A: 10 万—15 万 IU

B: 15 万—30 万 IU

C: 30 万~60 万 IU

D: 30 万—45 万 IU

答案：B

25. 关于血清总蛋白、白蛋白和球蛋白的叙述正确的是

- A: A/G 比值大于 1，提示有慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害、肾病综合征等病变
- B: 血清总蛋白为白蛋白和球蛋白之和
- C: 球蛋白是多种蛋白质的混合物，增高主要以 β -球蛋白增高为主
- D: 白蛋白为急性时相蛋白，在维持血浆胶体渗透压、体内运输、营养方面均起着非常重要的作用

答案：B

26. 有双侧肾动脉狭窄的高血压患者不宜选用

- A: 哌唑嗪
- B: 多沙唑嗪
- C: 维拉帕米
- D: 卡托普利

答案：D

27. 一般高血压患者服用降压药，建议控制在

- A: $<140 / 80\text{mmHg}$
- B: $<140 / 90\text{mmHg}$
- C: $<120 / 80\text{mmHg}$
- D: $<130 / 80\text{mmHg}$

答案：B

28. 含右美沙芬制剂的禁用人群是

- A: 孕妇
- B: 银屑病患者
- C: 青光眼患者
- D: 呼吸衰竭患者

答案：A

29. 老年 CAP 患者。不能选用的治疗药物是

- A: 碳青霉烯类
- B: 大环内酯类
- C: 第三代头孢菌素
- D: 氟喹诺酮类

答案：D

30. 药物的代谢速率高于成人，容易导致剂量偏低，其机制是

- A: 胃酸分泌少
- B: 体液及细胞外液容量大
- C: 肝脏的相对重量约为成人的 2 倍
- D: 胃排空快

答案：C

31. （2016 年真题）应在餐前服用的药物是（ ）。

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 氨茶碱片
- C: 吡罗昔康片
- D: 呋塞米片

答案：A

32. 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用（ ）

- A: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- B: 色甘酸钠滴眼液
- C: 氧氟沙星滴眼液
- D: 玻璃酸钠滴眼液

答案：B

33. 对有过敏倾向和特异质以及有 ADR 家族史的患者，最重要的是

- A: 了解患者及家族的过敏史
- B: 注意定期监测器官功能
- C: 注意特殊人群用药
- D: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应

答案：A

34. 以下药物中，可能导致癫痫发作（药源性神经系统疾病）的药物是

- A: 麻黄碱
- B: 利血平
- C: 诺氟沙星
- D: 碳酸镁

答案：A

35. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 卡马西平
- B: 硝西泮
- C: 阿米替林
- D: 苯巴比妥

答案：B

36. 服药饮酒可致使低血糖、呼吸抑制的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 吲哚美辛
- C: 普萘洛尔
- D: 格列本脲

答案：D

37. 发表在《中国药理学学报》上有关紫杉醇的综述文章，属于

- A: 四级信息
- B: 三级信息
- C: 五级信息
- D: 二级信息

答案：B

38. 患者女,32 岁,一天前发热体温 39.8℃全身乏力,四肢疼痛近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血,血常规检查白细胞计数偏低,中性粒细胞比例低,该患者最适宜选用的药物是()

- A: 利巴韦林片
- B: 金刚烷胺片
- C: 奥司他韦胶囊
- D: 阿昔洛韦片

答案：C

39. 有关药学服务的叙述，正确的是

- A: 药学服务的社会属性仅限服务于治疗性药物
- B: 药学服务只涉及更高层次的临床实践，不包括处方调剂、药品检验、药品供应
- C: 药学服务涵盖了患者用药相关的全部需求，但不包括对公众的健康教育
- D: 用药周期长的慢性病患者属于药学服务的重要人群

答案：D

40. (2015 年真题) 格列齐特片的适宜服药时间是 ()。

A: 清晨

B: 餐中

C: 餐后

D: 餐前

答案: D

41. 出血是肝素最常见的不良反应，对明显出血者选用的特异性拮抗药是

A: 烯丙吗啡

B: 氟马西尼

C: 地塞米松

D: 鱼精蛋白

答案: D

42. 抗过敏药可以治疗荨麻疹，可是驾车、高空作业、精密机械操作者服用后应休息

A: 3 小时以上

B: 5 小时以上

C: 4 小时以上

D: 6 小时以上

答案: D

43. 属于 5 α 还原酶抑制剂的是 ()

A: 度他雄胺

B: 雌三醇

C: 普适泰

D: 氟他胺

答案: A

44. 患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊，住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是

- A: 阿司匹林
- B: 氯吡格雷
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 华法林钠

答案：B

45. 抗氧化，减少再灌注期氧自由基的产生

- A: 阿司匹林
- B: 丙磺舒
- C: 秋水仙碱
- D: 别嘌醇

答案：D

46. 服用磺胺甲噁唑时

- A: 宜少饮水
- B: 禁吸烟
- C: 宜多饮水
- D: 忌用热水送服

答案：C

47. 可引起排尿困难，尿潴留患者禁用的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 阿米替林
- C: 加兰他敏

D: 法莫替丁

答案: B

48. 为减少共济失调，幻觉及"宿醉现象"，老年人失眠患者宜选用：

A: 苯巴比妥

B: 劳拉西泮

C: 水合氯醛

D: 佐匹克隆

答案: D

49. 一般成人血液总量约为

A: 2500～3000ml

B: 3000～3500ml

C: 5000～6000ml

D: 1500～2000ml

答案: C

50. 可沉淀大部分有机物及无机物的是

A: 鸡蛋白

B: 1%氯化钠溶液

C: 药用炭混悬液

D: 3%～5%鞣酸溶液

答案: D

51. 服药后 1h 内限制饮水的药物是

A: 镇静催眠药

B: 磺胺类药物

C: 胃黏膜保护剂

D: 微生物制剂

答案：C

52. (2015 年真题) 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇 4mg tid 治疗。没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋，话不成句，被紧急送往医院。

A: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

B: 布地纳德气雾剂

C: 沙丁胺醇片

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：D

53. HMG-CoA 还原酶抑制剂

A: 辛伐他汀

B: 考来烯胺

C: 阿昔莫司

D: 吉非贝齐

答案：A

54. 属于过敏介质阻释剂的是

A: 曲尼司特

B: 孟鲁司特

C: 氨茶碱

D: 多索茶碱

答案：A

55. 药师在接受护士用药咨询时，应重点关注的内容是

A: 药品经济学知识

- B: 药品的生产厂商和批号
- C: 药物制剂的等效性
- D: 注射剂的配制和滴注速度等

答案：D

56. 下列药物服用后可引起嗜睡，对驾车、高空作业或操作机器者宜慎用的是

- A: 喷托维林
- B: 右美沙芬
- C: 可待因
- D: 苯丙哌林

答案：B

57. 属于 M 受体阻断剂的是

- A: 异丙托溴铵
- B: 福莫特罗
- C: 乙酰胆碱
- D: 美托洛尔

答案：A

58. 引起视网膜变性而致失明，服药半年左右应查眼底 DMARDs 是

- A: 环孢素
- B: 氯喹
- C: 利妥昔单抗
- D: 硫唑嘌呤

答案：B

59. 属于时间依赖性抗菌药，且抗菌作用持续时间长，评估此类药物的 PK / PD 参数主要为 $AUC_{0\sim 24} / MIC$ ，一般推荐日剂量分 2 次给药方案的药物是

- A: 氨茶碱
- B: 利奈唑胺
- C: 头孢克洛
- D: 左氧氟沙星

答案：B

60. 以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

- A: 抗生素
- B: 黄连素
- C: 谷维素
- D: 维生素

答案：B

61. 贫血患者常出现()

- A: 中性粒细胞增多
- B: 血小板计数增多
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 血红蛋白减少

答案：D

62. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

- A: 睡前
- B: 清晨

C: 餐前

D: 餐后

答案: D

63. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用阿托伐汀钙片

B: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

C: 停用二甲双胍肠溶片

D: 停用瑞格列奈片

答案: C

64. 药学服务的具体工作不包括

A: 关注特殊人群

B: 参与临床药物治疗

C: 处方审核

D: 治疗药物监测

答案: A

65. 下列药物中，可影响性功能的药物为

A: 泮托拉唑

B: 雷尼替丁

C: 法莫替丁

D: 西咪替丁

答案: D

66. 引起心悸、心绞痛发作的药物是

- A: 碘和碘化物
- B: 胰岛素
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 左甲状腺素

答案：D

67. 关于处方开具和调剂的说法正确的是()

- A: 调剂处方时应做到“四查十对
- B: 剂处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量
- C: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品
- D: 处方开具后 7 日内有效

答案：A

68. 胰岛素增敏剂

- A: 罗格列酮
- B: 格列吡嗪
- C: 瑞格列奈
- D: 伏格列波糖

答案：A

69. 癫痫患者禁用下列哪种抗焦虑药物（）

- A: 曲唑酮
- B: 舍曲林
- C: 氯米帕明
- D: 艾司唑仑

答案：C

70. 可沉淀大部分有机物及无机物的洗胃液是

- A: 药用炭混悬液
- B: 3%~5%鞣酸溶液
- C: 1%氯化钠溶液
- D: 鸡蛋白

答案：B

71. 运输过程中应避免振荡，否则药物结构发生改变，可引起纯红细胞再生障碍性贫血的药物是

- A: 人促红素
- B: 阿昔洛韦
- C: 脂肪乳
- D: 利巴韦林

答案：A

72. 美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。头孢曲松属于()

- A: D 级
- B: C 级
- C: A 级
- D: B 级

答案：D

73. 能诱导肝药酶 CYP2C19 的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 西咪替丁
- C: 卡马西平
- D: 地塞米松

答案：D

74. 患者,女,35岁,复杂部分发作性癫痫病史12年,最初使用苯妥英钠单药治疗,6个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量,因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗,癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发,到神经内科复诊。患者同时患有2型糖尿病长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B

- A: 停用了苯妥英钠
- B: 卡马西平的不良反应
- C: 糖尿病病情进展
- D: 丙戊酸钠的不良反应

答案: D

75. 急诊处方印刷用纸为

- A: 淡绿色
- B: 淡黄色
- C: 淡红色
- D: 白色

答案: B

76. 下列药物中,能解救含亚硝酸盐的食物中毒的是

- A: 维生素B6
- B: 普萘洛尔
- C: 维生素K1
- D: 亚甲蓝

答案: D

77. 患者，男 58 岁，高血压病史 5 年，吸烟史 40 年，日均 40 支，6 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立，家属发现其说话迟钝含混，右侧嘴唇变浅，意识清楚，到某院急诊 BP190/120mmHg，血常规基本正常，行头部 MRI 检查后，诊断为急性脑梗死。

- A: 氯吡格雷片 75mgqdpo
- B: 阿司匹林肠溶片 100mgqdpo
- C: 阿司匹林肠溶片 300mgqdpo
- D: 华法林片 3mgqdpo

答案：B

78. 一位巨幼细胞性贫血患儿肌肉注射维生素 B

- A: 0.25~0.40ml
- B: 0.049~0.20ml
- C: 0.05~0.10ml
- D: 0.15~0.30ml

答案：C

79. 无治疗指征补钙

- A: 盲目联合用药
- B: 非适应证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 超适应证用药

答案：C

80. 我国 CAP 的常见病原体不包括

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 金黄色葡萄球菌
- C: 流感嗜血杆菌

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 肺炎衣原体

答案：A

81. 是空腹血浆中的主要脂蛋白，可将胆固醇运输到肝外组织的为

- A: 低密度脂蛋白胆固醇
- B: 血清总胆固醇
- C: 极低密度脂蛋白胆固醇
- D: 三酰甘油酯

答案：A

82. 曲唑酮的作用机制为

- A: 抑制单胺氧化酶
- B: 抑制 NE 再摄取
- C: 抑制 5-HT 和 NE 的再摄取
- D: 抑制 5-HT 再摄取

答案：D

83. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是

- A: 餐前服用阿莫西林
- B: 餐前服用格列本脲
- C: 清晨服用硫酸镁
- D: 清晨服用帕罗西汀

答案：D

84. 就餐前 15~30 分钟给药的是

- A: 瑞格列奈
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：B

85. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 5~10 分钟
- B: 10~20 分钟
- C: 20~30 分钟
- D: 15~30 分钟

答案：D

86. 患者到药店要求购买痢特灵，药师应该给予

- A: 诺氟沙星
- B: 双嘧达莫
- C: 呋喃唑酮
- D: 喷托维林

答案：C

87. 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

- A: 需增加给药剂量
- B: 须谨慎使用，必要时减量给药
- C: 尽可能避免使用
- D: 一般无须调整剂量

答案：D

88. 药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/268076143062007022>