

2024 年辽宁省凌源市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试完整版及答案【历年真题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对合并糖尿病以及肾病的高血压病人降压的目标建议是

- A: $<140/90\text{mmHg}$
- B: $<160/95\text{mmHg}$
- C: $<130/80\text{mmHg}$
- D: $<150/90\text{mmHg}$

答案：C

2. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 瑞格列奈片应于餐前服用
- B: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等
- C: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药
- D: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

答案：D

3. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理
- B: 左氧氟沙星片给药间隔不合理
- C: 氨溴索片给药剂量不合理

D: 维生素 C 片用法用量不合理

答案：B

4. 关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),对钝痛如牙痛、头痛、神经痛等有较好的镇痛效果的是

A: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啶、舒马曲坦、佐米曲坦

B: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等

C: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素 B1

D: 推荐应用地西泮(安定)片

答案：B

5. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件，具有

A: 技术性、经济性和合法性

B: 技术性、有效性和经济性

C: 法律性、技术性和经济性

D: 经济性、法律性和合理性

答案：C

6. 不宜肌内注射或直接静脉注射，滴注速度过快容易导致红人综合征的药物是

A: 阿奇霉素

B: 链霉素

C: 万古霉素

D: 磷霉素

答案：C

7. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别)生理盐水

A: DOL

B: NS

C: 0

D: LD

答案: B

8. (肾功能不全者的药物排泄机制) 有机酸排出减少

A: 肾小球滤过减少

B: 肾小管分泌减少

C: 肾血流量减少

D: 肾小管重吸收增加

答案: B

9. 抗胆碱药或抗过敏药用于伴有青光眼患者，应评判为

A: 无适应证用药

B: 联合用药不适宜

C: 过度治疗用药

D: 有禁忌证用药

答案: D

10. 药库接受了一批药品，其中需要在冷处贮存的是

A: 西地碘片

B: 双歧三联活菌胶囊

C: 硫普罗宁片

D: 乳酶生片

答案: B

11. 以下对"调配处方四查十对"的叙述中，最正确的是

- A: 查临床诊断，对用药合理性
- B: 查配伍禁忌，对药品性状、规格、数量
- C: 查处方，对临床诊断
- D: 查药品，对药名、剂型、规格、数量

答案：D

12. 餐前 30min 服用的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 阿托伐他汀
- C: 复方氢氧化铝
- D: 伊托必利

答案：C

13. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为预防治疗，最佳剂量范围是

- A: 25~75mg / d
- B: 75~150mg / d
- C: 25~50mg / d
- D: 150~300mg / d

答案：B

14. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据是

- A: 尿沉渣管型
- B: 尿沉渣磷酸盐结晶
- C: 尿沉渣白细胞
- D: 尿沉渣结晶

答案：A

15. 严重肝病患者的尿液常见

- A: 磷酸盐结晶
- B: 酪氨酸和亮氨酸结晶
- C: 草酸盐结晶
- D: 尿酸盐结晶

答案：B

16. 以下用于治疗寻常痤疮的药物中，属于非处方药的是

- A: 阿达帕林
- B: 维胺酯
- C: 过氧苯甲酰
- D: 异维 A 酸

答案：C

17. 药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

- A: 患者二？
- B: 患者一？
- C: 患者三？
- D: 患者四？

答案：B

18. 荨麻疹患者常出现

- A: 血小板增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 血红蛋白减少

答案：B

19. 患者，男，25 岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温 38.5℃，入院检查肺部湿啰音，WBC $12\times 10^9/L$ ，X 线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

- A: 支气管哮喘
- B: 社区获得性肺炎
- C: 肺结核
- D: 支气管炎

答案：B

20. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，是归属于

- A: 处方点评工作
- B: 参与健康教育工作
- C: 处方审核工作
- D: 药学信息服务工作

答案：A

21. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 $8.0\times 10^9/L$

- A: 格列齐特
- B: 非诺贝特
- C: 辛伐他汀
- D: 二甲双胍

答案：D

22. (2017 年真题) 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是 ()

- A: 氯己定含漱液
- B: 地塞米松粘贴片
- C: 西地碘含片
- D: 替硝唑含漱液

答案：B

23. 能客观地反映过去 3 个月内平均血糖水平的指标是 ()

- A: HDL-C
- B: TG
- C: HbA1c
- D: LDL-C

答案：C

24. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，诊断为 2 型糖尿病，既往有磺胺过敏史，不宜选用的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 吡格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 格列齐特

答案：D

25. 曲唑酮的作用机制为

- A: 抑制 NE 再摄取
- B: 抑制 5-HT 和 NE 的再摄取
- C: 抑制 5-HT 再摄取
- D: 抑制单胺氧化酶

答案：C

26. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 B 级的药物是

- A: 万古霉素
- B: 阿莫西林
- C: 葡萄糖
- D: 沙利度胺

答案：B

27. 有助于提高医、护、药专业人员对 ADR 的警惕性和识别能力；说明 ADR 监测的意义是

- A: 减少 ADR 的危害
- B: 为“药品召回”提供依据
- C: 促进新药的研制开发
- D: 促进临床合理用药

答案：D

28. COMT 抑制剂

- A: 苯海索
- B: 左旋多巴
- C: 司来吉兰
- D: 恩托卡朋

答案：D

29. 适用于年轻、震颤明显患者的是

- A: 恩托卡朋
- B: 苯海索
- C: 左旋多巴
- D: 司来吉兰

答案：B

30. 支气管扩张的临床表现是

- A: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血
- B: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰
- C: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月
- D: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

答案：A

31. 用于治疗溃疡性结肠炎，应晨起服用，达到症状完全缓解后开始减量，减药速度不宜太快的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 格列吡嗪
- C: 阿卡波糖
- D: 西格列汀

答案：A

32. 枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

- A: 神经毒性
- B: 腹痛
- C: 皮炎
- D: 性功能减退

答案：A

33. 适用于绝经过渡期()

- A: 单纯孕激素补充治疗

B: 雌孕激素连续联合用药

C: 单纯雌激素补充治疗

D: 雌孕激素序贯用药

答案: A

34. 用于对组织无刺激性药物

A: 肌肉注射

B: 动脉注射

C: 静脉注射

D: 腔内注射

答案: A

35. 患者，女，51岁，体检时发现血压160/105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9.56mmol/L、甘油三酯1.52mmol/L(正常参考区间0.56~1.70mmol/L)、总胆固醇6.26mmol/L(正常参考区间<5.2mmol/L)、低密度脂蛋白胆固醇4.85mmol/L(正常参考区间2.1~3.1mmol/L)、高密度脂蛋白胆固醇1.2mmol/L(正常参考区间1.2~1.65mmol/L)、血肌酐50μmol/L(正常参考区间45~84μmol/L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A: 普罗布考

B: 非诺贝特

C: 阿托伐他汀

D: 依折麦布

答案: C

36. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

A: 碳酸氢钠

B: 莫沙必利

C: 西沙必利

D: 奥美拉唑

答案: B

37. 患者，男，75 岁，有高血压，长期服用厄贝沙坦氢氯噻嗪片（150mg/12.5mg）1 片 qd，血压控制平稳。因排尿困难、尿频和尿不尽感就诊，诊断为良性前列腺增生。给予非那雄胺片 5mgqd，特拉唑嗪片 5mgqd。患者用药后出现头晕，前来咨询。

A: 非那雄胺可引起直立性低血压，头晕可能与此相关

B: 非那雄胺可增强降压药的降压效果，建议更换降压药

C: 建议睡前服用特拉唑嗪，有助于缓解头晕症状

D: 头晕可能与患者焦虑有关，继续用药会逐渐缓解

答案: C

38. 马兜铃酸可导致药源性肾病的机制是

A: 肾间质纤维化

B: 不可逆性肾小管坏死

C: 前列腺素合成障碍

D: 阻塞肾小管、肾小球

答案: A

39. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径

A: 每个半衰期给药 1 次

B: 每 2~3 个半衰期给药 1 次

C: 每日给药 1 次

D: 静脉滴注给药

答案: C

40. 关于微生态制剂，下列说法不正确的是

- A: 对促进营养物质的吸收没有帮助
- B: 可制约致病菌的生长繁殖
- C: 减少肠内毒素的生成
- D: 维持肠道正常菌群的平衡

答案：A

41. 轻度支气管哮喘的临床表现不包括

- A: 可有焦虑
- B: 步行或上楼时气短
- C: 心率增快 >120 次 / 分
- D: 呼吸频率轻度增加，可闻及散在哮鸣音

答案：C

42. 荨麻疹患者常出现

- A: 血小板计数增高
- B: 血红蛋白减少
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 中性粒细胞增多

答案：C

43. （2019 年真题）正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是

- A: C 级
- B: B 级
- C: A 级
- D: X 级

答案：C

44. 一般成人血液总量约为

A: 1500~2000ml

B: 2500~3000ml

C: 3000~3500ml

D: 5000~6000ml

答案: D

45. (2019 年真题) 患者，男，62 岁，无吸烟饮酒史，患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊，查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示：AST145U/L，ALT134U/L，排除了其他疾病因素后，停用阿托伐他汀，肝功能逐步恢复正常。一个月后改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应该与他汀类药物之间的因果关系应评价为

A: 很可能

B: 可能无关

C: 肯定

D: 可能

答案: C

46. 与舒筋活络酒不宜联用的药物是

A: 氢氧化铝

B: 苯巴比妥

C: 可待因

D: 阿托品

答案: B

47. 患儿，女，5 岁，误服香豆素灭鼠药，可选用的解救药物是 ()

- A: 亚甲蓝
- B: 维生素 K
- C: 纳洛酮
- D: 二巯丙醇

答案：B

48. 艾滋病的传播途径不包括

- A: 经血传播
- B: 消化道传播
- C: 经血制品传播
- D: 性途径传播

答案：B

49. 下列剂型中，严禁直接服用或口含的是

- A: 肠溶片
- B: 泡腾片
- C: 缓释片
- D: 舌下片

答案：B

50. 患者，女，62 岁，2 型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难，不宜选用的药物是()

- A: 格列齐特
- B: 吡格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：B

51. 服用维生素 B1、维生素 B2、烟酸等应该禁用的饮食是

- A: 酒
- B: 食醋
- C: 脂肪
- D: 食盐

答案：A

52. 患者，男，27 岁，电话咨询药师朋友，告知目前正在欧洲旅游，从昨夜开始出现腹泻，呈水样便，起夜 4 次，希望药师给出建议。有关药师给予该患者的建议，错误的是

- A: 口服双八面体蒙脱石散，与抗菌药物同服
- B: 避免高脂肪、高糖饮食
- C: 口服补液盐 ORSIII 50ml/kg，4~6h 内服完
- D: 口服左氧氟沙星胶囊 0.2gtid

答案：A

53. 患者，女，32 岁，妊娠 20 周。1 天前发热，体温 39.8℃，全身乏力、四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低、中性粒细胞比例降低。该患者最适宜选用的药物是

- A: 利巴韦林片
- B: 奥司他韦胶囊
- C: 金刚烷胺片
- D: 阿昔洛韦片

答案：B

54. 痛风患者急性发作期，不能选用的止痛药物是

- A: 布洛芬

B: 泼尼松

C: 阿司匹林

D: 对乙酰氨基酚

答案: C

55. “药师参与临床药物治疗，提供药学服务的重要方式和途径”的工作是

A: 静脉药物配置

B: 治疗药物监测

C: 处方调剂

D: 参与临床药物治疗

答案: B

56. 服药后饮水可能会引起水潴留的药物是

A: 利胆药

B: 抗尿结石药

C: 抗利尿药

D: 苦味健胃药

答案: C

57. 可能导致 γ -谷氨酰转移酶升高的药物是

A: 胰岛素

B: 苯妥英钠

C: 氯氮平

D: 阿司匹林

答案: B

58. (2017 年真题) 患者男, 65 岁, 身高 170cm, 体重 60kg, 经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测 (肌酐清除率 45ml/min), 诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全, 该患者应首选的药物是

- A: 格列齐特
- B: 格列本脲
- C: 格列吡嗪
- D: 格列喹酮

答案: D

59. “根据用药顺序确定最可疑的致病药物, 然后有意识地停用最可疑或引起相互作用的药物。根据停药后症状的变化情况以确诊”, 即可诊断药源性疾病

- A: 排除药物以外的因素
- B: 流行病学的调查
- C: 致病药物的确定
- D: 询问用药过敏史和家族史

答案: C

60. 应用患儿年龄、体重或体表面积等计算用药剂量, 显示儿童用药应该

- A: 密切监护
- B: 避免食物的影响
- C: 严格掌握用药剂量
- D: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

答案: C

61. 不宜与蛋白质食物合用的药物是

- A: 磺胺类药物

- B: 左旋多巴
- C: 辛伐他汀
- D: 硫酸亚铁

答案：B

62. 抗氧化，减少再灌注期氧自由基的产生

- A: 别嘌醇
- B: 阿司匹林
- C: 丙磺舒
- D: 秋水仙碱

答案：A

63. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体
- B: 莫西沙星对非典型病原体无效
- C: 莫西沙星对厌氧菌无效
- D: 莫西沙星属于氟喹诺酮类

答案：B

64. 依据生物钟规律，适宜清晨服药的是

- A: 抗忧郁药
- B: 调节血脂药
- C: 抗过敏药
- D: 平喘药

答案：A

65. 皮下脂肪薄，局部循环差，致使皮下和肌内注射给药的吸收不规则，即

- A: 药物代谢
- B: 药物分布
- C: 药物吸收
- D: 药物排泄

答案：C

66. 可用于习惯性流产的药物是

- A: 他莫昔芬
- B: 依普黄酮
- C: 司坦唑醇
- D: 甲羟孕酮

答案：D

67. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径，半衰期 12h 的药物通常选择()

- A: 每日给药 1 次
- B: 2~3 个半衰期给药 1 次
- C: 每个半衰期给药 1 次
- D: 静脉滴注给药

答案：C

68. 2~3 度房室传导阻滞、充血性心力衰竭禁用()。

- A: 利尿剂（袢利尿药）
- B: ACEI
- C: 利尿剂（噻嗪类）

D: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

答案：D

69. (2019 年真题) 患者，男，47 岁，2 型糖尿病史，饮食不规律，近期因口服降糖药疗效不佳欲改为三餐前即刻使用胰岛素或胰岛素类似物控制血糖，应选用的药物是

A: 低精蛋白锌胰岛素

B: 精蛋白锌胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 门冬胰岛素

答案：D

70. 用药后 2 小时内尽量不排尿或局部冲洗的剂型是

A: 咀嚼片

B: 阴道栓

C: 舌下片

D: 泡腾片

答案：B

71. 可刺激胃肠黏膜，引起水肿或充血

A: 食盐

B: 食醋

C: 酒

D: 脂肪

答案：C

72. 适用于伴快速型心律失常的高血压患者服用的药物是

A: 多沙唑嗪

- B: 阿替洛尔
- C: 氢氯噻嗪
- D: 阿利吉仑

答案：B

73. 用于前列腺增生症的高选择性 α_1A 受体阻断剂是 ()

- A: 托特罗定
- B: 特拉唑嗪
- C: 坦索罗辛
- D: 索利那新

答案：C

74. 一旦误服该毒性物质中毒，忌用碳酸氢钠溶液洗胃的是

- A: 香豆素类杀鼠药
- B: 磷化锌等灭鼠药
- C: 克仑特罗(瘦肉精)
- D: 拟除虫菊酯类杀虫药

答案：A

75. 患者，男，72岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

- A: 氯吡格雷
- B: 比索洛尔
- C: 普伐他汀
- D: 硝酸异山梨酯舌下片

答案：D

76. 对中枢神经有抑制作用的是

- A: 酒
- B: 脂肪
- C: 食盐
- D: 食醋

答案：A

77. 伴有心脏病、高血压者应慎用的药品是

- A: 含咖啡因的抗感冒药
- B: 含氯苯那敏的抗感冒药
- C: 含伪麻黄碱的抗感冒药
- D: 含右美沙芬的抗感冒药

答案：C

78. 严重肝功能减退病人常伴功能性肾功能不全，以致使"经肝肾两种途径清除"的药物的血药浓度很高，因此用药原则是

- A: 一般无须调整剂量
- B: 必须减量应用
- C: 须谨慎使用，必要时减量给药
- D: 尽可能避免使用

答案：B

79. 适用于伴发膀胱过度活动症的良性前列腺增生症的是（）

- A: 奥昔布宁
- B: 特拉唑嗪
- C: 非那雄胺
- D: 米多君

答案：A

80. 多黏菌素可能引起

- A: 尿葡萄糖
- B: 尿液隐血
- C: 尿蛋白
- D: 尿胆红素

答案：C

81. 处方中开具"黄体酮用于排除输尿管结石"，应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 无正当理由超适应证用药
- D: 过度治疗用药

答案：C

82. 为提高叶酸治疗营养性巨幼细胞贫血的疗效，应同时用

- A: 维生素 K
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 D
- D: 维生素 B1

答案：B

83. 患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下:

- A: 左氧氟沙星片
- B: 维生素 C 片
- C: 氨溴索片

D: 阿司匹林泡腾片

答案：D

84. 抗高血压药物属于钙通道阻滞剂的是（）

A: 缬沙坦

B: 依那普利

C: 氨氯地平

D: 氢氯噻嗪

答案：C

85. 患者,女,45岁,6个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁,在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗,症状控制较好,近3个月服用西咪替丁,患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱,该患者各地求医,服用各种药物,具体药物品种不详。围绕该病例,医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A: 有条件的应测定药物血液浓度

B: 遵从联合治疗原则

C: 长期规律用药

D: 定期监测肝功能

答案：B

86. 应将该药倒入 50ml 温水中充分稀释,摇匀服用,可用于 IBS 患者止泻的药物是

A: 匹维溴铵

B: 环孢素 A

C: 地芬诺酯

D: 蒙脱石散

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/268122034116007022>