

2024 年河北省定兴县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题大全及一套参考答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男性，45 岁，无痛性肉眼血尿 6 个月来诊，患者于 6 个月前无意中发现排尿全程尿色发深，呈酱油色，无腰痛，尿频，排尿困难，排尿后尿不尽，结合尿常规检查，诊断为良性前列腺增生。

- A: 特拉唑嗪
- B: 奥昔布宁
- C: 坦索罗辛
- D: 非那雄胺

答案：D

2. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法使用疗程为

- A: 6~8 周
- B: 1~2 周
- C: 8~12 周
- D: 4~6 周

答案：B

3. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

- A: 不宜与 MAOIs 类药物联合使用
- B: 如以上药物治疗无效，可考虑更换为同类的其他药物
- C: 从最大有效剂量开始，逐步递减剂量

D: 药物治疗至少 2 周才会有显著的情绪反应

答案：C

4. (2020 年真题) 患者, 男, 66 岁, 2 型糖尿病, 长期口服二甲双胍, 格列美脲, 近日查空腹血糖 12.3mmol/L, 糖化血红蛋白 9.0%, 主诊医师加用“甘精胰岛素每日 1 次+门冬胰岛素每日 3 次”, 关于该患者药物治疗方案的说法, 正确的是 ()

A: 因采用一日多次胰岛素治疗, 格列美脲应停用

B: 门冬胰岛素应在三餐前 30 分钟皮下注射

C: 甘精胰岛素应避免与二甲双胍联合使用

D: 患者为 2 型糖尿病, 加用胰岛素一日 4 次方案不适宜

答案：A

5. 驾驶员工作时不宜服用的药品是

A: 阿司匹林?

B: 维生素 C?

C: 阿莫西林?

D: 氯苯那敏?

答案：D

6. 对由营养不良、婴儿期所致的恶性贫血者应选用

A: 维生素 K

B: 富马酸亚铁

C: 叶酸+维生素 B

D: 甲磺酸去铁胺

答案：C

7. 少数患者在口服时可出现前庭神经紊乱（如头晕、眩晕）的痤疮治疗药是

- A: 维 A 酸
- B: 米诺环素
- C: 过氧化苯甲酰
- D: 口服短效避孕药

答案：B

8. 患者，男，58 岁，体重 68kg，高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰，伴发热，入院查体 BP：120/80mmHg，T38.9℃。化验结果：白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 86%。胸片示：右下肺纹理增粗，诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

- A: 氨苄西林
- B: 阿莫西林
- C: 莫西沙星
- D: 头孢吡肟

答案：C

9. 高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

- A: 胃肠型
- B: 病毒型
- C: 肺炎型
- D: 神经型

答案：D

10. 考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应试验阶段，属于

- A: IV 期临床试验
- B: III 期临床试验

C: I 期临床试验

D: II 期临床试验

答案: A

11. 以下对"发热的指标"的叙述中, 不正确的是

A: 腋下温度超过 36.6℃

B: 口腔温度超过 37.3℃

C: 腋下温度超过 37.0℃

D: 直肠温度超过 37.6℃

答案: A

12. 影响肝药酶活性, 药物疗效降低

A: 氨茶碱

B: 呋塞米

C: 地西洋

D: 胰岛素

答案: C

13. 患者, 女, 50 岁, 近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状, 临床诊断为围绝经期综合征, 在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况不属于禁忌证但属于慎用的是()

A: 耳硬化症

B: 乳腺增生

C: 近 6 月内患活动性静脉栓塞性疾病

D: 严重肝功能障碍

答案: B

14. 我国育龄妇女的主要避孕措施为

- A: 口服避孕药
- B: 男性绝育术
- C: 宫内节育器
- D: 阴茎套

答案：C

15. 老年糖尿病患者不建议使用

- A: 噻唑烷二酮类
- B: 长效磺脲类
- C: 双胍类
- D: α -葡萄糖苷酶抑制剂

答案：B

16. 对预防用药错误的策略而言，个人观认为发生用药错误的原因主要是

- A: 人的行为失常
- B: 人员短缺
- C: 工作流程不规范
- D: 环境缺陷

答案：A

17. 关于微生态制剂，下列说法不正确的是

- A: 减少肠内毒素的生成
- B: 维持肠道正常菌群的平衡
- C: 可制约致病菌的生长繁殖
- D: 对促进营养物质的吸收没有帮助

答案：D

18. 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是()

- A: 5—20mg
- B: 10—20mg
- C: 40—200mg
- D: 10—80mg

答案: B

19. 填报 ADR / ADE 报告描述的时间

- A: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果
- B: 患者疾病发病时间
- C: 采取措施干预不良反应的时间
- D: 患者用药记录

答案: C

20. 不宜肌肉注射或直接静脉注射，滴注速度过快可出现红人综合征的药物是

- A: 培氟沙星
- B: 万古霉素
- C: 苯妥英钠
- D: 洛铂

答案: B

21. 静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

- A: 2 小时以上
- B: 1 小时以上
- C: 6 小时以上
- D: 4 小时以上

答案: A

22. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: B 受体激动剂
- B: 抗胆碱能药物
- C: 钙通道阻滞剂
- D: B 受体阻断剂

答案：D

23. 与两性霉素 B 合用需要严密监测血钾

- A: 酮康唑
- B: 碳酸氢钠
- C: 强心苷
- D: 链霉素

答案：C

24. 阿托品与小活络丹合用

- A: 合用后增加毒性，出现药物中毒
- B: 两者合用作用相反，互相降低药效
- C: 合用后抑制后者吸收，降低疗效
- D: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭

答案：A

25. 可引起血清尿素氮降低的是

- A: 肾衰竭
- B: 严重肝病
- C: 胃溃疡
- D: 急性胰腺炎

答案：B

26. 用于氰化物中毒解救的药物是

- A: 亚甲蓝
- B: 毛果芸香碱
- C: 阿托品
- D: 碘解磷定

答案：A

27. 药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务重要人群的是

- A: 住院患者
- B: 社区患者
- C: 过敏体质者
- D: 门诊患者

答案：C

28. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 索引的完备程度
- B: 检索路径及费用
- C: 出版或更新的频率
- D: 引用参考文献的质量

答案：D

29. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间是

- A: 3~7 日

B: 1~3 日

C: 10 日

D: 3~5 日

答案：A

30. 结核病化学治疗的基本原则是（）

A: 早期、单一、足量、规律、全程

B: 早期、联合、足量、规律、全程

C: 早期、单一、适量、规律、全程

D: 早期、联合、适量、规律、全程

答案：D

31. 患者，女，52 岁，患骨质疏松症伴静脉血栓，该患者避免使用的治疗药是

A: 鲑鱼降钙素

B: 雷洛昔芬

C: 阿仑膦酸钠

D: 特立帕肽

答案：B

32. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

A: 哌唑嗪口服

B: 硝苯地平口服

C: 硝普钠静滴

D: 卡托普利口服

答案：C

33. 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法错误的是()

A: 避免使用含碘药物

B: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料

C: 妊娠伴甲状腺功能亢进症患者宜选甲巯咪唑

D: 禁食富含碘的食物

答案：C

34. 秋水仙碱具有严重的毒副作用，痛风急性发作期使用秋水仙碱治疗时，出现严重中毒前驱症状应立即停药，停药指征是

A: 血小板减少

B: 紫癜

C: 肌肉抽搐

D: 胃肠道反应

答案：D

35. 脑出血急性期体位应注意的是()

A: 抬高床头 15-30°

B: 俯卧位

C: 侧卧位

D: 仰卧位

答案：A

36. 用于有机磷中毒早期解除胆碱酯酶与有机磷结合的药物是

A: 毛果芸香碱

B: 阿托品

C: 亚甲蓝

D: 碘解磷定

答案: D

37. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次 / 分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 药用炭

B: 小檗碱

C: 鞣酸蛋白

D: 洛哌丁胺

答案: D

38. 药师在审核处方时,无需要求确认或重新开处方的情形是()

A: 诊断为麻疹,使用阿莫西林抗感染治疗

B: 将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上

C: 给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲

D: 头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒

答案: B

39. (2018 年真题) 患者,女,49 岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下:

A: 甲硝唑餐后服用

B: 甲硝唑餐前服用

C: 铋剂餐后服用

D: 质子泵抑制剂餐后服用

答案：A

40. 应在睡前服用，疗效较好的是

A: 硫酸镁

B: 沙丁醇胺

C: 维生素 B1

D: 噻氯匹定

答案：B

41. 《国家非处方药目录》收载的缓泻药不包括

A: 比沙可啶

B: 替加色罗

C: 硫酸镁

D: 聚乙二醇粉剂

答案：B

42. 患者，女 67 岁出现认知功能障碍 5 年，诊断为阿尔茨海默病，予以美金刚治疗。下列药物中，可增加美金刚血药浓度的是（）

A: CYP3A4 制剂

B: 氯化铵

C: 碳酸氢钠

D: CYP2D6 抑制剂

答案：C

43. 某女性，45 岁，肥胖多年，自觉口渴、消瘦 5 个月，尿糖阳性，空腹血糖 8.9mmol/L，餐后两小时血糖 15.1mmol/L

A: 甲状腺功能亢进症

B: 2 型糖尿病

C: 1 型糖尿病

D: 肥胖症

答案：B

44. 三环类抗抑郁药中毒的临床表现是（）

A: 谵妄、躁狂、幻觉

B: 明显的锥体外系症状

C: 心血管毒性

D: 肌肉震颤、抽搐

答案：C

45. （2017 年真题）患者男，70 岁，典型的“面具脸”“慌张步态”表现，临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是（）

A: 卡比多巴

B: 苯海索

C: 普拉克索

D: 甲基多巴

答案：B

46. 可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

A: 替考拉宁

B: 头孢洛林

C: 克拉霉素

D: 阿莫西林

答案：C

47. 患者，女，33 岁，患有高铁血红蛋白血症，可选用的治疗药物是

- A: 青霉胺
- B: 亚甲蓝
- C: N-乙酰半胱氨酸
- D: 纳洛酮

答案：B

48. 脂溶性维生素 A 宜餐后服用的原理是

- A: 餐后胃酸分泌增多有利于吸收
- B: 利用油脂增加其溶解
- C: 延长在胃肠道中的滞留时间
- D: 减少被胃酸破坏

答案：B

49. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度中度贫血为

- A: 90～120g / L
- B: 60～90g / L
- C: 120～160g / L
- D: 30～60g / L

答案：B

50. （2019 年真题）下列药物中，使用前无需皮试的是

- A: 紫杉醇注射剂
- B: 抗狂犬病血清注射剂
- C: 苄星青霉素注射剂
- D: 抑肽酶注射剂

答案：A

51. 用于用药错误分级的是（）

- A: NCEMERP 标准
- B: CLHD 公式
- C: CoCkroft-GAut 公式
- D: CoChrAnE 分级

答案：A

52. 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史 3 年，临床上对该患者不宜选用：

- A: 司来吉兰
- B: 苯海索
- C: 左旋多巴
- D: 多巴丝肼

答案：B

53. 选择的前提是

- A: 药物治疗的有效性
- B: 药物治疗的安全性
- C: 药物治疗的方便性
- D: 药物治疗的规范性

答案：B

54. 蛇胆川贝液不宜联用的是

- A: 可待因
- B: 氢氧化铝
- C: 苯巴比妥
- D: 阿托品

答案：A

55. 滴虫性阴道炎

A: 庆大霉素

B: 甲硝唑

C: 咪康唑

D: 聚甲酚磺醛

答案：B

56. 甲状腺功能亢进患者服用丙硫胺嘧啶，可引起的典型药源性疾病是
()

A: 溶血性贫血

B: 消化性溃疡

C: 粒细胞减少症

D: 慢性肾衰竭

答案：C

57. 融合抑制剂

A: 利托那韦

B: 齐多夫定

C: 利巴韦林

D: 依非韦伦

答案：C

58. 某患者，女性，57 岁，高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持剂量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

A: 苯妥英钠

B: 利多卡因

C: 肾上腺素

D: 阿托品

答案: D

59. 以下中毒解救措施中，正确的药物拮抗是

A: 弱酸中和强碱

B: 阿托品拮抗颠茄碱类中毒

C: 二巯丙醇结合铅

D: 二巯丙醇拮抗亚硝酸钠

答案: A

60. 查找药物信息的正确顺序是()。

A: 二级信息源→三级信息源→一级信息源

B: 一级信息源→二级信息源→三级信息源

C: 二级信息源→一级信息源→三级信息源

D: 三级信息源→二级信息源→一级信息源

答案: D

61. 临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

A: 观察时间短

B: 管理漏洞

C: 考察不全面

D: 病例数目少

答案: C

62. 患活动性消化性溃疡，禁用的调脂药是

- A: 烟酸类
- B: 辛伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 氯贝丁酯

答案：A

63. 下列药物中属于溶栓药物的是（）

- A: 利伐沙班
- B: 华法林
- C: 血凝酶
- D: 阿替普酶

答案：D

64. 关于尿蛋白和尿葡萄糖的叙述正确的是

- A: 正常情况下，人体尿液中的尿蛋白含最和尿葡萄糖含量都极微
- B: 当人体肾脏的肾小球通透能力下降时会出现蛋白尿
- C: 尿液中出现葡萄糖只取决于血糖水平的高低
- D: 出现蛋白尿时即表明机体出现病理性变化

答案：A

65. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV₁/FVC60%，FEV₁55%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid ivgtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid ivgtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 氨溴索注射液
- B: 布地奈德混悬液
- C: 硝苯地平控释片
- D: 异丙托溴铵注射液

答案：D

66. (用药导致的血常规异常)阿司匹林

- A: 血红蛋白量增多
- B: 血小板减少
- C: 嗜酸性粒细胞减少
- D: 中性粒细胞减少

答案：B

67. 连续应用抗菌药物 / 糖皮质激素眼用制剂的时间不宜超过

- A: 7 天
- B: 3 天
- C: 10 天
- D: 5 天

答案：C

68. 雷尼替丁

- A: 可导致驾驶员多尿或多汗
- B: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- C: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- D: 可使驾驶员出现定向力障碍

答案：D

69. (2021 年真题) 头孢曲松钠与乳酸钠林格注射液直接混合, 可导致
()

- A: 产生气体
- B: 产生胶状不溶物
- C: 微浑浊或沉淀
- D: 溶液变色

答案: C

70. 嗜酸性粒细胞正常参考区间是

- A: 0.03~0.08
- B: 0.005~0.05
- C: 0~0.01
- D: 0.20~0.40

答案: B

71. 乙醇+呋喃唑酮

- A: 造成听神经和肾功能不可逆性损害
- B: 抑制氧化代谢反应
- C: 抑制乙醛脱氢酶
- D: 产生有利的药物相互作用

答案: C

72. 有较强刺激性, 服药时不可嚼碎的泻药是

- A: 硫酸镁
- B: 比沙可啶
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 双歧杆菌

答案：B

73. 增加出血危险的配伍用药是

- A: 氨基糖苷类抗生素联用依他尼酸
- B: 山莨菪碱联用盐酸哌替啶
- C: 肝素钠联用阿司匹林
- D: 普萘洛尔联用硝酸酯类

答案：C

74. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为

- A: 糖耐量异常
- B: 高密度脂蛋白降低
- C: 低密度脂蛋白升高
- D: 甘油三酯降低

答案：A

75. 为氧化剂，不能用于乐果中毒的洗胃液是

- A: 3%鞣酸溶液
- B: 淀粉溶液
- C: 活性炭混悬液
- D: 1: 5000 高锰酸钾

答案：D

76. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

- A: 服药后预计起效时间及维持时间

- B: 首次剂量、维持剂量以及用药间隔
- C: 合理用药信息
- D: 注射剂配制溶媒、浓度

答案：C

77. PBG 高者宜选用的是

- A: 格列喹酮
- B: 甲苯磺丁脲
- C: 格列吡嗪控释片
- D: 格列本脲

答案：A

78. 不宜咀嚼或吞服，以免影响药物剂型设计目的是

- A: 粉剂
- B: 糖浆剂
- C: 胶囊剂
- D: 舌下片

答案：D

79. 患者,男,56 岁,体检发现血尿酸 $530 \mu\text{mol/L}$ (参考值 $<420 \mu\text{mol/L}$),患者向药师咨询维生素使用问题,药师应告知患者可引起尿酸升高的维生素是()

- A: 维生素
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 B6

答案：A

80. 患者，男，46 岁，因类风湿性关节炎长期使用免疫抑制剂，近日因出现发热、咳嗽、咳痰入院经病原学检查，诊断为侵袭性肺曲霉病，临床欲使用伏立康唑治疗。患者同时合并肝功能不全 Child-TurcottePugh(CTP) 评分为 13 分(CTPC 级)。根据 CTP 评分结果，药师的用建议是()

- A: 该患者中度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 50%
- B: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 25%
- C: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量不变
- D: 该患者重度肝功能不全，不建议使用伏立康唑

答案：D

81. (2017 年真题) 高脂饮食可促进其吸收的药物是 ()

- A: 维 A 酸片
- B: 非洛地平片
- C: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- D: 左旋多巴片

答案：A

82. 下列疾病中，WHO 视为艾滋病最常见的机会性感染的是

- A: 结核病
- B: 肺炎
- C: 卡氏肉瘤
- D: 腹泻

答案：A

83. 阿司匹林和华法林合用时易导致的不良反应是

- A: 戒断症状
- B: 心跳加快

C: 出血

D: 粒细胞缺乏症

答案：C

84. 缺铁性贫血患者常表现为()

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 红细胞增多

C: 中性粒细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案：D

85. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

A: D 级

B: A 级

C: B 级

D: C 级

答案：C

86. (2017 年真题) 患者, 女, 24 岁。一周前曾有同事患有沙眼系衣原体感染后发现自己出现眼红、眼痒等不适, 来药店购药, 药师可推荐的药物是 ()

A: 酞丁安滴眼液

B: 色甘酸钠滴眼液

C: 玻璃酸钠滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/275024034122012033>