

2023 全国结核病临床诊断技能竞赛（基础知识）

一、判断题

1. 结核分枝杆菌是 1882 年由德国细菌学家罗伯特•柯赫（Robert Koch）发现的。

A、对

B、错

原则答案：A

2. 中国是全球结核病高承担国家，肺结核发病人数和发病率居全球第二位。

A、对

B、错

原则答案：B

3. 传染病网络直报系统搜集肺结核治疗转归成果

A、对

B、错

原则答案：B

4. 结核杆菌细长、微弯、无鞭毛、无芽孢，有分枝生长的倾向，对酸性酒精的脱色有很强的抵

御力，显微镜下呈红色杆菌，故被命名为抗酸杆菌。

A、对

B、错

原则答案：A

5. 试验室检查痰涂片抗酸染色阳性肯定是活动性结核病。

A、对

B、错

原则答案：B

6. 结核病免疫应答方式以体液免疫为主、细胞免疫为辅。

A、对

B、错

原则答案：B

7. 痰涂片阳性肺结核患者的传染性强于痰涂片阴性的肺结核患者。

A、对

B、错

原则答案：A

8. 液体培养法一般比固体培养法检测分枝杆菌的敏捷度更高。

A、对

B、错

原则答案：A

9. WHO 提议初治肺结核患者抗结核治疗首选隔日给药方式，以减少服药次数，增长患者对治疗的依从性。

A、对

B、错

原则答案：B

10. 血脑屏障通透性最佳的一线抗结核药物是异烟肼（INH）和利福平（RFP）。

A、对

B、错

原则答案：B

11. 一线抗结核药物中仅有吡嗪酰胺（PZA）可以引起机体嘌呤代谢障碍，出现痛风样关节痛。

A、对

B、错

原则答案：B

12. γ -干扰素释放试验可用于辨别结核分枝杆菌潜伏感染与发病。

A、对

B、错

原则答案：B

13. 患者出现药物性肝损害时，应停用所有抗结核药物，予以保肝治疗。

A、对

B、错

原则答案：B

14. 利福平耐药的结核病患者应当使用利福布汀治疗

A、对

B、错

原则答案：B

15. 耐多药结核病治疗转归中的“完治治疗”是指患者完治疗程、无治疗失败证据，且在强化期结束后没有证据显示持续 3 次或以上痰培养阴性，每次培养间隔至少 30 天。

A、对

B、错

原则答案：A

16. 耐多药结核病（MDR-TB）是指至少患者感染的结核分枝杆菌对一线抗结核药物异烟肼和利福平同步耐药的结核病。

A、对

B、错

原则答案：A

17. 患者出现不明原因的持续咳嗽、呼吸困难、声音嘶哑、影像学显示肺不张时，应考虑申请气管镜检查。

A、对

B、错

原则答案：A

18. 贝达喹啉通过与结核分枝杆菌 ATP 合成酶相结合而发挥杀菌及灭菌活性。

A、对

B、错

原则答案：A

19. 利福平为肝微粒酶克制剂

A、对

B、错

原则答案：B

20. 小朋友耐多药结核病患者应严格禁用左氧氟沙星。

A、对

B、错

原则答案：B

二、单项选择题

21. 《中华人民共和国传染病防治法》中，肺结核病被列为（ ）传染病。

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、乙类参照甲类管理

E、丙类参照乙类管理

原则答案：B

22. 对于确诊的结核病患者，定点医疗机构应在多长时间内在结核病专报系统上完毕患者病案信息的录入？

- A、6 小时
- B、12 小时
- C、24 小时
- D、48 小时
- E、72 小时

原则答案：C

23. 我国结核病疫情的地辨别布是：

- A、西部最高，东部最低
- B、都市高于农村
- C、发达地区流感人口多，疫情高
- D、中部地区疫情最低
- E、HIV 疫情高的地区结核病疫情高

原则答案：A

24. 全国结核病防治规划规定初治肺结核患者在治疗过程中（至少）应当在哪个时间点查痰？

- A、治疗过程中每月查一次，共 6 次
- B、治疗过程中每 2 个月查一次，共 3 次
- C、治疗满 1 个月、满 2 个月各查一次，共 2 次
- D、治疗满 2、5、6 月时查痰，共 3 次
- E、治疗满 1、3、6 月时查，共 3 次

原则答案：D

25. “十三五”全国结核病防治规划提出到 2023 年全国结核病发病率下降到（ ）如下的目的。

- A、58/10 万
- B、55/10 万
- C、63/10 万
- D、70/10 万
- E、以上都不对

原则答案：A

26. 下列有关全球和我国结核病疫情的说法，错误的是

- A、估算全球每年新发肺结核患者约 1000 万例，其中我国约 90 万例
- B、估算全球每年新发 MDR/RR-TB 患者约 56 万例，其中我国约 7.3 万例

C、印度、中国、印度尼西亚是全球结核病承担最重的三个国家

D、中国 HIV/AIDS 总体属于低流行，不属于 WHO 确定的 TB/HIV 双重感染高承担国家

E、近年，全球和我国的结核病发病率均呈缓慢下降趋势

原则答案：D

27. 与其他细菌相比，分枝杆菌最具特殊性的细胞构造是

A、细胞壁

B、细胞膜

C、细胞质

D、细胞核

E、细胞器

原则答案：A

28. γ -干扰素释放试验（IGRA）比 PPD 皮肤试验特异性高的重要原因是

A、抗原数量较少

B、应用的抗原纯度高

C、常用的抗原免疫原性强

D、IGRA 是一种体外试验

E、与卡介苗不存在交叉免疫反应

原则答案：E

29. 如下不属于慢生长分枝杆菌的是

A、鸟分枝杆菌

B、胞内分枝杆菌

C、脓肿分枝杆菌

D、堪萨斯分枝杆菌

E、牛型分枝杆菌

原则答案：C

30. 乙胺丁醇耐药有关基因是

A、rpsL

B、pncA

C、ahpC

D、embB

E、inhA

原则答案：D

31. 如下有关结核分枝杆菌描述不对的是

- A、对乙醇敏感
- B、对湿热敏感
- C、对紫外线敏感
- D、对干燥敏感
- E、对高温敏感

原则答案：D

32. 合适环境下结核分枝杆菌繁殖一代所需的时间约为()

- A、10~20 分钟
- B、2~3 小时
- C、18~24 小时
- D、2~3 天
- E、2~3 周

原则答案：C

33. 对结核分枝杆菌 A 菌群作用最强的抗结核药物是

- A、异烟肼

B、利福平

C、吡嗪酰胺

D、链霉素

E、乙胺丁醇

原则答案：A

34. 合并糖尿病视网膜病变的结核病患者，禁用下列哪种抗结核药物

A、RFP

B、EMB

C、PAS

D、PZA

E、INH

原则答案：B

35. 下列哪组药物均可引起精神障碍、自杀倾向

A、异烟肼、吡嗪酰胺、丁胺卡那

B、异烟肼、利福平、对氨基水杨酸钠

C、对氨基水杨酸钠、丙硫异烟胺、环丝氨酸

D、异烟肼、丙硫异烟胺、环丝氨酸

E、 异烟肼、克拉霉素、氯法齐明

原则答案：D

36. 可引起电解质紊乱的药物是

A、吡嗪酰胺

B、对氨基水杨酸钠

C、丙硫异烟胺

D、卷曲霉素

E、氯法齐明

原则答案：D

37. 如下哪种抗结核药物发生肝损伤的频率最低

A、PAS

B、Cs

C、Pto

D、PZA

E、RFB

原则答案：B

38. 如下哪种抗结核药物可导致患者视神经损伤

A、RFB

B、Lzd

C、Bdq

D、Mfx

E、Cm

原则答案：B

39. 肺结核确诊病例的诊断原则包括

A、具有经典的结核病临床体现

B、胸部 CT 显示斑片影

C、PPD 强阳性

D、病理学检查显示肉芽肿性炎伴干酪样坏死

E、排除其他肺部疾病

原则答案：D

40. 根据我国结核病防治规划的规定，复治涂阳、药物敏感肺结核患者的推荐化疗方案为

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/275223001140011240>