

2024 年浙江省柯桥区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题通关秘籍题库含答案【B 卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可提示骨骼疾病的是

- A: A/G 值低于 1
- B: γ -谷氨酰转移酶升高
- C: 血清碱性磷酸酶升高
- D: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高

答案：C

2. 饮食对粪外观的影响,食巧克力、咖啡

- A: 黑褐色
- B: 红色
- C: 暗绿色
- D: 酱色

答案：D

3. 可引起再生障碍性贫血

- A: 抗组胺药
- B: 氯霉素
- C: 苯妥英钠
- D: 维生素 A

答案：B

4. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常。

A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑)、枸橼酸铋钾

B: 阿莫西林、克拉霉素

C: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑)、克拉霉素

D: 枸橼酸铋钾、左氧氟沙星

答案：A

5. 粪外观所对应的疾病，阻塞性黄疸

A: 柏油便，黑色有光泽

B: 米泔水样

C: 暗红果酱色

D: 白陶土便

答案：D

6. (2018 年真题) 患者，女，45 岁，6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁，在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好，近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱，该患者各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A: 地西洋

B: 苯巴比妥

C: 卡马西平

D: 丙戊酸钠

答案：D

7. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药物不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；ADR 因果关系可评价为

- A: 很可能
- B: 可能无关
- C: 可能
- D: 待评价

答案：C

8. 服用药物对粪外观的影响，水杨酸钠

- A: 橘红至红色
- B: 黄色
- C: 变红或黑色
- D: 红至黑色

答案：D

9. 支气管哮喘急性发作期（轻度）可选用的药物是

- A: 异丙托溴铵
- B: 沙丁胺醇
- C: 沙美特罗
- D: 地塞米松

答案：B

10. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 磺胺类药

B: 华法林

C: 氯霉素

D: 四环素

答案: B

11. 可提示肝细胞性黄疸的是

A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

C: $>342 \mu\text{mol/L}$

D: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案: A

12. 双膦酸盐属于

A: 骨形成刺激剂

B: 促进骨矿化剂

C: 激素替代剂

D: 骨吸收抑制剂

答案: D

13. 不宜肌肉注射或直接静脉注射，滴注速度过快容易导致红人综合征的药物是

A: 阿奇霉素

B: 万古霉素

C: 链霉素

D: 磷霉素

答案: B

14. 下列药物中，药师需要提示患者随身携带的是

- A: 甲硝唑片
- B: 胰酶肠溶胶囊
- C: 高锰酸钾片
- D: 硝酸甘油片

答案：D

15. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法,错误的是()

- A: 应尽可能单一用药,足量、足疗程治疗
- B: 当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
- C: 剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小
- D: 抗抑郁药起效较快,使用 1 周后可判疗效

答案：D

16. 育龄人群慎用,否则可引起畸胎、肿瘤和溶血性贫血风险的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 人促红素
- C: 脂肪乳
- D: 阿昔洛韦

答案：A

17. 应用华法林抗凝治疗时,患者应该控制的国际标准化比值为

- A: >3.0
- B: <2.0
- C: $2.0\sim2.5$
- D: $2.0\sim3.0$

答案：D

18. 属于多巴胺受体激动剂的是

- A: 普拉克索
- B: 苯海索
- C: 恩托卡朋
- D: 司来吉兰

答案：A

19. 可引起驾驶员视物模糊的药物是

- A: 双嘧达莫
- B: 阿米洛利
- C: 东莨菪碱
- D: 抗过敏药

答案：C

20. 属于一级文献的是

- A: 《中国药学文摘》
- B: 《国际药学文摘》
- C: 《中文科技资料目录：中草药》
- D: 《中国新药》

答案：D

21. 在骨骼疾病的诊断酶学中最重要的是

- A: ACP
- B: ALP
- C: CK
- D: LDH

答案：B

22. PDR 是由美国医学经济公司和 ThomsonHealthcare 公司编辑出版的药品集，每年综合汇编 1 册，主要介绍

- A: 美国临床常用的药品
- B: 美国市场上的常用处方药
- C: 各国市场上的常用处方药
- D: 美国市场上的药品

答案：B

23. 老年糖尿病患者不建议使用

- A: 噻唑烷二酮类
- B: 双胍类
- C: 长效磺脲类
- D: α -葡萄糖苷酶抑制剂

答案：C

24. 可能诱发心血管脑病、引起肝癌、肾癌的是

- A: 肽激素类
- B: 易制毒药品
- C: 精神刺激剂
- D: 蛋白同化制剂

答案：D

25. 以下药品中，归属妊娠毒性药物 X 级的是

- A: 链霉素
- B: 更昔洛韦
- C: 他汀类降脂药
- D: 甲巯咪唑

答案：C

26. 用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

- A: 药品适应证
- B: 新药信息
- C: 治疗药物监测
- D: 自我保健

答案：A

27. 淡黄色处方作为

- A: 儿科处方
- B: 普通处方
- C: 麻醉药品和第一类精神药品处方
- D: 急诊处方

答案：D

28. 适用于阿司匹林哮喘伴有过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 孟鲁司特钠咀嚼片
- C: 茶碱片
- D: 异丙托溴铵气雾剂

答案：B

29. 处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A: 无适应证用药
- B: 有配伍禁忌
- C: 用法、用量或联合用药不适宜
- D: 未使用药品规范名称

答案：D

30. 对目标适应证患者(多中心试验)治疗作用的初步评价试验阶段，属于

- A: IV期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: II 期临床试验
- D: III期临床试验

答案：C

31. 具有中枢和周围抗多巴胺双重作用的是

- A: 西沙必利
- B: 甲氧氯普胺
- C: 莫沙必利
- D: 多潘立酮

答案：B

32. 吩噻嗪类抗精神病药中毒癫痫发作时给予 ()

- A: 阿托品
- B: 去甲肾上腺素
- C: 苯妥英钠
- D: 有机硫类

答案：C

33. 缺血性脑卒中的二级预防用药中不包括（）

- A: 依达拉奉
- B: 缬沙坦
- C: 阿司匹林
- D: 阿托伐他汀

答案：A

34. 患者术后，给予肠外营养液 10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳 250ml、8.5%复方氨基酸 750ml、水溶性维生素 10ml、脂溶性维生素 10ml、微量元素 10ml、10%氯化钠注射液 40ml、10%氯化钾注射液 30ml

- A: 200kcal
- B: 700kcal
- C: 1150kcal
- D: 450kcal

答案：B

35. （2018 年真题）干眼症可选用（）

- A: 氧氟沙星滴眼液
- B: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- C: 玻璃酸钠滴眼液
- D: 色甘酸钠滴眼液

答案：C

36. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。体检：身高 160cm，体重 78kg。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，白细胞 $8.0 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0-10.0 \times 10^9/L$ ），红细胞 $4.0 \times 10^{12}/L$ （参考值 $3.55-5.0 \times 10^{12}/L$ ），总胆固醇 6.0mmol/L（参考值 $<5.2 \text{ mmol/L}$ ）。经饮食控制，规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

- A: 胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 格列齐特

答案：B

37. 患者，男，18 岁，因鼻塞症状就诊，医生处方 1% 盐酸麻黄碱滴鼻液。下列关于该滴鼻液用药指导的说法，错误的是()

- A: 滴鼻后，要静卧 3~5 分钟
- B: 萎缩性鼻炎患者可增加给药次数
- C: 滴管头不要碰到鼻部，以避免污染药液
- D: 用药前要将鼻腔分泌物清理干净

答案：B

38. 据统计，全国高血压患者已经超过 2 亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病，而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有用药物治疗，接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅三成左右。高血压死亡率不断升高。熟悉高血压及相关用药，对更有效地治疗高血压非常重要。

- A: 硝苯地平口服
- B: 硝普钠静滴
- C: 卡托普利口服
- D: 哌唑嗪口服

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

39. 在指导合理用药时，应交代宜在睡前服用的药物是()

- A: 辛伐他汀
- B: 硫酸亚铁
- C: 苯妥英钠
- D: 双磷酸盐

答案：A

40. 尽可能避免使用小数，是指

- A: 医嘱清楚准确
- B: 实现个体化治疗
- C: 医嘱完整不漏项
- D: 修订医嘱及时沟通

答案：A

41. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇片 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋、话不成句，被紧急送往医院。

- A: 沙丁胺醇片
- B: 布地奈德气雾剂
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 沙美特罗-氟替卡松干粉吸入剂

答案：C

42. 是归纳、综合、整理后的出版物，使用最为广泛

- A: 三级文献源
- B: 研究论文
- C: 药学网络
- D: 二级文献

答案：A

43. 流行性出血性结膜炎宜选用

- A: 羟苄唑
- B: 益康唑
- C: 酞丁安
- D: 双氯芬酸

答案：A

44. 属于质子泵抑制剂的是（）

- A: 埃索美拉唑
- B: 铝碳酸镁
- C: 多潘立酮
- D: 法莫替丁

答案：A

45. 透析患者宜在两餐中间服用的药物是

- A: 磷结合剂
- B: 促红细胞生成素
- C: 维生素 D
- D: 铁剂

答案：D

46. 用于房颤时控制心室率的药物是

- A: 卡托普利
- B: 胺碘酮
- C: 缬沙坦
- D: 维拉帕米

答案：D

47. 患者，女，20 岁，长期服用对乙酰氨基酚缓解痛经，为降低药物的肝毒性，可联合使用

A: 青霉胺

B: 亚甲蓝

C: 纳洛酮

D: N-乙酰半胱氨酸

答案：D

48. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 阿莫西林 1000mgbid+克拉霉素 500mgbid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

B: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mgbid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

C: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid, 疗程 2 周

D: 克拉霉素 500mgbid+左氧氟沙星 200mgbid+甲硝唑 400mgqid+艾司奥美拉唑 20mgbid, 疗程 2 周

答案: B

49. 皮肤接触腐蚀性毒物，须用中和液或解毒液冲洗，且冲洗的时间要达

A: 20~30min

B: 15~30min

C: 5~10min

D: 10~20min

答案: B

50. 另有儿童处方集、护士处方集的是

A: 《医师案头参考》

B: 《中国国家处方集（2010 年版）》

C: 《国家基本药物处方集（2012 年版）》

D: 《英国国家处方集》

答案: D

51. 高三酰甘油血症，首选的治疗药物是

A: ω -3 脂肪酸制剂

B: 他汀类

C: 贝特类

D: 烟酸类

答案: C

52. 对反复发作的短暂性脑缺血发作患者首选 ()

- A: 阿司匹林
- B: 辛伐他汀
- C: 华法林
- D: 巴曲酶

答案: A

53. 重量比重量百分浓度系指 100g 溶液中所含溶质的克数，以符号

- A: %(g/g) 表示
- B: %(g/ml) 表示
- C: %(ml/ml) 表示
- D: %(ml/g) 表示

答案: A

54. 高血压合并心肌梗死首选 ()

- A: 氢氯噻嗪
- B: 卡托普利
- C: 硫酸镁
- D: 特拉唑嗪

答案: B

55. 有机氟杀虫农药中毒的特效解毒剂是

- A: 碘解磷定
- B: 维生素 K
- C: 毒扁豆碱
- D: 乙酰胺

答案: D

56. (2015 年真题) 处方中“餐后给药”的外文缩写是 ()。

A: po

B: qn

C: pc

D: Ac

答案: C

57. 铁剂联用维生素 C

A: 延缓或降低抗药性

B: 协同作用

C: 促进机体的利用

D: 作用不同的靶点

答案: C

58. 可帮助人短时间内急速降低体重的是

A: 蛋白同化激素

B: 肽类激素

C: 利尿剂

D: 麻醉药品

答案: C

59. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

A: 肝功能异常

B: 高血脂

C: 高血压

D: 腹胀

答案：A

60. 处方正文书写的内容是

A: 患者姓名

B: 药师签名

C: 药品通用名

D: 医师签名

答案：C

61. 某患者，男，78 岁，既往有动脉粥样硬化史，因尿频、尿急就诊。体征和实验室检查结果：血压 166/98mmHg，前列腺增生>60g，前列腺特异性抗原(PAS)正常。在控制患者血压的同时，应联合选用

A: 吲达帕胺

B: 泼尼松龙

C: 丙酸睾酮

D: 非那雄胺

答案：D

62. 服用维生素 B1、维生素 B2、烟酸等应该禁用的饮食是

A: 脂肪

B: 食醋

C: 酒

D: 食盐

答案：C

63. 典型结核病的临床表现错误的是

- A: 咳嗽
- B: 乏力
- C: 高热
- D: 食欲减退

答案：C

64. 高血压合并冠心病，偶发窦性心动过速宜选用的药物是

- A: 缬沙坦
- B: 美托洛尔
- C: 氢氯噻嗪
- D: 非洛地平

答案：B

65. 老年高血压高血压患者的降压目标

- A: <150 / 90mmHg
- B: <120 / 80mmHg
- C: <130 / 80mmHg
- D: <140 / 90mmHg

答案：A

66. 患者女，68 岁体重 54kg，因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院，入院后生化检查 ALT20IU/L，血肌酐(Cr)1.8mg/dL，痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g，分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g；肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g；肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g；肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

- A: 40ml/min
- B: 34ml/min
- C: 25.5ml/min
- D: 30ml/min

答案：C

67. 女，30 岁。G2P1 既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。

- A: 阻止精子与卵子相遇
- B: 影响受精卵着床
- C: 抑制卵巢排卵
- D: 改变宫颈黏液性状

答案：B

68. 可改善睫状肌功能和增加睫状肌血流量，改善眼部调节功能的药物是

- A: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- B: 玻璃酸钠滴眼液
- C: 聚乙烯醇滴眼液
- D: 羟甲基纤维素钠滴眼液

答案：A

69. 无吞噬功能，但细胞颗粒中含有许多生物活性物质如肝素、组胺、慢反应物质等的细胞为

- A: 嗜碱性粒细胞
- B: 嗜酸性粒细胞
- C: 中性粒细胞
- D: 淋巴细胞

答案：A

70. 艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗，俗称”鸡尾酒疗法”，目前国内免费治疗的一线方案是（）

- A: 替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦
- B: 拉米夫定+替诺福韦+齐多夫定
- C: 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平
- D: 齐多夫定+依非韦伦+利托那韦

答案：C

71. 新生儿的相对总体液量比成人高，体液占体重

- A: 75%~80%
- B: 72%~80%
- C: 70%~80%
- D: 75%~85%

答案：A

72. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整方法，错误的是：

- A: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用双通道(肝肾)消除的药物
- B: 肾功能不全者首选肝胆代谢和排泄的药物
- C: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量
- D: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠来碱化尿液，以促进药物排泄，防止药源性疾病

答案：D

73. 在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为（）

- A: 胃黏膜血流减少

B: 胃酸

C: 胃黏膜屏障的完整性

D: H. pylori 感染

答案：B

74. 针对儿童用药的一般原则，下列叙述不正确的是（）。

A: 要按规定用量服药

B: 明确诊断，严格掌握适应证

C: 要根据儿童特点选择适宜的给药方案

D: 根据儿童的不同阶段严格掌握用药剂量

答案：A

75. （2015 年真题）易经乳汁分泌的药物的特征是（）。

A: 脂溶性大

B: 弱酸性

C: 分子量大

D: 蛋白结合率高

答案：A

76. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A: 复方消化酶制剂送服时不宜用热水

B: 助消化药与吸附剂合用须间隔 2~3h

C: 胰酶口服时应嚼碎服用

D: 多潘立酮可能引起心脏相关风险

答案：C

77. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$

- A: 急性肾小球肾炎
- B: 慢性肾盂肾炎
- C: 急性膀胱炎
- D: 急性肾盂肾炎

答案：D

78. 患者，女，77 岁，53kg，既往糖尿病病史 10 年，因“反复尿路感染 4 个月，加重 3 天”来院就诊。4 个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在 37.2℃~37.5℃之间，自服左氧氟沙星片 0.29bid 治疗 5 天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3 天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星 0.29bid 治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数 463.2 / g1，细菌计数 1262.1 / μ l。查体：T37.9℃P86 次 / 分 R21 次 / 分 BP132 / 77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数 $12.35 \times 10^9 / L$ 、中性粒细胞百分比 86.5%，CRP69.5mg / L。血生化：AST15U / L，ALT11U / L，ALB43.29 / L，Scr669 μ mol / L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数 $>10^5$ cfu / ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

- A: 1.5gq8h
- B: 4.5gqd
- C: 1.5gqd
- D: 4.5gq8h

答案：D

79. 饮水冲淡药物对感受器的刺激是指

- A: 利胆药
- B: 舌下片（丸）
- C: 苦味健胃药
- D: 抗利尿药

答案：C

80. 和含铁或钙离子的药物合用后，在胃肠道可以发生络合反应而导致生物利用度降低的药物是

- A: 多潘立酮
- B: 利福平
- C: 左氧氟沙星
- D: 丙磺舒

答案：C

81. 血管紧张素转化酶抑制剂

- A: 阿利吉仑
- B: 依普利酮
- C: 雷米普利
- D: 阿米洛利

答案：C

82. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 假性痛风
- B: 类风湿关节炎
- C: 风湿性关节炎
- D: 痛风

答案：D

83. 可能引起肺间质病变的药物是（）

- A: 硫唑嘌呤
- B: 柳氮磺吡啶
- C: 甲氨蝶呤
- D: 羟氯喹

答案：C

84. 属于蛋白酶抑制剂的是（）

- A: 利托那韦
- B: 齐多夫定
- C: 依非韦伦
- D: 利巴韦林

答案：A

85. 会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生欣快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力的药物是

- A: 利血平
- B: 可卡因
- C: 阿米替林
- D: 异戊巴比妥

答案：B

86. 适用于伴发膀胱过度活动症的良性前列腺增生症的是（）

- A: 奥昔布宁
- B: 非那雄胺

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 特拉唑嗪

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/275233244311012033>