2024河北省赤城县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库大全及答案下载

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患者，女，20岁，长期服用对乙酰氨基酚缓解痛经，为降低药物的肝毒性，可联合使用

A：纳洛酮

B：N-乙酰半胱氨酸

C：亚甲蓝

D：青霉胺

答案：B

2.阿司匹林可导致

A：肾小球滤过率下降

B：前列腺素合成障碍

C：结晶沉积

D：不可逆性肾小管坏死

答案：B

3.1日1次用药的外文规范缩写是

A：qod

B：qn

C：qd

D：qh

答案：C

4.患儿，男，6个月，体重9．0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 维生素A

B: 维生素C

C: 维生素B12

D: 维生素D3

答案：D

5.增加胃肠蠕动，影响同服药物吸收

A: 多潘立酮+维生素C

B: 西咪替丁+格列本脲

C: 四环素+硫酸亚铁

D: 青霉素+丙磺舒

答案：A

6.治疗缺铁性贫血给予元素铁

A: 日服180mg

B: 日服80mg

C: 日服0.05mg

D: 日服30～40mg

答案：A

7.患过敏性疾病的驾驶员可选用的药物是

A: 异丙嗪

B: 赛庚啶

C: 苯海拉明

D: 氯雷他定

答案：D

8.患者，男，72岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

A: 比索洛尔

B: 硝酸异山梨酯舌下片

C: 普伐他汀

D: 氯吡格雷

答案：B

9.ADR与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药ADR不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现；可评价为

A: 待评价

B: 可能

C: 可能无关

D: 很可能

答案：C

10.患者,女,68岁,体重45kg,因发热、咳嗽咳痰入院治疗,临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果:白细胞计数11.76×109/L,肌酐清除率18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是()

A: 左氧氟沙星

B: 头孢噻肟钠

C: 阿莫西林

D: 莫西沙星

答案：D

11.对某些患者应教会正确量取内服液体制剂，是针对

A：交代药物的用量

B：交代用药途径及用药方法

C：交代用药注意事项

D：交代药品贮存条件与方法

答案：A

12.“以最低的药物成本，实现最好的治疗效果”体现选择治疗药物的

A：方便性

B：有效性

C：经济性

D：安全性

答案：C

13.正常情况下，人血白细胞群体中所占比例最多的分类细胞是

A：单核细胞

B：嗜碱性粒细胞

C：中性粒细胞

D：淋巴细胞

答案：C

14.属于P一糖蛋白抑制剂的药物是

A：卡马西平

B：维拉帕米

C：圣约翰草提取物

D：利福平

答案：B

15.I类手术切口应用第三代头孢菌素，属于
A: 不合理联合用药
B: 无适应证用药
C: 过度治疗用药
D: 超适应证用药
答案：B

16.患者，女，31岁，1个月前顺一健康男婴。近2周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（）
A: 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药
B: 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善1个月后逐渐减量,直至停药
C: 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加
D: 氟西汀应于每日早餐后服用
答案：B

17.依据CTP评分，肝功能不全B级病人用药剂量为正常患者剂量的
A: 50%维持剂量
B: 40%维持剂量
C: 30%维持剂量
D: 25%维持剂量
答案：D

18.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛：血常规见WBC15X109／L，中性粒细胞百分比85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。
A: 首选针对革兰阳性菌的药物

B：选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物
C：如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素
D：抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
答案：A

19.可卡因属于哪一类兴奋剂
A：蛋白同化激素
B：β 受体阻断剂
C：利尿剂
D：精神刺激剂
答案：D

20.患者，男，72岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热1天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88次／分，R22次／分，BP112／77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。
A：根据患者的体重计算抗肿瘤药物给药剂量
B：每21天为1个疗程
C：抗肿瘤药物均采用静脉给药
D：抗肿瘤药物选择在每个疗程的第一天给药
答案：A

21.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇紫绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。
A：急性左心衰竭
B：急性心肌炎

C：大叶性肺炎

D：支气管哮喘

答案：A

22.下列药物中，药师需要提示患者随身携带的是

A：甲硝唑片

B：硝酸甘油片

C：胰酶肠溶胶囊

D：高锰酸钾片

答案：B

23.急性或轻型肝炎时，肝功能检查结果可能显示的是

A：AST/ALT 比值>1

B：ALT 下降

C：AST 下降

D：AST/ALT 比值<1

答案：D

24.瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是()

A：40—200mg

B：10—80mg

C：10—20mg

D：5—20mg

答案：C

25.稳定型心绞痛发作应首选的药物是

A：硝酸甘油

B：氨氯地平

C: 美托洛尔

D: 单硝酸异山梨酯

答案：A

26.男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

A: 痰液稀释剂

B: 吗啡

C: 泼尼松

D: 氨茶碱

答案：D

27.不能用于治疗缺铁性贫血的药物是

A: 硫酸亚铁

B: 去铁胺

C: 乳酸亚铁

D: 葡萄糖酸亚铁

答案：B

28.属于妊娠 X 级毒性药品的是

A: 氧氟沙星

B: 辛伐他汀

C: 水溶性维生素

D: 青霉素、头孢哌酮一舒巴坦

答案：B

29.严重疼痛者可选用的镇痛药是

A: 罗通定

B: 氨酚待因片

C: 塞来昔布

D: 双氯芬酸钠缓释片

答案：B

30.属于长效的胰岛素制剂是

A: 甘精胰岛素

B: 赖脯胰岛素

C: 精蛋白锌胰岛素

D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：C

31.以质量调整为生命年或者质量调整为预期寿命为指标开展的药物经济学评价方法属于()

A: 成本-效用分析

B: 最小成本分析

C: 成本-效果分析

D: 成本-效益分析

答案：A

32.告知"人促红素可引起纯红细胞再生障碍性贫血"属于

A: 新药信息

B: 药物相互作用

C: 药品不良反应

D: 禁忌证

答案：C

33.（2018年真题）患者,女,25岁,痛经,应选用的药物是（）

A：布洛芬

B：麦角胺咖啡因

C：卡马西平

D：山莨菪碱

答案：A

34.药物临床评价是指

A：对药物临床前研究的一切新药申报资料的真实性和科学性进行的评估

B：新药上市以后对药品的理化性质、质量和价格的评估

C：对药品治疗效果、不良反应、用药方案、贮存稳定性及药品经济学的评估

D：新药临床研究在未上市以前进行的利益与风险关系的评估

答案：C

35.下述“药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的”中，不正确的是

A：排痰化痰

B：缓解呼吸道症状

C：预防疾病进展

D：减少病死率

答案：A

36.（2017年真题）用于评价肝功能不全严重程度的是（）

A：APACHE评分系统

B：数字评分法

C：Cochrane证据分级

D：CTP评分标准

答案：D

37.用于晚期不宜手术或复发的局限性肿瘤

A：腔内注射

B：肌内注射

C：静脉注射

D：动脉注药

答案：D

38.（2015年真题）冠状动脉粥样硬化心脏病的患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为二级预防，最佳剂量范围是（）。

A：25～75mg/d

B：150～300mg/d

C：25～50mg/d

D：75～150mg/d

答案：D

39.女，37岁，前来药店购买退热药，药师应进行的咨询与指导，错误的是

A：如果顾客购买对乙酰氨基酚口服液，应告知患者3天后症状未缓解需及时就医

B：顾客告知自己母亲72岁，有慢阻肺病史，昨日出现头痛、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽，前来替母亲购药，药师应建议顾客带家属就医，不宜自我药疗

C：若经过咨询得知顾客是为家里3岁女儿购买，不应推荐阿司匹林

D：如果得知顾客为本人购药，且已经服用过对乙酰氨基酚3日，症状未缓解，药师可建议患者联合服用布洛芬口服液

答案：D

40.饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是（）

A: 10ml

B: 25ml

C: 20ml

D: 15ml

答案：B

41.较易导致肾损伤的药品是

A: 酮康唑

B: 新霉素

C: 氯化钾

D: 阿米卡星

答案：B

42.与西咪替丁、喹诺酮类及大环内酯类药物合用，应减少其用量的药品是

A: 异丙托溴铵

B: 噻托溴铵

C: 孟鲁司特

D: 氨茶碱

答案：D

43.关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),对钝痛如牙痛、头痛、神经痛等有较好的镇痛效果的是

A: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等

B: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素B1

C: 推荐应用地西泮(安定)片

D: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啶、舒马曲坦、佐米曲坦

答案：A

44.可提供摘要、引文、索引及目录的信息属于

A: 三级信息

B: 二级信息

C: 四级信息

D: 一级信息

答案：B

45.蒽环类抗生素容易引起心脏毒性，可以采用的预防药物是

A: 抗组胺药

B: 糖皮质激素

C: 肾上腺素

D: 维生素.辅酶Q

答案：D

46.喝茶可降低多价金属离子、生物碱、苷类、胃蛋白酶、四环素类等药物的疗效，其机制主要是它们结合茶叶中的

A: 蛋白质

B: 咖啡因

C: 鞣酸

D: 茶碱

答案：C

47.以下对ADR监测的目的和意义的叙述中，不正确的是

A: 促进临床合理用药

B: 促进新药的研制开发

C: 减少 ADR 的危害

D: 简化或缩短新药临床试验

答案：D

48.中度支气管哮喘疾病的临床表现为

A: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

B: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

C: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率>30 次 / 分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常>120 次 / 分，奇脉，PaO

D: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

答案：B

49.作用于有丝分裂 M 期，干扰微管合成的药物为

A: 卡培他滨

B: 替尼泊苷

C: 丝裂霉素

D: 紫杉醇

答案：D

50.（2019 年真题）患者，女，62 岁，2 型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难，不宜选用的药物是

A: 二甲双胍

B: 格列齐特

C: 吡格列酮

D: 阿卡波糖

答案：C

51.患者男50岁临床诊断为焦虑症，给予氟西汀20mgqd治疗。对该患者用药教育的说法错误的是()

A: 氟西汀应于睡前服用

B: 不能突然停止服用氟西汀

C: 不得随意自行调整氟西汀剂量

D: 服用氟西汀期间不能饮酒

答案：A

52.用药期间饮酒可能出现“双硫仑样反应”的药物是（）

A: 万古霉素

B: 美罗培南

C: 克拉霉素

D: 头孢哌酮

答案：D

53.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

B: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

C: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

D: 口服避孕药致阿米替林的清除率下降

答案：D

54.某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A：在服用以前所用的另种复方激素避孕药的停药期末开始服用本品

B：在取出最后一个周期包中的透皮贴剂的当天开始服用本品

C：在服用前一种复方激素避孕药最后一片的当天开始服用本品

D：在取出最后一个阴道环的当天开始服用本品

答案：C

55.属于妊娠C级毒性药品的是

A：青霉素、头孢哌酮-舒巴坦

B：氧氟沙星

C：水溶性维生素

D：辛伐他汀

答案：B

56.下列药物服用后可引起嗜睡，对驾车、高空作业或操作机器者宜慎用的是

A：右美沙芬

B：喷托维林

C：可待因

D：苯丙哌林

答案：A

57.老年女性,心功能衰竭,服用呋塞米及螺内酯片,正确的使用方法是()

A：应同时碱化尿液

B：舌下含服

C：用温水调服

D：清晨服用

答案：D

58.与两性霉素B配伍可以析出沉淀的溶媒是

A：0.9%氯化钠注射液

B：50%葡萄糖注射液

C：复方氯化钠注射液

D：5%葡萄糖注射液

答案：A

59.可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

A：复合维生素B

B：维生素C

C：维生素

D：维生素A

答案：A

60.结核病化学治疗的基本原则是（）

A：早期、联合、适量、规律、全程

B：早期、联合、足量、规律、全程

C：早期、单一、适量、规律、全程

D：早期、单一、足量、规律、全程

答案：A

61.磺酰脲类促胰岛素分泌剂

A：罗格列酮

B：瑞格列奈

C：格列吡嗪

D：伏格列波糖

答案：C

62.用于产后出血，但在胎盘娩出前禁用的药物是

A：甲巯咪唑

B：抗组胺药

C：麦角新碱

D：水合氯醛

答案：C

63.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

A：1%硫酸镁

B：1%硫酸铜

C：1%氯化钠

D：3%过氧化氢

答案：A

64.患者，女，48岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是

A：乳酶生片

B：甲氧氯普胺片

C：干酵母片

D：多潘立酮片

答案：A

65.属于B级高危药品的是

A：全胃肠外营养液

B：50%葡萄糖注射液

C：5%葡萄糖注射液

D：血液透析液

答案：A

66.因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

A：合并轻度高血压的患者

B：6个月内有静脉血栓栓塞史的患者

C：甲状腺切除后的患者

D：合并高胆固醇血症的患者

答案：B

67.患者，男，32岁。急性铅中毒，应用硫酸镁导泻，适宜的给药途径是

A：直肠给药

B：吸入给药

C：口服给药

D：静脉注射

答案：C

68.第一类精神药品处方印刷用纸是

A：淡橙色

B：淡黄色

C：淡红色

D：淡绿色

答案：C

69.临床上治疗焦虑症应用最广泛的药物为

A: 舍曲林
B: 氟伏沙明
C: 帕罗西汀
D: 阿米替林
答案：C

70.治疗急迫性尿失禁的首选药物是
A: 抗胆碱能药物
B: 选择性 α1 激动剂
C: 5α 还原酶抑制剂
D: α1 阻断剂
答案：A

71.患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断服用沙丁胺醇 4mgtid 治疗，没有规律用药治疗。因秋冬季交替出现明显喘憋，话不成句，被紧急送医预防治疗。
A: 布地奈德气雾剂
B: 沙丁胺醇片
C: 沙丁胺醇气雾剂
D: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
答案：C

72.峰值一般在清晨 7～8 时，谷值则在午夜 0 时，是
A: 胰岛 B 细胞
B: 胃酸的分泌
C: 糖皮质激素的分泌
D: 肝脏合成胆固醇
答案：C

73.再感染

A：患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数>10scfu/ml

B：治疗后症状消失，尿菌阴转后在6周内再出现菌尿，菌种与上次相同

C：治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药6周后再次幽现真性细菌尿，菌株与上次不同

D：宜选用毒性小的抗菌药物

答案：C

74.脑出血的内科治疗最重要的是

A：抗生素治疗

B：控制脑水肿

C：降低血压

D：给予止血剂

答案：B

75.能降LDL也降HDL的药物是

A：非诺贝特

B：烟酸

C：普罗布考

D：塞伐他汀

答案：C

76.在考虑患者意愿、偏好和生命质量的基础上，比较不同治疗方案的经济合理性，应选用的药物经济学研究方法是

A：成本-效果分析

B: 成本-效益分析

C: 最小成本分析

D: 成本-效用分析

答案：D

77.最方便、最安全、最经济的给药途径是

A: 直肠给药

B: 静脉注射

C: 口服给药

D: 肌内注射

答案：C

78.口服可治疗肝豆状核变性病的是

A: 青霉胺

B: 依地酸钙钠

C: 二巯丙醇

D: 二巯丁二钠

答案：A

79.老年增龄导致机体内环境改变，肝肾功能下降，药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄及药效发生一系列变化，一些药物的治疗剂量与中毒剂量更加接近，药物的不良反应发生率增高。

A: 阿司匹林

B: 苯巴比妥

C: 磺胺异噁唑

D: 维生素B

答案：D

80.嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

A：病毒感染性腹泻

B：过敏性疾病如荨麻疹

C：铅、铋中毒

D：感染性疾病如肺结核

答案：B

81.（2018年真题）阿托伐他汀钙的日剂量范围是（）

A：40~200mg

B：10~80mg

C：10~20mg

D：5~20mg

答案：B

82.成人(末梢血)白细胞(WBC)的正常值参考范围是

A：(5.0～12.0)×10

B：(3.5～10.0)×10

C：(4.0～10.0)×10

D：(5.0～10.0)×10

答案：C

83.用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

A：格列吡嗪

B：西格列汀

C：阿卡波糖

D：二甲双胍

答案：A

84.李某，男，45岁，近日感觉头痛、头晕、心悸，眼花、耳鸣、失眠、乏力等症状，血压为160/100mmHg。

A: 高血压

B: 冠心病

C: 心律失常

D: 心力衰竭

答案：A

85.为下列各类慢性阻塞性肺病治疗药物选择合适的代表药,白三烯受体阻断剂

A: 异丙托溴铵

B: 沙丁胺醇

C: 扎鲁司特

D: 茶碱

答案：C

86.使用年龄折算法，体重折算法，体表面积折算法等计算，是指

A: 明确诊断

B: 严格掌握适应证

C: 严格掌握用药剂量

D: 密切监护

答案：C

87.口服普萘洛尔用于解救

A: 瘦肉精中毒

B: 氯丙嗪中毒

C：苯丙胺中毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/276205100054011030