

2024 年河北省定兴县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题真题题库（考点梳理）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可与小剂量糖皮质激素合用，能降低排异反应及感染的发生率，提高存活率的是()

- A: 硫唑嘌呤
- B: 环孢素
- C: 甲泼尼龙
- D: 环磷酰胺

答案：B

2. 关于阿奇霉素使用的叙述，错误的是

- A: 治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素首次剂量为后续剂量的 3 倍
- B: 若需服含铝或镁的抗酸药，阿奇霉素应在服用上述药物前 1 小时或后 2 小时给予
- C: 阿奇霉素一天一次口服即可
- D: 治疗儿童中耳炎、肺炎时，阿奇霉素的疗程为 5 天

答案：A

3. 应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 多西环素
- D: 四环素

答案：C

4. 患者，男，35 岁。大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是()

- A: 庆大霉素
- B: 哌拉西林
- C: 氯霉素
- D: 林可霉素

答案：B

5. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

- A: 硝酸甘油片已经过期
- B: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效
- C: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服
- D: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足

答案：B

6. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

- A: 吉海反应
- B: 反跳现象

C: 过敏反应

D: 特异质反应

答案：C

7. (2017 年真题) 患者, 男, 57 岁, 肾功能正常, 既往有动脉粥样硬化, 高血压合并 2 型糖尿病, 服用下列药物后出现踝关节肿胀, 到药坊询问, 药师提示有可能引起不良反应的药物是 ()

A: 赖诺普利片

B: 格列吡嗪肠溶片

C: 阿司匹林肠溶片

D: 硝苯地平缓释片

答案：D

8. (2019 年真题) 患者, 女 75 岁, 既往有 2 型糖尿病史 18 年, 有青霉素过敏史, 因车祸导致左下肢开放性骨折, 术后发生骨髓炎, 给予克林霉素治疗 10 余天, 临床应关注的典型不良反应是 ()

A: 抗生素相关性腹泻

B: 急性溶血性贫血

C: 红人综合征

D: 肌肉震颤

答案：A

9. 高钠血症是指

A: 血钠 $>145\text{mmol/L}$

B: 血钠 $>135\text{mmol/L}$

C: 血钠 $>140\text{mmol/L}$

D: 血钠 $>130\text{mmol/L}$

答案：A

10. 防止急性血栓形成的首选药物是

- A: 维生素 B12
- B: 香豆素类
- C: 维生素 K1
- D: 肝素

答案：D

11. 红霉素易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物。

- A: 万古霉素
- B: 克拉霉素
- C: 红霉素
- D: 罗红霉素

答案：C

12. 人体主要的热能来源是

- A: 维生素
- B: 氨基酸
- C: 果糖
- D: 葡萄糖

答案：D

13. 泛昔洛韦口服后代谢为

- A: 喷昔洛韦
- B: 更昔洛韦
- C: 西多福韦
- D: 阿昔洛韦

答案：A

14. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$

- A: 维生素 C
- B: 低分子肝素
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素 K

答案：C

15. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

- A: 维生素 B6
- B: 托烷司琼
- C: 甲氧氯普胺
- D: 阿瑞吡坦

答案：C

16. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

- A: 环孢素
- B: 苯巴比妥
- C: 利福平
- D: 四环素

答案：A

17. 高血钾的肾损伤患者禁用下列哪种利尿药()

- A: 依他尼酸
- B: 螺内酯
- C: 山梨醇

D: 呋塞米

答案：B

18. 两性霉素 B 属于()

A: 丙烯胺类抗真菌药

B: 多烯类抗真菌药

C: 棘白菌素类抗真菌药

D: 唑类抗真菌药

答案：B

19. 患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2.5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

A: 头孢唑林

B: 头孢噻肟

C: 阿莫西林

D: 头孢他啶

答案：C

20. 治疗伤寒、副伤寒的首选药是

A: 氯霉素

B: 青霉素

C: 诺氟沙星

D: 四环素

答案：A

21. 强心苷中毒引起的室性心律失常首选

A: 普萘洛尔

- B: 胺碘酮
- C: 苯妥英钠
- D: 利多卡因

答案：C

22. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 干扰素
- B: 阿糖腺苷
- C: 阿昔洛韦
- D: 奥司他韦

答案：C

23. 唯一被批准用于临床的选择性肝固醇吸收抑制剂是()

- A: 小剂量氟伐他汀
- B: 小剂量阿托伐他汀
- C: 大剂量阿托伐他汀
- D: 依折麦布

答案：D

24. 前列腺素类似物的不良反应不包括

- A: 角膜病变
- B: 虹膜颜色加深
- C: 眼睑水肿和红斑
- D: 眼部刺激症状

答案：A

25. 服用华法林过量可用下列哪种药物对抗

- A: 维生素 A

B: 鱼精蛋白

C: 糜蛋白酶

D: 维生素 K

答案: D

26. 具有中枢和外周抗多巴胺双重作用的是

A: 莫沙必利

B: 甲氧氯普胺

C: 多潘立酮

D: 西沙必利

答案: B

27. 血钾升高至

A: 大于 6mmol/L

B: 大于 7 μmol/L

C: 大于 172 μmol/L

D: 大于 265 μmol/L

答案: A

28. 直接氧化和卤化菌体蛋白的是

A: 复方薄荷油

B: 桃金娘油

C: 羟甲唑啉

D: 西地碘

答案: D

29. 不属于升白细胞药物的是

A: 肌苷

B: 粒细胞集落刺激因子

C: 重组人促红素

D: 非格司亭

答案：C

30. 以下选项中，不属于沙美特罗的适应证的是()

A: 慢性支气管炎伴气道痉挛的治疗

B: 肺气肿伴气道痉挛的治疗

C: 夜间哮喘的预防和维持治疗

D: 缓解支气管痉挛的急性症状

答案：D

31. 下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

A: 禁止接触塑料制品

B: 用生理盐水做溶剂

C: 禁食冷饮冷水、接触凉物

D: 禁食热饮热水

答案：C

32. 易在甲状腺功能减退患者体内蓄积的药物是()

A: 洋地黄毒苷

B: 阿托品

C: 利多卡因

D: 哌替啶

答案：A

33. 快速静脉滴注可出现低血压、心律失常的是

- A: 卡巴克络
- B: 甲萘氢醌
- C: 氨基己酸
- D: 蛇毒血凝酶

答案：C

34. 关于地高辛的说法不正确的是

- A: 减慢传导
- B: 激动 Na
- C: 减慢心率
- D: 加强心肌收缩力

答案：B

35. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

- A: 低氯碱血症
- B: 血小板增多
- C: 高钾血症
- D: 低血糖

答案：C

36. 可单独用于原发性高血压的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 甘露醇
- D: 呋塞米

答案：A

37. 下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 维生素 K
- B: 卡巴克络
- C: 氨甲环酸
- D: 酚磺乙胺

答案：C

38. 常用于痤疮的治疗，因易引起前庭神经毒性，已不作为脑膜炎治疗药的是

- A: 氯霉素
- B: 米诺环素
- C: 多西环素
- D: 青霉素

答案：B

39. 左炔诺孕酮为

- A: 促性腺激素
- B: 雌激素类
- C: 短效口服避孕药
- D: 促性腺激素释放激素类似物

答案：C

40. 硫脲类药物用于甲状腺功能亢进内科治疗的正确给药方式是

- A: 开始给大剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量
- B: 开始给小剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量
- C: 开始给小剂量，以后逐渐加大剂量，直至基础代谢率正常，改用维持量
- D: 开始给治疗量，基础代谢正常后继续给 3~6 个月停药

答案：A

41. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 维拉帕米
- C: 地尔硫革
- D: 美托洛尔

答案：A

42. 对 α 和 β 受体均有阻断作用的药物是

- A: 酚妥拉明
- B: 拉贝洛尔
- C: 普萘洛尔
- D: 去甲肾上腺素

答案：B

43. 对淋病、梅毒可作为首选的是

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 土霉素
- D: 红霉素

答案：B

44. 同时具有短效和长效双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 甘精胰岛素注射液
- B: 预混胰岛素注射液
- C: 普通胰岛素注射液
- D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：B

45. 不宜应用喹诺酮类药物的人群是

- A: 老年人
- B: 肝病患者
- C: 溃疡病患者
- D: 婴幼儿

答案：D

46. 对地高辛中毒出现严重心律失常者可静脉滴注

- A: 阿托品
- B: 利尿剂
- C: 氯化钾、葡萄糖注射液
- D: 苯妥英钠

答案：C

47. 四环素类首选用于()

- A: 布鲁菌病
- B: 钩端螺旋体病
- C: 鼠疫、土拉菌病
- D: 伤寒、副伤寒

答案：A

48. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

- A: 红霉素
- B: 维生素 C
- C: 他莫昔芬
- D: 氯丙嗪

答案：C

49. 主要用于疟疾预防的药物是

- A: 吡喹酮
- B: 甲硝唑
- C: 氯喹
- D: 乙胺嘧啶

答案：D

50. 肝素过量可选用的拮抗药是()

- A: 氨甲苯酸
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 维生素 K1
- D: 鱼精蛋白

答案：D

51. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

- A: 餐后 2 小时
- B: 随餐服用
- C: 餐前半小时
- D: 餐后半小时

答案：B

52. 治疗绝经后妇女的骨质疏松症可选用()

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 依降钙素
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 阿法骨化醇

答案：A

53. 与奥美拉唑-替硝唑三联治疗胃溃疡的是

- A: 克拉霉素
- B: 红霉素
- C: 克林霉素
- D: 罗红霉素

答案：A

54. 格列本脲的降糖作用机制是

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 二甲双胍
- D: 静脉用胰岛素

答案：A

55. (2018 年真题) 不易发生“双硫仑样”反应的药物是 ()

- A: 头孢曲松
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢他啶
- D: 头孢替安

答案：C

56. 晚期前列腺癌 (乳腺癌、卵巢癌患者禁用) 可选用的药物是

- A: 戊酸雌二醇
- B: 缩宫素
- C: 他莫昔芬
- D: 垂体后叶素

答案：A

57. 服用抗帕金森病药恩他卡朋的患者，其尿液可变成

- A: 红棕色
- B: 深蓝色
- C: 淡绿色
- D: 蓝绿色

答案：A

58. 可直接中和胃酸，发挥快速、持久的抗酸作用，且有平衡肠动力作用，不易导致便秘和腹泻不良反应的是

- A: 碳酸钙
- B: 三硅酸镁
- C: 铝碳酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：C

59. 中毒症状主要表现为胃肠道反应、中枢神经系统反应和心脏毒性三个方面的是

- A: 卡托普利
- B: 氨氯地平
- C: 地高辛
- D: 哌唑嗪

答案：C

60. 与 DNA 结合，进而抑制 DNA 和 RNA 合成

- A: 氟尿嘧啶
- B: 紫杉醇

C: 顺铂

D: 高三尖杉酯碱

答案: C

61. 急性化脓性中耳炎患者，鼓膜穿孔后停用 2% 酚甘油滴耳，是因为酚甘油

A: 对鼓室黏膜及鼓膜有腐蚀作用

B: 仅有止痛作用

C: 油剂不易经穿孔进入中耳

D: 没有抗生素水溶液效果佳

答案: A

62. (2015 年真题) 属于多巴胺 D2 受体阻断剂的是 ()。

A: 氯苯那敏

B: 法莫替丁

C: 多潘立酮

D: 奥美拉唑

答案: C

63. 西地那非引起的不良反应有

A: 出血

B: 视觉异常

C: 低血糖

D: 嗜睡乏力

答案: B

64. 治疗膀胱过度活动症宜选用

A: 利血平

- B: 托特罗定
- C: 坦洛新
- D: 尼莫地平

答案：B

65. 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是

- A: 四环素可的松眼膏
- B: 利巴韦林滴眼液
- C: 更昔洛韦滴眼液
- D: 碘苷滴眼液

答案：A

66. 轻度阻滞 Na^+ 通道的药物是

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 普萘洛尔
- D: 普鲁卡因胺

答案：A

67. 金刚烷胺与多潘立酮合用

- A: 增加锥体外系不良反应的风险
- B: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)
- C: 增加肾毒性
- D: 可增加抗胆碱不良反应的危险

答案：A

68. 替比夫定的作用靶点是

- A: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

- B: 神经氨酸酶
- C: 脱氧核糖核酸聚合酶
- D: HIV-1 反转录酶

答案：C

69. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

- A: 紧急时可静脉注射
- B: 可使用微量输液泵
- C: 在避光输液瓶中使用
- D: 使用 5% 葡萄糖注射液配制后保存与应用不应超过 24 小时

答案：A

70. 可促进白细胞增生的药物是

- A: 叶酸
- B: 粒细胞集落刺激因子
- C: 红细胞生成素
- D: 维生素 B

答案：B

71. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是

- A: 匹氨西林
- B: 青霉素 V
- C: 美西林
- D: 苯唑西林

答案：C

72. 存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

- A: 吉西他滨
- B: 奥沙利铂
- C: 泼尼松
- D: 顺铂

答案：B

73. 阿糖胞苷、吉西他滨属于()

- A: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: DNA 多聚酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：C

74. 常引起外周神经炎的抗肿瘤药是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 甲氨蝶呤
- C: 巯嘌呤
- D: 长春新碱

答案：D

75. 雷尼替丁用于治疗消化性溃疡的机制是

- A: 竞争性拮抗 H1 受体
- B: 竞争性拮抗 H2 受体
- C: 直接中和胃酸
- D: 抑制胃壁细胞 H⁺，K⁺-ATP 酶

答案：B

76. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 阿卡波糖
- B: 贝那普利
- C: 罗格列酮
- D: 二甲双胍

答案：C

77. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

- A: 利多卡因
- B: 奎尼丁
- C: 普萘洛尔
- D: 苯妥英钠

答案：C

78. 术后复发的甲状腺功能亢进症选用

- A: 大剂量碘剂
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 格列齐特
- D: 放射性碘

答案：D

79. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

- A: 博来霉素
- B: 氟胞嘧啶

C: 多柔比星

D: 紫杉醇

答案: C

80. (2018 年真题) 适应症仅应用于治疗失眠的药物是 ()

A: 佐匹克隆

B: 地西泮

C: 氟西汀

D: 苯巴比妥

答案: A

81. 作用机制是表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的是

A: 枸橼酸他莫昔芬

B: 巯嘌呤

C: 吉非替尼

D: 紫杉醇

答案: C

82. 目前疗效最为肯定的一种保护肝细胞结构和功能的药物是

A: 多烯磷脂酰胆碱

B: 联苯双酯

C: 硫普罗宁

D: 复方甘草甜素

答案: A

83. 下列关于吉非替尼的描述，错误的是

A: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

B: 用药期间应监测肝肾功能

C: 与传统化疗药存在交叉耐药

D: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

答案：C

84. 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是

A: 阿格列汀

B: 利拉鲁肽

C: 伏格列波糖

D: 那格列奈

答案：B

85. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

A: 紫杉醇

B: 顺铂

C: 依托泊苷

D: 来曲唑

答案：C

86. 红霉素的作用机制是

A: 与核蛋白 50s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

B: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程

C: 与核蛋白 70s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

D: 与核蛋白 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

答案：A

87. 有指南推荐，为减少手术中和手术后出血风险，择期手术前需提前停用阿司匹林

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 11~15 日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/277020035052010024>