

2025 年执业药师之西药学综合知识与技能模拟试题

单选题（共 60 题）

1、提示并不存在风险，目前不需采取措施的信号属于

- A. 确认的信号
- B. 部分确认信号
- C. 尚不确定的信号
- D. 驳倒的信号
- E. 零风险信号

【答案】 D

2、在配制静脉输液时，不宜用氯化钠注射液溶解的药品是

- A. 青霉素
- B. 两性霉素 B
- C. 维生素 K
- D. 盐酸万古霉素
- E. 硫酸庆大霉素

【答案】 B

3、属于 X 级的药物是

- A. 阿莫西林
- B. 葡萄糖
- C. 万古霉素
- D. 沙利度胺

E. 卡马西平

【答案】 D

4、影响胎儿甲状腺功能，导致死胎的药物是

A. 丙硫氧嘧啶

B. 维生素 A

C. 氯霉素

D. 维生素 D

E. 苯巴比妥

【答案】 A

5、设置专供患者阅读的《顾客药物信息详解》的是

A. 《中国国家处方集》

B. 《药物事实与比较》

C. 《美国药典药物信息》

D. 《马丁代尔药物大典》

E. 《美国医院处方集服务处：药物信息》

【答案】 C

6、以下评判为“过度治疗用药”的处方用药中，正确的是

A. 忽略病情和患者的基础疾病

B. 应用两种或两种以上一药多名的药物

C. 盲目而无效果地应用肿瘤辅助治疗药

D. 滥用糖皮质激素、白蛋白、二磷酸果糖

E. 肌注大观霉素治疗非淋球菌泌尿道感染

【答案】 D

7、属于肾上腺素能 α 受体阻断剂，可改善尿道梗阻症状的药品

A. 黄酮哌酯

B. 氟他胺

C. 阿夫唑嗪

D. 非那雄胺

E. 尼尔雌醇

【答案】 C

8、下列治疗老年痴呆药物可通过酸化尿液而显著增加其排泄的是

A. 碳酸氢钠

B. 美金刚

C. 多奈哌齐

D. 加兰他敏

E. 帕罗西汀

【答案】 B

9、治疗幽门螺杆菌感染的一线方案，其典型组方中不包括的药物是

A. 胶体果胶铋

B. 甲硝唑

C. 克拉霉素

D. 西咪替丁

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

E. 兰索拉唑

【答案】 D

10、(治疗消化性溃疡的胃黏膜保护剂)可促进胃黏膜-黏液分泌与内源性前列腺素生成的药物是 ()

A. 硫糖铝

B. 雷贝拉唑

C. 米索前列醇

D. 碳酸镁

E. 瑞巴派特

【答案】 C

11、长期应用苯二氮（卅卓）类药物不能突然停止使用，因其存在

A. 后遗效应？

B. 毒性反应？

C. 首剂效应？

D. 戒断症状？

E. 首过消除？

【答案】 D

12、常用的抗肿瘤药给药途径有:动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径用于对组织无刺激性的药物

A. 动脉注射

B. 静脉注射

C. 肌内注射

D. 腔内注射

E. 口服给药

【答案】 C

13、美国食品药品监督管理局(FDA)根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

A. 青霉素

B. 门冬胰岛素

C. 维生素 C

D. 非那雄胺

E. 二甲双胍

【答案】 D

14、患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

A. 胰酶片

B. 碳酸氢钠

C. 小檗碱

D. 双八面体蒙脱石

E. 鞣酸蛋白

【答案】 A

15、阿托品与小活络丹合用

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

- A. 两者合用作用相反，互相降低药效
- B. 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭
- C. 合用后抑制后者吸收，降低疗效
- D. 合用后增加毒性，出现药物中毒
- E. 合用后发生中和反应，降低疗效

【答案】 D

16、患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高160cm，体重70kg。实验室检查：白细胞 $8.0 \times 10^9 / L$ ，红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$ ，总胆红素 $11 \mu mol / L$ ，总胆固醇 $6.0 mmol / L$ ，空腹血糖 $7.6 mmol / L$ 。

- A. 格列齐特
- B. 辛伐他汀
- C. 非诺贝特
- D. 二甲双胍
- E. 硫酸亚铁

【答案】 D

17、如果ACEI引起干咳可

- A. 联用他汀类
- B. 给予硫酸亚铁
- C. 慎用甲基多巴
- D. 停用ACEI或减量
- E. 麻黄碱、萘甲唑啉滴鼻勿过量

【答案】 B

18、（2015 年真题）患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇 4mg tid 治疗。没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋，话不成句，被紧急送往医院。

- A. 沙丁胺醇片
- B. 布地纳德气雾剂
- C. 沙丁胺醇气雾剂
- D. 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
- E. 异丙托溴铵雾化吸入剂

【答案】 C

19、（2015 年真题）患者，男，50 岁，高血压病史 3 年。期间先后用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和引用多种饮料，出现血压波动情况。

- A. 控释片比普通片剂含量高，不宜嚼碎服用，不然会导致低血压
- B. 控释片比普通片剂含量相同，与普通片给药次数相同
- C. 控释片比普通片剂含量相同，可以固定时间替换服用
- D. 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同
- E. 控释片比普通片剂起效慢，血浆峰浓度高，容易发生头晕、注意力不集中、记忆减退。肢体麻木、夜尿增多、心悸、胸闷、乏力等

【答案】 A

20、患者，男，64 岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol} / \text{L}$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mg qd、美托洛尔缓释片 47.5mg qd、赖诺普利片 20mg qd、辛伐他汀片 10mg qd、阿司匹林肠溶片 100mg qd。

- A. 氢氯噻嗪和辛伐他汀

- B. 美托洛尔和赖诺普利
- C. 美托洛尔和辛伐他汀
- D. 氢氯噻嗪和阿司匹林
- E. 阿司匹林和赖诺普利

【答案】 D

21、常用的抗肿瘤药给药途径有:动脉、静脉、肌内、腔内、口服五种途径用于某些晚期不宜手术或复发的局限性肿瘤

- A. 动脉注射
- B. 静脉注射
- C. 肌内注射
- D. 腔内注射
- E. 口服给药

【答案】 A

22、循证医学证据级别和强度最低的是

- A. 专家意见
- B. 大样本病案系列
- C. 单个样本随机对照试验
- D. 同质随机对照试验的系统评价
- E. 同质病例对照研究的系统评价

【答案】 A

23、最有可能确认患者用药伤害事件的方法是

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

- A. 直接观察
- B. 病历审查
- C. 岗位工作问责
- D. 计算机检测方法
- E. 用药差错和 ADEs 报告系统

【答案】 B

24、诊断为输尿管结石，给予黄体酮，应评判为

- A. 无正当理由超适应证用药
- B. 联合用药不适宜
- C. 有禁忌证用药
- D. 过度治疗用药
- E. 无适应证用药

【答案】 A

25、（2016 年真题）缓解视疲劳可选用的药物是（ ）。

- A. 酞丁安滴眼液
- B. 色甘酸钠滴眼液
- C. 氧氟沙星滴眼液
- D. 羟甲基纤维素钠滴眼液
- E. 毛果芸香碱滴眼液

【答案】 D

26、患者，女，61岁，有痛风病史。间歇期服用别嘌醇、丙磺舒治疗时，又出现一次急性发作，此时应采取的治疗方法是

- A. 停用别嘌醇、丙磺舒，改用秋水仙碱
- B. 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱
- C. 减少别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱
- D. 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服对乙酰氨基酚
- E. 改用非布司他、苯溴马隆治疗

【答案】 C

27、肺结核最常见的传播方式为

- A. 血液传播
- B. 呼吸道传播
- C. 垂直传播
- D. 消化道
- E. 性传播

【答案】 B

28、可引起尿液碱度降低的疾病是

- A. 肾小管性酸中毒
- B. 痛风
- C. 应用碳酸氢钠
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 感染性膀胱炎

【答案】 B

29、（2015 年真题）患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热（39.1℃），咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A. 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用
- B. 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充
- C. 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用
- D. 首选口服补液，必要时静脉补液
- E. 适时使用微生态制剂

【答案】 A

30、儿童使用后可造成软骨病，18 岁以下儿童禁止使用的药物是

- A. 阿奇霉素
- B. 莫西沙星
- C. 阿米卡星
- D. 头孢哌酮
- E. 青霉素

【答案】 B

31、患过敏性疾病的驾驶员可选用的药物是

- A. 氯雷他定
- B. 异丙嗪

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

- C. 赛庚啉
- D. 苯海拉明
- E. 氯苯那敏

【答案】 A

32、“效用指标是患者主观满意程度（质量调整生命年或质量调整预期寿命），着重与分析医疗成本与患者生活质量提升的关系”是指

- A. 最大效果分析
- B. 最小成本分析
- C. 成本-效益分析
- D. 成本-效用分析
- E. 成本-效果分析

【答案】 D

33、（2017 年真题）患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mg bid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20 mg bid，甲硝唑片 0.4 g bid，克拉霉素片 50mg bid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6g bid。

- A. 埃索美拉唑镁肠溶片
- B. 克拉霉素片
- C. 甲硝唑片
- D. 枸橼酸铋钾胶囊
- E. 美托洛尔片

【答案】 B

34、引起心悸、心绞痛发作的药物是

- A. 碘和碘化物
- B. 丙硫氧嘧啶
- C. 左甲状腺素
- D. 胰岛素
- E. 左炔诺孕酮

【答案】 C

35、抗抑郁药司来吉兰用于伴前列腺增生症患者，应评判为

- A. 无正当理由超适应证用药
- B. 联合用药不适宜
- C. 有禁忌证用药
- D. 过度治疗用药
- E. 无适应证用药

【答案】 C

36、设置专供患者阅读的《顾客药物信息详解》的是

- A. 《中国国家处方集》
- B. 《药物事实与比较》
- C. 《美国药典药物信息》
- D. 《马丁代尔药物大典》
- E. 《美国医院处方集服务处：药物信息》

【答案】 C

37、使患者可放心、不掩饰地提出问题的是

- A. 环境舒适
- B. 适当隐秘
- C. 位置标志明确
- D. 配备必备设备
- E. 紧临门诊药房或设在药店大堂

【答案】 B

38、三环类抗抑郁药中毒出现

- A. 心血管毒性
- B. 肌肉震颤、抽搐
- C. 谵妄、躁狂、幻觉
- D. 明显的锥体外系症状
- E. 恶心、呕吐、视力模糊

【答案】 A

39、严重不良反应为胃肠道穿孔和瘘形成，发生胃肠道穿孔的患者永久停用的靶向药是

- A. 曲妥珠单抗
- B. 利妥昔单抗
- C. 贝伐珠单抗
- D. 帕博利珠单抗
- E. 西妥昔单抗

【答案】 C

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

40、患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是（ ）

- A. 复方苯甲酸软膏
- B. 氢化可的松软膏
- C. 联苯苄唑软膏
- D. 酮康唑软膏
- E. 特比萘芬软膏

【答案】 B

41、老年人退热服用贝诺酯，1 日 3 次；1 日用量不得超过

- A. 1.5g
- B. 2.0g
- C. 2.5g
- D. 3.0g
- E. 3.5g

【答案】 C

42、化学刺激引起消化道黏膜损伤造成的腹泻宜选用的药物是

- A. 胰酶
- B. 山莨菪碱
- C. 双歧三联活菌制剂
- D. 双八面体蒙脱石散
- E. 左氧氟沙星

【答案】 D

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

43、患者，女，28岁，妊娠27周，头晕3天。入院查体：血压160/100mmHg。诊断为：妊娠高血压。

- A. 福辛普利
- B. 卡托普利
- C. 缬沙坦
- D. 拉贝洛尔
- E. 特拉唑嗪

【答案】 D

44、（2015年真题）患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用（ ）。

- A. 苯海索
- B. 左旋多巴
- C. 多巴丝肼
- D. 司来吉兰
- E. 金刚烷胺

【答案】 A

45、阿司匹林、胺碘酮、他汀类药物、抗抑郁药、广谱抗生素、银杏等能增强效果的是

- A. 对异丙肾上腺素的敏感性降低
- B. β 受体阻滞剂普萘洛尔等减慢心率的作用亦钝化
- C. 肝脏合成凝血因子能力下降，对肝素及华法林非常敏感

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

- D. 心血管系统与维持水电解质平衡的内环境稳定功能减弱，易发生体位性低血压
- E. 对镇静催眠药、镇痛药、抗精神病药、抗抑郁药等中枢神经系统药的敏感性增高

【答案】 C

46、下列白细胞计数检查结果中，属于不正常的是

- A. 新生儿 $16.0 \times 10^9 / L$
- B. 成人 $8.0 \times 10^9 / L$
- C. 成人 $3.0 \times 10^9 / L$
- D. 成人 $4.3 \times 10^9 / L$
- E. 6 个月~2 岁婴幼儿 $11.2 \times 10^9 / L$

【答案】 C

47、尿酸升高的相关疾病是

- A. 流感
- B. 痛风
- C. 过敏性鼻炎
- D. 湿疹
- E. 恶性贫血

【答案】 B

48、（2017 年真题）缺铁性贫血患者常表现为（ ）

- A. 血红蛋白减少
- B. 嗜酸性粒细胞增多

- C. 中性粒细胞增多
- D. 红细胞增多
- E. 血小板增多

【答案】 A

49、患者,男,45岁,因消化不良(上腹饱胀,餐后明显)来药店咨询。下列说法错误的是()

- A. 应除外器质性疾病
- B. 可用助消化药对症治疗
- C. Hp 感染是引起消化不良的常见原因
- D. 进餐时不要摄入过多的液体
- E. 低脂饮食,同时避免摄入过多的膳食纤维

【答案】 C

50、患者,女,55岁,因“反复发作胸骨后疼痛2年,伴反酸,胃灼热,间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力 $<6\text{mmHg}$,结合胃镜检查结果,临床诊断为胃食管反流病,医师处方:奥美拉唑肠溶片 20mg bid 强化抑酸治疗。

- A. 戒烟酒
- B. 餐中多饮水
- C. 控制体重
- D. 避免高脂饮食
- E. 抬高床头

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/277066032032010025>