

2024 河北省赵县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题完整题库（模拟题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以下不属于强心苷的禁忌症的选项是

- A: 梗阻性肥厚型心脏病
- B: 慢性收缩性心力衰竭
- C: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- D: 室性心动过速、心室颤动

答案：B

2. 吗啡的镇痛作用机制主要是

- A: 增强镇静作用
- B: 增强止痛效果
- C: 诱发精神错乱
- D: 加重呼吸抑制

答案：A

3. 防治血栓性疾病如心肌梗死、脑梗死的药物是()

- A: 香豆素类
- B: 维生素 K
- C: 非格司亭
- D: 氨甲环酸

答案：A

4. 用于绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

- A: 米非司酮
- B: 黄体酮
- C: 雌二醇
- D: 地塞米松

答案：C

5. 阻断 H₂ 受体的是

- A: 西咪替丁
- B: 利血平
- C: 氢氧化镁
- D: 奥美拉唑

答案：A

6. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

- A: 磺胺米隆
- B: 磺胺甲
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺嘧啶

答案：C

7. 主要结构与雄激素颇为相似，但雄性化作用甚弱，蛋白同化作用很强，临床上可作为升白药物使用的是

- A: 小檗胺
- B: 丙酸诺龙
- C: 鲨肝醇
- D: 维生素 B₄

答案：B

8. 抗酸作用较强、慢而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多的是

- A: 氢氧化铝
- B: 三硅酸镁
- C: 碳酸钙
- D: 氢氧化镁

答案：C

9. 肝素的抗凝作用特点

- A: 仅在体内有效
- B: 必须有维生素 K 辅助
- C: 仅在体外有效
- D: 体内、体外均有效

答案：D

10. 过量会引起严重心脏毒性的药物是()

- A: 地高辛
- B: 哌唑嗪
- C: 卡托普利
- D: 氨氯地平

答案：A

11. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用

- A: 2%酚甘油滴耳液
- B: 3%过氧化氢溶液
- C: 3%酚甘油滴耳液
- D: 2%过氧化氢溶液

答案：A

12. 下列说法正确的是

- A: 异丙托溴铵口服可提高疗效
- B: 长效 β_2 受体激动剂不适合初始用于快速恶化的急性哮喘发作
- C: 氨茶碱可与青霉素合用
- D: 沙美特罗适用于缓解支气管痉挛的急性症状

答案：B

13. 可同时作用于胰岛 α 、 β 细胞的是

- A: 格列本脲
- B: 西格列汀
- C: 胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：B

14. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 血压下降
- B: 惊厥
- C: 心律失常
- D: 支气管痉挛

答案：C

15. 属于 Ia 类抗心律失常药的是

- A: 普罗帕酮
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：C

16. 用于疥疮和阴虱病的药物是()

- A: 林旦
- B: 维 A 酸
- C: 过氧苯甲酰
- D: 硼酸

答案: A

17. (2015 年真题) 降糖作用迅速, 被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是()。

- A: 瑞格列奈
- B: 二甲双胍
- C: 普萘洛尔
- D: 格列美脲

答案: A

18. 可作为全营养支持或部分营养补充的是

- A: 视黄酸
- B: TP
- C: TPF-D
- D: 视黄醇

答案: B

19. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是()

- A: 坦洛新
- B: 十一酸睾酮
- C: 西地那非

D: 特拉唑嗪

答案: A

20. (2020 年真题) 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次 1 分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

A: 呋塞米

B: 氨氯地平

C: 阿托伐他汀

D: 美托洛尔

答案: D

21. 选择性沉积在牙齿和骨骼中，不可用于 8 岁以下患儿的药物是

A: 四环素类

B: 氨基糖苷类

C: 氟喹诺酮类

D: 大环内酯类

答案: A

22. 叶酸与维生素 B12 联用治疗

A: 小细胞低血红蛋白性贫血

B: 再生障碍性贫血

C: 溶血性贫血

D: 巨幼细胞贫血

答案：D

23. (2017 年真题) 奥司他韦治疗流行性感冒,首次用药的时间是 ()

- A: 出现流感症状后 36 小时内
- B: 出现流感症状后 100 小时内
- C: 出现流感症状后 72 小时内
- D: 出现流感症状后 96 小时内

答案：A

24. 伏格列波糖的降糖作用机制是

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 竞争性抑制 α 葡萄糖苷酶
- C: 直接补充胰岛素
- D: 提高靶组织对胰岛素的敏感性

答案：B

25. 属于选择性 5-HT

- A: 甲氧氯普胺
- B: 莫沙必利
- C: 多潘立酮
- D: 昂丹司琼

答案：B

26. 右旋体是产生神经毒性的主要根源,故开发其左旋体,用于治疗敏感厌氧菌引起的多种感染性疾病的药物是

- A: 替硝唑
- B: 多黏菌素
- C: 甲硝唑

D: 奥硝唑

答案：D

27. 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及记忆障碍药是

A: 利斯的明

B: 吡拉西坦

C: 多奈哌齐

D: 胞磷胆碱

答案：B

28. 雷尼替丁与硫酸铝合用

A: 出现呼吸抑制或停止

B: 可升高合用药物的血浆药物浓度

C: 减慢药物代谢速度

D: 使后者药效降低

答案：D

29. 治疗急性阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿应首选

A: 甲硝唑

B: 二氯尼特

C: 依米丁

D: 氯喹

答案：A

30. 大量用药可致球后视神经炎的药物是

A: 异烟肼

B: 红霉素

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

答案：D

31. 与肝素比较，低分子量肝素的特点不包括()

A: 不易致出血

B: 半衰期长，皮下注射吸收较好

C: 达肝素钠对延长 APTT 的作用较弱

D: 应用期间应常规检测抗凝疗效及调整剂量

答案：D

32. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

A: 白三烯受体阻断剂

B: M 受体拮抗剂

C: β_2 受体激动剂

D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

33. 在胃黏膜表面形成屏障的药物是

A: 枸橼酸铋钾

B: 法莫替丁

C: 奥美拉唑

D: 谷丙胺

答案：A

34. 疗效高，生效快，主要用于

A: 伯氨喹

B: 乙胺嘧啶

C: 氯喹

D: 甲氟喹

答案: C

35. (2016 年真题) 那于 GLP-1 受体激动剂的是

A: 那格列奈

B: 艾塞那肽

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案: B

36. 戈那瑞林的禁忌不包括

A: 妊娠期妇女

B: 肝肾病患者

C: 垂体腺瘤患者

D: 垂体相关性闭经者

答案: B

37. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是 ()。

A: 低血糖

B: 干咳

C: 光过敏

D: 水肿

答案: B

38. 重组人促红素的最佳适应证是

A: 慢性肾衰竭所致贫血

- B: 严重缺铁性贫血
- C: 化疗药物所致贫血
- D: 严重再生障碍性贫血

答案：A

39. 口服吸收少，用于肠道感染的是

- A: 甲氧苄啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 氧氟沙星
- D: 呋喃唑酮

答案：D

40. (2017 年真题) 属于抗雌激素的肿瘤药是 ()

- A: 氟他胺
- B: 他莫昔芬
- C: 炔雌醇
- D: 阿那曲唑

答案：B

41. 治疗黏液性水肿的主要药物是 ()

- A: 小剂量碘剂
- B: 甲巯咪唑
- C: 甲状腺素
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：C

42. 滴眼后可出现口腔苦味的药物是

- A: 利巴韦林

B: 四环素可的松

C: 氯霉素

D: 更昔洛韦

答案：C

43. 地高辛的主要适应证不包括

A: 慢性室性心律失常

B: 慢性心力衰竭

C: 急性心力衰竭

D: 室上性心动过速

答案：A

44. 直接舒张小动脉平滑肌的降压药是

A: 硝苯地平

B: 利血平

C: 肼屈嗪

D: 氢氯噻嗪

答案：C

45. 用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病的降糖药物是

A: 二甲双胍

B: 罗格列酮

C: 格列本脲

D: 阿卡波糖

答案：A

46. 下列哪项不是胰岛素的正确使用方法

A: 未使用的胰岛素应在 2℃~8℃ 冷藏保存

- B: 混悬型胰岛素可以静脉注射
- C: 每次注射需要更换不同部位
- D: 药物过量须及时给予葡萄糖或口服糖类

答案：B

47. 低剂量可提供接近全效降压作用的药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 阿米洛利
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

48. 治疗绦虫病的首选药品是()。

- A: 伊维菌素
- B: 伯氨喹
- C: 哌嗪
- D: 吡喹酮

答案：D

49. 下述不属于胃黏膜保护剂的是()

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 谷氨酰胺
- C: 前列腺素
- D: 硫糖铝

答案：B

50. 合成五味子丙素时的中间体，降低血清谷丙转氨酶效果好的是

- A: 异甘草酸镁

B: 还原型谷胱甘肽

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 双环醇

答案：D

51. 正在使用单胺氧化酶抑制剂的患者不宜选择

A: 夫西地酸

B: 利奈唑胺

C: 磷霉素

D: 头孢唑林

答案：B

52. 患者，女，46 岁。以“口角歪斜 3 天”之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A: 苯巴比妥

B: 苯妥英钠

C: 卡马西平

D: 伊曲康唑

答案：D

53. (2021 年真题) 属于细胞血凝素抑制剂的抗流感病毒药物是 ()

A: 阿比多尔

B: 博洛昔韦

C: 奥司他韦

D: 法匹拉韦

答案：A

54. (2017 年真题) 对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是 ()

- A: 头孢吡肟
- B: 氨曲南
- C: 拉氧头孢
- D: 头孢西丁

答案：B

55. 硫脲类药物的不良反应不包括 ()

- A: 过敏反应
- B: 粒细胞减少
- C: 诱发甲亢
- D: 发热

答案：C

56. (2016 年真题) 易发生持续性干咳不良反应的药品是

- A: 福辛普利
- B: 硝苯地平
- C: 硝酸甘油
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

57. 下述关于钡剂的描述，错误的是

- A: 两种钡剂不宜联用
- B: 牛奶可促进钡剂的吸收，服药期间应同服牛奶
- C: 不得同食高蛋白饮食，如牛奶
- D: 剂量过大时，可导致钡剂脑病现象

答案：B

58. 对抗新产生的血栓应首选

- A: 华法林
- B: 肝素
- C: 右旋糖酐
- D: 尿激酶

答案：D

59. 需要嚼碎服用的药品是

- A: 乳酸菌素片
- B: 胰酶肠溶片
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 泮托拉唑肠溶片

答案：A

60. 制成脂质体以降低药物肾毒性的抗真菌药是

- A: 阿糖胞苷
- B: 两性霉素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 卡泊芬净

答案：B

61. 可增加维生素 B6 经肾排出量的药物是

- A: 异烟肼
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 红霉素

答案：A

62. 被还原后的代谢物可抑制细菌的 DNA 代谢过程，促使细菌死亡，并可抑制阿米巴原虫的氧化还原反应，使原虫的氮链发生断裂的是

- A: 替硝唑
- B: 甲氧苄啶 (TMP)
- C: 磺胺甲噁唑 (SMZ)
- D: 莫西沙星

答案：A

63. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 瑞替普酶
- B: 阿替普酶
- C: 尿激酶
- D: 链激酶

答案：D

64. 以下属于袪利尿药的禁忌证的是()

- A: 高血糖
- B: 对试验剂量无反应的无尿者
- C: 高血压
- D: 高钾血症

答案：B

65. 属于 H1 受体阻断药，用于季节性 & 常年性过敏性鼻炎的预防与治疗的药物是

- A: 麻黄碱
- B: 过氧化氢

C: 酮替芬

D: 克罗米通

答案: C

66. 以下属于胰高糖素样肽-1 受体激动剂的是

A: 吡格列酮

B: 利拉鲁肽

C: 二甲双胍

D: 瑞格列奈

答案: B

67. 对抗香豆素过量引起出血可选用

A: 维生素

B: 垂体后叶素

C: 维生素 K1

D: 鱼精蛋白

答案: C

68. 关于普萘洛尔抗心律失常作用的描述，错误的是()

A: 主要通过阻断 β 受体对心脏产生作用

B: 对一般室性心律失常无效

C: 用于治疗与交感神经兴奋有关的心律失常

D: 对室性和室上性心律失常都有效

答案: B

69. (2017 年真题) 关于镇咳药作用强度的比较，正确的是 ()

A: 喷托维林 > 苯丙哌林 > 可待因

B: 苯丙哌林 > 喷托维林 > 可待因

C: 可待因>苯丙哌林>喷托维林

D: 苯丙哌林>可待因>喷托维林

答案: D

70. 对胰岛素产生耐受者选用

A: 丙硫氧嘧啶

B: 二甲双胍

C: 胰岛素

D: 格列本脲

答案: D

71. 中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

B: 奥美拉唑+口服地塞米松

C: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松

D: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松

答案: C

72. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是()。

A: 双八面体蒙脱石散

B: 洛哌丁胺片

C: 双歧三联活菌胶囊

D: 地衣芽孢杆菌胶囊

答案: B

73. 5 α -还原酶抑制剂的作用特点不包括

A: 降低血清前列腺特异抗原 (PSA) 水平

B: 无心血管不良反应

C: 减小增大的前列腺体积

D: 可以松弛前列腺平滑肌

答案: D

74. 多柔比星与 β 受体阻滞药合用，可能()

A: 增加肝毒性

B: 增加心脏毒性

C: 易产生沉淀

D: 导致坏死性结肠炎

答案: B

75. 冠状动脉支架置入术前一日起开始口服阿司匹林，剂量为每日

A: 75~150mg

B: 10~25mg

C: 150~300mg

D: 25~50mg

答案: D

76. 抑制心肌收缩力、延长 APD 及 ERP 的药物是()

A: 苯妥英钠

B: 美西律

C: 利多卡因

D: 奎尼丁

答案: D

77. 主要作用是抗革兰阴性杆菌的半合成青霉素是

A: 阿莫西林

B: 替莫西林

C: 哌拉西林

D: 替卡西林

答案: B

78. 可与小剂量糖皮质激素合用，能降低排异反应及感染的发生率，提高存活率的是()

A: 甲泼尼龙

B: 环孢素

C: 环磷酰胺

D: 硫唑嘌呤

答案: B

79. (2015 年真题) 属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂的是 ()。

A: 奥扎格雷

B: 氯吡格雷

C: 替罗非班

D: 阿司匹林

答案: B

80. 属于Ⅰ类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是()

A: 利多卡因

B: 奎尼丁

C: 胺碘酮

D: 普萘洛尔

答案: B

81. 对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

A: 第一代头孢菌素

- B: 第二代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素
- D: 第三代头孢菌素

答案：D

82. 下列关于升华硫的描述中，错误的是

- A: 不得与铁制品接触
- B: 可用于痤疮、脂溢性皮炎
- C: 避免接触眼睛和其他黏膜
- D: 儿童慎用

答案：A

83. 焦虑型、夜间醒来次数较多者宜选用

- A: 氟西洋
- B: 氯美扎酮
- C: 谷维素
- D: 夸西洋

答案：A

84. 属于抗雌激素类的抗肿瘤药是

- A: 他莫昔芬
- B: 阿那曲唑
- C: 氟他胺
- D: 炔雌醇

答案：A

85. 铁剂用于治疗

- A: 溶血性贫血

- B: 再生障碍性贫血
- C: 小细胞低血红蛋白性贫血
- D: 巨幼红细胞性贫血

答案：C

86. 噻嗪类利尿药可用于治疗肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症，是因为其可以抑制

- A: 远曲小管近端
- B: 磷酸二酯酶
- C: Na^+-Cl^- 共转运子
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

答案：B

87. 胰酶与下述哪种环境中药效最好

- A: 强碱性
- B: 酸性
- C: 微碱性
- D: 微酸性

答案：C

88. 高效抑菌药是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 异烟肼
- C: 头孢菌素
- D: 氯霉素

答案：A

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

89. 其缓释片剂应与食物同服的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/277140045046010024>