
常用园林绿化植物汇总

常用园林绿化植物汇总

名 称	生长习性（种类，花/果期、常见地）	栽培技术（栽植条件，运用价值）
桫欏木石楠	蔷薇科，苹果亚科；常绿乔木，高 6-15 米；花期 6 月，果期 9-10 月；产安徽南部、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、陕西、贵州、四川、云南等省区；	栽培土质以深厚、肥沃和排水良好的沙质土壤为宜，喜温暖湿润和阳光充足的环境，耐寒、耐阴、耐干旱、不耐水湿，萌芽力强，耐修剪；常用播种、扦插和压条繁殖；庭院有栽培，供观赏
桃花	蔷薇科，李亚科；落叶小乔木，高 3-8 米；花期 3-4 月，果期通常为 8-9 月；各省区广泛栽培，世界各地均有栽植	以嫁接为主，也可用播种、扦插和压条法繁殖
桂花	木犀科；常绿灌木或小乔木，高 3-5 米，最高可达 18 米；花期 9-10 月上旬，果期翌年 3 月；常见	喜温暖湿润，适宜栽植在通风透光的地方；生长土壤多为黄棕壤或黄褐土
石榴	石榴科；落叶灌木或乔木，高 3-4 米，也可达 5-7 米；果石榴花期 5-6 月，果期 9-10 月，花石榴花期 5-10 月；中国南北均有栽植；中国传统文化视石榴为吉祥物，象征多子多福	喜温暖向阳的环境，耐旱、耐寒，也耐瘠薄，不耐，不涝和荫蔽。对土壤要求不严，但以排水良好的夹沙土栽培为宜；
茶花	山茶科；灌木或小乔木，高 9 米；花期较长，从 10 月份到翌年 5 月份都有开放，盛花期通常在 1-3 月份；	性喜温暖、湿润的环境，惧风喜阳、地势高爽、空气流通、温暖湿润、排水良好、疏松肥沃的砂质壤土，黄土或腐殖土
紫丁香	木犀科；落 叶灌木 或小 乔木， 高	生长习性喜阳，喜土壤湿润

	1.5-4 米；花期 4-5 月，果期 6-10 月；分布以秦岭为中心，北到黑龙江，吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、陕西、甘肃、四川，朝鲜也有，南到云南和西藏均有。广泛栽培于世界各温带地区；名贵。	而排水良好，适庭院栽培，春季盛开时硕大而艳丽的花序布满全株，芳香四溢，观赏效果甚佳。是庭园栽种的著名花木；播种、扦插、嫁接、分株、压条繁殖
紫荆	蔷薇目，豆科；落叶乔木或灌木，高 2-5 米；花期 3-4 月；果期 8-10 月；中国东南部，北至河北，南至广东、广西，西至云南、四川，西北至陕西，东至浙江、江苏和山东等省区。	暖带树种，较耐寒。喜光，稍耐阴。喜肥沃、排水良好的土壤，不耐湿。萌芽力强，耐修剪；用播种、分株、扦插、压条等法，而以播种为主
夹竹桃	夹竹桃科；常绿直立大灌木，高达 5 米；花期几乎全年，夏秋为最盛；果期一般在冬春季；	喜光，喜温暖湿润气候，不耐寒，忌水渍，耐一定程度空气干燥。适生于排水良好、肥沃的中性土壤，微酸性、微碱土也能适应
樱花	蔷薇科李亚科；乔木，高 4-16 米；花期 4 月，果期 5 月；温带、亚热带树种	喜阳光和温暖湿润的气候条件，有一定抗寒能力。对土壤的要求不严，宜在疏松肥沃、排水良好的砂质壤土生长，但不耐盐碱土
梅花	蔷薇科梅亚科杏属；小乔木或稀灌木，高 4-10 米；花期冬春季，果期 5-6 月；我国各地均有栽培，但以长江流域以南各省最多；	喜温暖气候，耐寒性不强，较耐干旱，不耐涝，寿命长，可达千年；花期对气候变化特别敏感，梅喜空气湿度较大，但花期忌暴雨。
海棠	蔷薇科，苹果亚科；落叶小乔木，高可达 8 米；花期 4-5 月，果期 8-9	海棠性喜阳光，不耐阴。对严寒及干旱气候有较强的适

	月；产河北、山东、陕西、江苏、浙江、云南	应性，忌水湿。
芭蕉	芭蕉科；多年生草本植物，植株高2.5-4 米；芭蕉多产于亚热带地区，分布于日本、台湾以及中国大陆的上海、湖南、浙江、湖北、贵州、云南、陕西、四川、江苏、广西等地	性喜温暖耐寒力弱，茎分生能力强，耐半荫，适应性较强，生长较快。
木槿	锦葵科木槿属；落叶灌木，高 3-4 米；花期 7~10 月；木槿原产东亚，主要分布于中国台湾、福建、广东、广西、云南、贵州、四川、湖南、湖北、安徽、江西、浙江、江苏、山东、河北、河南、陕西等省区	木槿喜光而稍耐阴，喜温暖、湿润气候，较耐寒，但在北方地区栽培需保护越冬，好水湿而又耐旱，对土壤要求不严，在重黏土中也能生长。萌蘖性强，耐修剪；庭院常见灌木花种
鸢尾	鸢尾科；多年生宿根性直立草本；花期 4~6 月；果期 6~8 月；原产于中国中部以及日本,主要分布在中国中南部；产山西、安徽、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、江西、广西、陕西、甘肃、青海、四川、贵州、云南、西藏，缅甸，日本。	耐寒性较强，按习性可分为： 1 要求适度湿润，排水良好，富含腐殖质、略带碱性的粘性土壤； 2 生于沼泽土壤或浅水层中； 3 生于浅水中；4 喜阳光充足，气候凉爽，耐寒力强，亦耐半阴环境；可供观赏，花香气淡雅，可以调制香水，其根状茎可作中药，全年可采，具有消炎作用。春季开花，花期三个月左右，4-6 月，多采用分株、播种法。分株春季花后或秋季进行均可，一般种植 2-4 年后分栽 1 次。

		分割根茎时，注意每块应具有 2-3 个不定芽。种子成熟后应立即播种，实生苗需要 2-3 年才能开花。栽植距离 45-60cm，栽植深度 7-8cm 为宜。亦可以进行促成栽培。 分株，播种
玉簪	百合科；多年生宿根草本花卉；花期 7~9 月；产四川（峨眉山至川东）、湖北，湖南、江苏、安徽、浙江、福建和广东。	玉簪性强健，耐寒冷，性喜阴湿环境，不耐强烈日光照射，要求土层深厚，排水良好且肥沃的砂质壤土。簪属于典型的阴性植物，喜阴湿环境，受强光照射则叶片变黄，生长不良，喜肥沃、湿润的沙壤土，性极耐寒，中国大部分地区均能在露地越冬，地上部分经霜后枯萎，翌春宿萌发新芽。忌强烈日光暴晒。分株，播种
乐昌含笑	木兰科；常绿乔木，高 3-5 米；花期 3-4 月，果期 8-9 月；原产于中国江西（南部）、湖南（南部）、广东（西部及北部）、广西（东部）、贵州等地。越南也有。	喜温暖、湿润的气候，生长适宜温度为 15-32℃，能抗 41℃ 的高温，亦能耐寒。喜光，但苗期喜偏阴。喜土壤深厚、疏松、肥沃、排水良好的酸性至微碱性土壤。能耐地下水位较高的环境，在过于干燥的土壤中生长不良。一般在山坡中下部及山谷两侧生长较好，而山脊、

		山坡上部生长较差。
牡丹	毛茛科芍药亚科；多年生落叶小灌木；花期 5 月，果期 6 月；中国滇、黔、川、藏、新、青、甘、宁、陕、桂、湘、粤、晋、豫、鲁、闽、皖、赣、苏、浙、沪、冀、内蒙古、京、津、黑、辽、吉、琼、港、台等地均有牡丹种植。大体分野生种、半野生种及园艺栽培种几种类型。	性喜温暖、凉爽、干燥、阳光充足的环境。喜阳光，也耐半阴，耐寒，耐干旱，耐弱碱，忌积水，怕热，怕烈日直射。适宜在疏松、深厚、肥沃、地势高燥、排水良好的中性沙壤土中生长。酸性或黏重土壤中生长不良。南方的高温高湿天气对牡丹生长极为不利，充足的阳光对其生长较为有利，但不耐夏季烈日暴晒，温度在 25℃ 以上则会使植株呈休眠状态
天蓝绣球	花荵科；多年生草本植物，茎直立，高 60-100 厘米；原产北美洲东部。中国各地庭园常见栽培	暖温带植物。性喜温暖、湿润、阳光充足或半阴的环境。不耐热，耐寒，忌烈日暴晒，不耐旱，忌积水。宜在疏松、肥沃、排水良好的中性或碱性的沙壤土中生长。生长期要求阳光充足，但在半阴环境也能生长。夏季生长不良，应遮荫，避免强阳光直射。较耐寒，可露地越冬
茉莉	木犀科素馨亚科；直立或攀援灌木，高达 3 米；花期 5~8 月，果期 7~9 月；原产印度、中国南方和世界各地广泛栽培	茉莉性喜温暖湿润，在通风良好、半阴的环境生长最好。土壤以含有大量腐殖质的微酸性砂质土壤为最适合；多用扦插，也可压条或分株

木芙蓉	锦葵科,木槿属;落叶灌木或小乔木;花期 8-10 月;中国辽宁、河北、山东、陕西、安徽、江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州和云南等省区栽培,系中国湖南原产	其喜温暖、湿润环境,不耐寒,忌干旱,耐水湿。对土壤要求不高,瘠薄土地亦可生长。
紫玉兰	木兰科木兰属;落叶灌木,高达 3 米,常丛生;花期 3-4 月,果期 8-9 月;分布在中国云南、福建、湖北、四川等地;非常名贵,且不易移植和养护;	喜温暖湿润和阳光充足环境,较耐寒,但不耐旱和盐碱,怕水淹,要求肥沃、排水好的沙壤土。
天竺桂	樟科樟亚科;常绿乔木,高 10-15 米;花期 4-5 月,果期 7-9 月;分布主要城市:武汉、沙市、黄石、宜昌、南昌、景德镇、九江、吉安、井冈山、赣州、上海、长沙、株洲、岳阳、怀化、吉首、常德、湘潭、衡阳、邵阳、桂林、温州、金华、宁波、重庆、成都、都江堰、绵阳、乐山、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、六盘水、安顺、昆明、大理等。	中性树种。幼年期耐阴。喜温暖湿润气候,在排水良好的微酸性土壤上生长最好,中性土壤亦能适应。平原引种应注意幼年期庇荫和防寒,在排水不良之处不宜种植。移植时必须带土球,还需适当修剪枝叶。对二氧化硫抗性强。
红继木	金缕梅科金缕梅亚科;常绿灌木或小乔木;花期 4~5 月,花期长,约 30~40 天,国庆节能再次开花,果期 8 月。;主要分布于长江中下游及以南地区;印度北部也有分布。产于湖南浏阳市、长沙县、江苏苏州、无锡、宜兴、溧阳、句容等。	喜光,稍耐阴,但阴时叶色容易变绿。适应性强,耐旱。喜温暖,耐寒冷。萌芽力和发枝力强,耐修剪。耐瘠薄,但适宜在肥沃、湿润的微酸性土壤中生长。
丰花月季	蔷薇科蔷薇亚科;丛生性落叶灌木;	性强健,适应性强,阳性,

	花期长，春末至秋季均开花；分布广泛，衡阳也常见	喜温暖气候，较耐寒 。一般都采用扦插繁殖，亦可分株、压条繁殖。
法国冬青	又叫日本珊瑚树；忍冬科；常绿阔叶灌木或小乔木，高 2—10 米；花期 5—6 月，果期 7—9 月；原产中国浙江（普陀、舟山）和台湾。长江下游各地常见栽培。日本和朝鲜南部也有分布，华东地区、华南地区	耐荫、喜光植物。喜温暖、阳光。稍耐阴，不耐寒；绿篱及绿雕，各地庭园有栽培，作绿篱。阻挡尘埃、吸收多种空气中有害气体、降低种植环境噪音。
榆树	榆科；落叶乔木，高达 25 米；花期 3~4 月；果熟期 4~5 月；分布于东北、华北、西北及西南各省区，长江下游各省有栽培。也为华北及淮北平原农村的习见树木。	阳性树，生长快，根系发达，适应性强，能耐干冷气候及中度盐碱，但不耐水湿（能耐雨季水涝）。抗风能力强，寿命长，抗有毒气体，能适应城市环境。在土壤深厚、肥沃、排水良好之冲积土及黄土高原生长良好。可作西北荒漠、华北及淮北平原、丘陵及东北荒山、砂地及滨海盐碱地的造林或“四旁”绿化树种。
碧桃	蔷薇科李亚科；乔木，高 3-8 米；碧桃花大色艳，开花时美丽漂亮，观赏期 15 天之久；原产中国，分布在西北、华北、华东、西南等地。现世界各国均已引种栽培。 主要城市：江苏、山东、浙江、安徽、浙江、上海、河南、河北等地。	碧桃性喜阳光，耐旱，不耐潮湿的环境。喜欢气候温暖的环境，耐寒性好。要求土壤肥沃、排水良好。。在园林绿化中被广泛用于湖滨、溪流、道路两侧和公园等等，在小型绿化工程如：庭院绿化点缀、私家花园等，也用

		于盆栽观赏，还常用于切花和制作盆景。常见的还有垂枝碧桃。碧桃的园林绿化用途广泛，绿化效果突出，栽植当年既有特别好的效果体现。可列植、片植、孤植，当年既有特别好的绿化效果体现。碧桃是园林绿化中常用的彩色苗木之一，和紫叶李，紫叶矮樱等苗木通常一起使用。
紫薇	又称“百日红”；千屈菜科；落叶灌木或小乔木，高可达7米；花期长，由6月可开至9月；中国广东、广西、湖南、福建、江西、浙江、江苏、湖北、河南、河北、山东、安徽、陕西、四川、云南、贵州及吉林均有生长或栽培，原产亚洲，广植于热带地区。	喜暖湿气候，喜光，略耐阴，喜肥，尤喜深厚肥沃的砂质壤土，好生于略有湿气之地，亦耐干旱，忌涝，忌种在地下水位高的低湿地方，性喜温暖，而能抗寒，萌蘖性强。紫薇还具有较强的抗污染能力，对二氧化硫、氟化氢及氯气的抗性较强。
银杏	又称白果树；银杏科；落叶大乔木，胸径可达4米；4月上旬至中旬开花，9月下旬至10月上旬种子成熟，10月下旬至11月落叶；银杏的栽培区甚广，主要分布温带和亚热带气候气候区内，以山东、浙江、江西、安徽、广西、湖北、四川、江苏、贵州等省最多；是世界上十分珍贵的树种之一，因此被当作植物界中的“活化	阳性树，喜适当湿润而排水良好的深厚壤土，适于生长在水热条件比较优越的亚热带季风区。在酸性土（pH4.5）、石灰性土（pH8.0）中均可生长良好，而以中性或微酸土最适宜，不耐积水之地，较能耐旱

	石”	
海枣	棕榈科；乔木状，高达 35 米；花期 3-4 月，果期 9-10 月；原产西亚和北非。福建、广东、广西、云南等省区有引种栽培，在云南元谋露地栽培能结实。海枣是干热地区重要果树作物之一，且有大量栽培，尤以伊拉克为多，占世界的 1/3	属阳生植物，喜光，耐半阴。生性喜高温多湿，耐酷热，也能耐寒。生长适温 20～30℃，越冬温度-5～-10℃。极为抗风。耐盐碱，耐贫瘠，在肥沃的土壤中生长迅速。
红皮榕	桑科；常绿乔木，树高达 20～30m，胸径达 2m；花期 5～6 月，果熟期 9～10 月，南方大部分地区有分布	红皮榕耐寒耐旱，生命力强，海拔在 2000 米，温度：零下 -10 摄氏度左右。
棕榈	棕榈科；常绿乔木，高 3-10 米；花期 4 月，果期 12 月；棕榈原产于西非，现世界各地均有栽培，棕榈是世界上最耐寒的棕榈科植物之一。除西藏外我国秦岭以南地区均有分布，北起陕西南部，南到广东、广西和云南、西达西藏边界，东至上海浙江。主要分布在秦岭、长江流域以南温暖湿润多雨地区，以四川、云南、贵州、湖南、湖北、陕西最多，从长江出海口，沿长江上游西岸 500 千米地带广为分布。	棕榈性喜温暖湿润的气候，极耐寒，较耐阴，成品极耐旱，惟不能抵受太大的日夜温差。棕榈是国内分布最广，分布纬度最高的棕榈科种类。喜温暖湿润气候，喜光。耐寒性极强，稍耐阴。适生于排水良好、湿润肥沃的中性、石灰性或微酸性土壤，耐轻盐碱，也耐一定的干旱与水湿。抗大气污染能力强。易风倒，生长慢。
慈孝竹	又名孝顺竹；为禾本科灌木型丛生竹，地下茎合轴丛生，高 2～7 米；原产中国，主产于广东、广西、福建、西南等省区，长江流域及以南地区园林绿地中习见栽培观赏或作绿篱，丛生竹类中分布最广，适应性最强的	性喜温暖湿润气候，但在南方暖地竹种中，慈孝竹的耐寒力较强，喜排水良好、湿润的土壤。

	竹种之一	
早园竹	又称早竹、雷竹、燕竹；高 6-8 米；笋期 4 月上旬开始,出笋持续时间较长；产河南、江苏、安徽、浙江、贵州、广西、湖北等省区。	喜温暖湿润气候。早园竹秆高叶茂，生长强壮，耐旱力抗寒性强，能耐短期摄氏零下 20 度低温；适应性强，轻碱地，沙土及低洼地均能生长，是华北园林栽培观赏的主要竹种
紫竹	乔本科刚竹属，竿高 4-7 米；笋期 4 月下旬；原产我国，分布于浙江、江苏、安徽、湖北、湖南、福建及陕西等省。紫竹为传统的观杆竹类，竹秆紫黑色，柔和发亮，隐于绿叶之下，甚为绮丽。	阳性，喜温暖湿润气候，耐寒，能耐-20℃低温、耐阴、忌积水、适合砂质排水性良好的土壤，对气候适应性强；
榆叶梅	又叫小桃红；蔷薇科李亚科；灌木稀小乔木，高 2-3 米；花期 4-5 月，果期 5-7 月；产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、山东、江西、江苏、浙江等省区。中国各地多数公园内均有栽植。	喜光，稍耐阴，耐寒，能在-35℃下越冬。对土壤要求不严，以中性至微碱性而肥沃土壤为佳。根系发达，耐旱力强。不耐涝。抗病力强。
广玉兰	又称荷花玉兰；木兰科；常绿乔木，在原产地高达 30 米；花期 5-6 月，果期 9-10 月；原产北美东南部。中国长江流域以南各大城市栽培。北亚热带落叶、常绿阔叶混交林区主要城市：（南京、扬州、镇江、南通、常州、无锡、苏州、合肥、芜湖、安庆、淮南、襄樊、十堰）中亚热带常绿、落叶阔叶林区主要城市：（武汉、沙	弱阳性，喜温暖湿润气候，抗污染，不耐碱土。幼苗期颇耐阴。喜温暖、湿润气候。较耐寒，能经受短期的 -19 度低温。在肥沃、深厚、湿润而排水良好的酸性或中性土壤中生长良好。根系深广，颇能抗风。病虫害少。生长速度中等，实生苗生长缓慢，

	市、黄石、宜昌、南昌、景德镇、九江、吉安、井冈山、赣州、上海、长沙、株洲、岳阳、怀化、吉首、常德、湘潭、衡阳、邵阳、桂林、温州、金华、宁波、重庆、成都 、都江堰、绵阳、内江、乐山、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、六盘水、安顺、昆明、大理)南亚热带常绿阔叶林区主要城市：(福州、厦门、泉州、漳州、广州、佛山、顺德 、东莞 、惠州、汕头、台北、柳州、桂平、个旧)	10 年后生长逐渐加快。
尖叶杜英	又叫长芒杜英；杜英科；常绿乔木，高达 30m； 花期为 4-5 月；产于云南南部，广东和海南。中南半岛及马来西亚也有分布	暖地树种，较速生，喜温暖湿润环境，适生于酸性的黄壤，但要求排水良好，其根系发达，萌芽力强。
鹅掌楸	木兰科；乔木，高达 40 米，胸径 1 米以上；花期 5 月，果期 9-10 月；产于陕西、安徽以南，西至四川、云南，南至南岭山地，主要有陕西、安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南（桑植、新宁）、广西、四川、贵州、云南，台湾有栽培；中国特有的珍稀植物	喜光及温和湿润气候，有一定的耐寒性，喜深厚肥沃、适湿而排水良好的酸性或微酸性土壤（ pH4.5-6.5 ），在干旱土地上生长不良，也忌低湿水涝。
合欢	豆科含羞草亚科；落叶乔木，高可达 16m； 花期 6~7 月；果期 8~10 月；产于中国黄河流域及以南各地。分布于华东、华南、西南以及辽宁、河北、河南、陕西等省	生于山坡或栽培。合欢喜温暖湿润和阳光充足环境，对气候和土壤适应性强，宜在排水良好、肥沃土壤生长，耐瘠薄土壤和干旱气候，不耐水涝。生长迅速。

栾树	无患子科车桑子亚科;落叶乔木或灌木,花期 6-8 月,果期 9-10 月;栾树产中国北部及中部大部分省区,世界各地有栽培。东北自辽宁起经中部至西南部的云南,以华中、华东较为常见,主要繁殖基地有江苏、浙江、江西、安徽,河南也是栾树生产基地之一。	栾树是一种喜光,稍耐半荫的植物;耐寒;但是不耐水淹,栽植注意土地,耐干旱和瘠薄,对环境的适应性强,喜欢生长于石灰质土壤中,耐盐渍及短期水涝。栾树具有深根性,萌蘖力强,生长速度中等,幼树生长较慢,以后渐快,有较强抗烟尘能力。在中原地区尤其是许昌鄢陵多有栽植。抗风能力较强,可抗零下 25℃ 低温,对粉尘、二氧化硫和臭氧均有较强的抗性。
泡桐	玄参科;多为落叶乔木,在热带为常绿;共 7 种,均产中国,除东北北部、内蒙古、新疆北部、西藏等地区外全国均有分布,栽培或野生,有些地区正在引种。白花泡桐在越南、老挝也有分布,有些种类已在世界各大洲许多国家引种栽培,主要用其木材。从中国东北辽宁南部、华北、华中、华东、华南、西南至西北部分地区都能生长,各地都有适应当地生态环境的种类	桐对热量要求较高,对大气干旱的适应能力较强,但因种类不同而有一定差异。对土壤肥力、土层厚度和疏松程度也有较高要求。在怕水淹、粘重的土壤上生长不良。地下水位不足 2 米时,生长也差。土壤 pH 以 6~7.5 为好。泡桐生长迅速,7~8 年生即可成材。泡桐属的物种都是阳性树种,最适宜生长于排水良好、土层深厚、通气性好的沙壤土或砂砾土,它喜土壤湿润肥沃,对镁、钙、锶等元素有选择吸收的

		倾向，因此要多施氮肥，增施镁、钙、磷肥。
罗汉松	罗汉松科；常绿针叶乔木，高达 20m；花期 4-5 月，种子 8-9 月成熟；产于江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖南、四川、云南、贵州、广西、广东等省区，栽培于庭园作观赏树。野生的树木极少。	喜温暖湿润气候，耐寒性弱，华北盆栽观赏；耐阴性强；喜排水良好湿润之砂质壤土，对土壤适应性强，盐碱土上亦能生存；对二氧化硫、硫化氢、氧化氮等多种污染气体抗性较强；抗病虫害能力强。
海桐	海桐科；常绿灌木或小乔木，高达6米；花期 3 至 5 月，果熟期 9 至 10 月；产于中国江苏南部、浙江、福建、台湾、广东等地；朝鲜、日本亦有分布。长江流域、淮河流域广泛分布，园林用的海桐产地如江苏、苏州、张家港等	耐阴植物；对气候的适应性较强，能耐寒冷，亦颇耐暑热。长江流域及其以南各地庭园习见栽培观赏。
海栀子	又叫四季栀子；茜草科；海栀子植株呈矮灌木状，枝干多横斜生长。叶较栀子花的叶狭小，呈倒披针形或倒卵形，基部渐狭至柄。花重瓣，在正常管理水平下，可四季开花，花芬芳扑鼻，花色晶莹如玉，衬以绿叶，格外俏丽可爱。	较耐阴，喜温暖、湿润气候，不宜强烈阳光照射。适宜于生长在疏松、肥沃、保水保肥力强而又排水良好的酸性土壤中。它喜肥，可施用饼肥或猪粪尿等有机肥料；是重要的美化居室的盆栽花卉，也是园林绿化中重要的芳香型造景植物
杨梅	杨梅科；常绿小乔木或灌木，高可达 15 米以上，胸径达 60 余厘米；4 月开花，6-7 月果实成熟；杨梅在中国	杨梅，喜酸性土壤，原产中国温带、亚热带湿润气候的海拔 125-1500 米的山坡或山

	分布的省份有云南、贵州、浙江、江苏、福建、广东、湖南、广西、江西、四川、安徽、台湾等	谷林中，主要分布在长江流域以南、海南岛以北，即北纬 20 度至 31 度之间，与柑桔、枇杷、茶树、毛竹等分布相仿，但其抗寒能力比柑桔、枇杷强
红枫	又名红叶羽毛枫,小鸡爪槭;槭树科;花期 4-5 月,果熟期 10 月;主要分布在中国亚热带,日本及韩国等,特别是长江流域,全国大部分地区均有栽培。主要基地有江苏,浙江,安徽,江西,山东,湖南等。红枫是一种非常美丽的观叶树种,其叶形优美,红色鲜艳持久,枝序整齐,层次分明,错落有致,树姿美观。广泛用于园林绿地及庭院做观赏树,以孤植、散植为主,宜布置在草坪中央,高大建筑物前后、角隅等地,红叶绿树相映成趣。它也可盆栽做成露根、倚石、悬崖、枯干等形状,风雅别致。	亚热带树种。性喜湿润、温暖的气候和凉爽的环境,较耐阴、耐寒,忌烈日暴晒。土壤要求不严,适宜在肥沃、富含腐殖质的酸性或中性沙壤土中生长,不耐水涝。属中性偏阴树种,但尚是比较耐寒的,在黄河流域一带,冬季气温低达-20℃,但只要环境良好,仍可露地越冬。至于黄河以北,则宜盆栽,冬季入室为宜。红枫在土壤 pH5.5~7.5 的范围内能适应,故在微酸性土、中性土和石灰性土中均可生长。
鸡爪槭	又名鸡爪枫;槭树科;落叶小乔木;花果期 5~9 月;产山东、河南南部、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州等省。生于海拔200~1200 米的林边或疏林中。	喜疏荫的环境,夏日怕日光曝晒,抗寒性强,能忍受较干旱的气候条件。多生于阴坡湿润山谷,耐酸碱,较耐燥,不耐水涝,适应于湿润和富含腐殖质的土壤。鸡爪槭为弱阳性树种,耐半荫,在阳光直射处孤植夏季易遭

		日灼之害；喜温暖湿润气候及肥沃、湿润而排水良好之土壤，耐寒性强，酸性、中性及石灰质土均能适应。生长速度中等偏慢。
红叶李	又称紫叶李；蔷薇科李亚科；落叶小乔木，高可达 8 米；花期 4 月，果期 8 月	紫叶李整个生长季节都为紫红色，宜于建筑物前及园路旁或草坪角隅处栽植。
雀舌黄杨	黄杨科；灌木，高 3-4 米；花期 2 月，果期 5-8 月；主要分布在中国云南、四川、贵州、广西、广东、江西、浙江、湖北、河南、甘肃、陕西（南部），为中国特有种	喜温暖湿润和阳光充足环境，耐干旱和半阴，要求疏松、肥沃和排水良好的沙壤土。弱阳性，耐修剪，较耐寒，抗污染。是一种极好的观赏类植物，适合于盆景栽植
金边黄杨	卫矛科；常绿灌木或小乔木；花期 5—6 月，果期 9—10 月；北亚热带落叶、常绿阔叶混交林区(主要城市：南京、扬州、镇江、南通、常州、无锡、苏州、合肥、芜湖、安庆、淮南、襄阳、十堰)中亚热带常绿、落叶阔叶林区（主要城市：武汉、沙市、黄石、宜昌、南昌、景德镇、九江、吉安、井冈山、赣州、上海、长沙、株洲、岳阳、怀化、吉首、常德、湘潭、衡阳、邵阳、桂林、温州、金华、宁波、重庆、成都 、都江堰、绵阳、内江、乐山、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、六盘水、安顺、昆明、大理)	喜光，稍耐阴。适应性强，耐旱。喜温暖，耐寒冷。萌芽力和发枝力强，耐修剪。耐瘠薄，但适宜在肥沃、湿润的微酸性土壤中生长；叶嫩绿洁净，叶有黄、白斑纹，清丽幽雅，是理想的绿篱和盆景材料，适用于门庭和中心花坛布置，也可盆栽观赏。

小叶黄杨	又名瓜子黄杨；黄杨科；常绿灌木，高 2m；花期 3~4 月，果期 8-9 月；产安徽（黄山）、浙江（龙塘山）、江西（庐山）、湖北（神农架及兴山）	性喜肥沃湿润土壤，忌酸性土壤。抗逆性强，耐水肥，抗污染，能吸收空气中的二氧化硫等有毒气体，有耐寒，耐盐碱、抗病虫害等许多特性
小叶女贞	木犀科；落叶灌木，高 1-3 米；花期 5-7 月，果期 8-11 月；产于陕西南部、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖北、四川、贵州西北部、云南、西藏察隅。	小叶女贞喜阳，稍耐荫，较耐寒，但幼苗不甚耐寒。华北地区可露地栽培；对二氧化硫、氯化氢等毒气有较好的抗性。耐修剪，萌发力强。适生于肥沃、排水良好的土壤。
樟树	又叫香樟，竹叶楠；常绿大乔木，高可达 50 米，胸径 5 米；花期 4~5 月，果实成熟期 11 月；我国长江流域以南各省均有分布，一般生长于海拔 1000 米以下的酸性土地带中，多零星分布于村前宅后，常与马尾松、枫香等组成混交林	亚热带苗木，喜温暖、湿润的气候和肥沃、深厚的酸性或中性沙壤土，也可生长于含盐量 0.2% 以内的盐碱土中，不耐干旱瘠薄，忌水湿。较喜光，幼苗木喜阴，成苗木需日照充足。深根性，生长快，寿命长，萌芽性强，耐修剪。对臭氧及二氧化硫等有毒气体抗性强，并有吸附粉尘、减弱噪声等功能
杜鹃	又名映山红、山石榴；杜鹃花科；常绿或平常绿或落叶灌木，高 2-5 米；花期 4-5 月，果期 6-8 月；产自中国江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、	喜欢酸性土壤，在钙质土中生长得不好，甚至不生长。酸性土壤的指示作物。杜鹃性喜凉爽、湿润、通风的半阴环境，既怕酷热又怕严寒，

	贵州和云南	生长适温为 12℃至 25℃，夏季气温超过 35℃，则新梢、新叶生长缓慢，处于半休眠状态。夏季要防晒遮阴，冬季应注意保暖防寒。忌烈日暴晒，适宜在光照强度不大的散射光下生长。冬季，露地栽培杜鹃要采取措施进行防寒，以保其安全越冬。
楠木	樟科；中亚热带常绿大乔木，高可达 30 米，胸径可达 1 米；花期 4-5 月，果期 9-10 月；在我国贵州、四川、重庆、湖北等地区有天然分布，是组成常绿阔叶林的主要树种。；国家二级保护渐危种，为中国和南亚特有，是驰名中外的珍贵用材树种	野生的多见于海拔 1500 米以下的阔叶林中；楠木以其材质优良，用途广泛而著称于世，是楠木属中经济价值最高的一种。又是著名的庭园观赏和城市绿化树种；楠木喜湿耐荫，立地条件要求较高，造林地以选择土层深厚、肥润的山坡、山谷冲积地为宜。
红叶石楠	蔷薇科；常绿灌木或小乔木，株高 1-2 米，是石楠属杂交品种，它的叶通常为红色，为观叶植物，常丛植或成片种植，也可用做绿篱；花期 4-5 月；中国华东、中南及西南地区有栽培，随着城市园林绿化的蓬勃发展，在北京、天津、山东、河北、陕西等地均有引种栽培。	喜温暖、潮湿、阳光充足的环境。耐寒性强，能耐最低温度-18℃。喜强光照，也有很强的耐荫能力。适宜各类中肥土质。耐土壤瘠薄，有一定的耐盐碱性和耐干旱能力。不耐水湿。红叶石楠生长速度快，萌芽性强，耐修剪，易于移植，成形。
石楠	蔷薇科苹果亚科；常绿灌木或小乔	喜光稍耐荫，深根性，对土

	木, 高 3-6 米; 花期 6-7 月; 产陕西、甘肃、河南、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、福建、台湾、广东、广西、四川、云南、贵州。	壤要求不严, 但以肥沃、湿润、土层深厚、排水良好、微酸性的砂质土壤最为适宜, 能耐短期-15℃的低温, 喜温暖、湿润气候, 在焦作、西安及山东等地能露地越冬。萌芽力强, 耐修剪, 对烟尘和有毒气体有一定的抗性。
八仙花	虎耳草科; 落叶灌木; 花期 6-8 月; 八仙花原产中国和日本。八仙花原产日本及中国四川一带。1736 年引种到英国。在欧洲, 荷兰、德国和法国栽培比较普遍, 在花店可以看到红、蓝、紫等色八仙花品种。在小庭园、建筑物前地栽八仙花也不少	喜温暖、湿润和半阴环境。八仙花的生长适温为 18~28℃, 冬季温度不低于 5℃。八仙花盆土要保持湿润, 但浇水不宜过多, 特别雨季要注意排水, 防止受涝引起烂根。冬季室内盆栽八仙花以稍干燥为好。八仙花为短日照植物, 每天黑暗处理 10 小时以上, 约 45~50 天形成花芽。平时栽培要避开烈日照射, 以 60%~70%遮荫最为理想。土壤以疏松、肥沃和排水良好的砂质壤土为好。但土壤 pH 的变化, 使八仙花的花色变化较大。为了加深蓝色, 可在花蕾形成期施用硫酸铝。为保持粉红色, 可在土壤中施用石灰
美人蕉	美人蕉科; 多年生宿根草本植物, 高	喜温暖湿润气候, 不耐霜冻,

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278022016024006123>