

2017年初级护师考试《专业知识》真题及答案

2017年初级护师《专业知识》真题及答案

a1 题型

每一道考试题下面有 a ,b, c, d, e 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案

1.肺炎球菌肺炎高热病人降温不宜采用

- a.温水擦身
- b.酒精擦浴
- c.退热药 (√)
- d.大血管区放置冰袋
- e.多饮水

2.有机磷农药中毒的烟碱样症状是

- a.瞳孔小如针尖
- b.大汗淋漓
- c.呕吐物有大蒜味
- d.肌纤维颤动 (√)
- e.呼吸困难

3.休克患者每小时尿量应维持在多少毫升以上

- a.15
- b.30 (√)
- c.60
- d.80
- e.100

4.急进型高血压最常见的致死原因为

- a.脑梗死
- b.心肌梗死
- c.心乃衰竭
- d.尿毒症 (√)
- f.脑出血

5.中毒性肺炎病人出现哪种表现提示病情严重

- a.烦躁不安
- b.尿量增加
- c.体温升高
- d.脉搏加快
- e.脉压差变小 (√)

6.腹痛剧烈的急性胰腺炎病人宜

- a.低脂肪流质饮食
- b.低蛋白流质饮食
- c.低碳水化合物流质饮食
- d.高维生素半流质饮食
- e.禁食 (√)

7.下列除哪项外均提示脑出血未停止

- a.瞳子先缩小后散大
- b.意识障碍加深
- c.血压继续升高
- d.脉搏加快 (√)
- e.呼吸不规则

8.呼吸困难病人常取的体位址

- a.平卧位
- b.头低脚高位
- c.侧卧位
- d.俯卧位
- e.半坐位 (√)

9.有关口服铁剂的注意事项,错误的是

- a.向病人说明服用铁剂后可出现黑粪
- b.服用铁剂前后 1h 禁饮浓茶
- c.避免铁剂溶液与牛奶同服
- d.服铁剂溶液时要用吸管吸入咽下
- e.症状改善后可停药 (√)

10. 癫痫强直阵挛发作呈持续状态时，最重要的护理措施是

- a. 注意保暖
- b. 吸氧 3 ~ 5l/min
- c. 防止跌伤
- d. 防止继发感染
- e. 保持呼吸道通畅 (√)

11. 上消化道大出血伴休克时的首要护理措施是

- a. 安定患者情绪
- b. 准备急救用品
- c. 建立静脉输液途径 (√)
- d. 迅速配血
- e. 按医嘱采取止血措施

12. 下列哪项不符合癫痫药物治疗原则

- a. 大剂量开始 (√)
- b. 单一用药无效者可联合用药
- c. 达疗效后继续正规用药
- d. 连续 3 年无发作后可缓慢减量
- e. 以小剂量维持后停药

13. 下列哪项是缺铁性贫血表现

- a. 牙龈出血
- b. 发热伴大量出汗
- c. 骨骼疏松
- d. 毛发无光泽及“反甲” (√)
- e. 皮肤紫癜

14. 肾病性水肿肾功能正常者错误的护理是

- a. 低蛋白饮食 (√)
- b. 限制钠盐摄入
- c. 保持皮肤清洁
- d. 静脉输液需控制滴速和总量
- e. 病室定期清洁、消毒

15.慢性肾功能衰竭后期病人，一旦出现下列哪种情况提示病情严重

- a. 少尿、高血钾 (√)
- b. 中度贫血
- c. 乏力、食欲减退
- d. 水肿、低钠血症
- e. 呼气有尿臭味

16.肠鸣音减弱或消失见于

- a. 急性肠炎
- b. 肠麻痹 (√)
- c. 中等量腹水
- d. 腹膜增厚
- e. 消化道出血

17.急性心肌梗塞患者病后第一周护理，错误的是

- a. 日常生活均由护理人员帮助照料
- b. 半量清淡流质或半流质饮食
- c. 限制亲友探望
- d. 鼓励在床上做伸展四肢活动 (√)
- e. 避免不必要翻身

18.对轻症中暑者应给予

- a. 静脉注射生理盐水
- b. 物理降温
- c. 药物降温
- d. 阴凉通风处休息，饮清凉饮料 (√)
- e. 吸氧 3 ~ 5l/min

19.肺结核咯血病人宜取患侧卧位是为了

- a. 放松身心
- b. 减轻胸痛
- c. 有利引流
- d. 防止病灶向对侧扩散 (√)

e.避免窒息

20.风湿性心脏病心房颤动病人突然抽搐、偏瘫，首先考虑

a.心力衰竭加重

b.洋地黄中毒

c.低钾血症

d.脑栓塞 (√)

e.蛛网膜下腔出血

21.下列标本采集法错误的是

a.尿蛋白定量测定留取 24h 尿液

b.尿酮体检查随时留尿

c.内生肌酐清除率测定前摄低蛋白饮食 3d

d.血尿素氮测定取静脉血置抗凝管内

e.血钾测定取静脉血置抗凝管内 (√)

22.诱发肺心病心功能失代偿的最常见原因是

a.过度劳累

b.补液过快

c.呼吸道感染 (√)

d.摄盐过多

e.心律失常

23.尿毒症最早出现的症状是

a.厌食、恶心、呕吐 (√)

b.嗜睡、定向力障碍

c.咳嗽、胸痛

d.皮肤黏膜出血

e.血压升高

24.支气管肺癌常见的早期症状是

a.声音嘶哑

b.胸痛

c.气促

d.呛咳 (√)

e.发热

25.高温环境劳动的工人，为预防中暑宜饮

a.矿泉水

b.含糖饮料

c.含咖啡饮料

d.含盐饮料 (√)

e.含酒精饮料

26.空腹或餐后 8h 上腹部仍有振水音，应考虑

a.急性胃肠炎

b.胃溃疡出血

c.幽门梗阻 (√)

d.肠梗阻

e.大量腹水

27.系统性红斑狼疮病人脱发护理不正确的是

a.说明脱发不是永久的

b.避免染发、烫发、卷发

c.用温水洗头每日二次 (√)

d.梅花针针刺头皮

e.用假发改善形象

28.双气囊三腔管插入多长时间应开始间断放气

a.6h

b.12h

c.24h (√)

d.36h

e.48h

29.急性胰腺炎患者禁食、胃肠减压主要目的是

a.防止感染蔓延

b.减少胃酸分泌

c.减少胰液分泌 (√)

d.避免胃扩张

e.减轻腹痛

30.脑血栓形成护理评估不正确的是

a.安静状态下发病

b.晨起出现半身瘫痪

c.有动脉粥样硬化病史

d.可有发声障碍

e.有严重意识障碍 (√)

31.严重呕血病人饮食护理正确的是

a.暂禁食 (√)

b.温热的流食

c.温凉的流食

d.软食

e.普食

32.化疗病人的护理，不恰当的是

a.治疗前向病人说明化疗可能产生的不良反应

b.用药前可酌情给镇静剂或镇吐剂

c.用药过程中适当补充饮料

d.治疗后 1h 内进食 (√)

e.治疗后出现口干应做好口腔护理 33.作大便隐血试验前 3d 内可

摄取

a.牛奶 (√)

b.瘦肉

c.大量绿叶蔬菜

d.动物血

e.动物肝脏

34.血标本溶血对哪项检验的准确性影响最大

a.钾 (√)

b.肌酐

c.尿素氮

d.葡萄糖

e.淀粉酶

35.心脏病病人脉搏呈一强一弱交替出现而节律正常，应安排他

a.卧床休息（√）

b.正常作息，但限制剧烈活动

c.参与日常生活活动

d.作康复期锻炼

e.恢复半天轻工作

36.预防阵发性夜间呼吸困难发作，最主要的护理措施是

a.保持安静，减少声、光刺激

b.夜间继续吸氧

c.夜间睡眠应保持半卧位（√）

d.睡前给小量镇静剂

e.注意保暖

37.急性类风湿关节炎护理措施不正确的是

a.理疗、热敷

b.卧床休息

c.遵医嘱用药

d.同情理解病人

e.避免“晨僵”关节活动（√）

38.有可能导致危及生命的心律失常是

a.心房颤动

b.阵发性室上性心动过速

c.窦性心动过缓.

d.阵发性室性心动过速（√）

e.频发单源性室性早搏

39.提示病情危急的呼吸改变是

a.间停呼吸（√）

b.呼吸减慢

c.深大呼吸

d.潮式呼吸

e.呼吸增快

40.诱发癫痫的因素不包括

a.高热

b.睡眠不足

c.大量饮水

d.体育活动 (√)

e.精神刺激

41.咯血护理措施不正确的是

a.静卧休息，尽量少翻动

b.大咯血时，应取平卧位，头偏向一侧

c.咯血不止时，嘱患者屏气以利止血 (√)

d.保持大便通畅

e.若为肺结核咯血则应卧向患侧

42.配制混合胰岛素时，必须先抽吸正规胰岛素，是为了防止

a.不良反应增多

b.正规胰岛素速效特性丧失 (√)

c.药效降低

d.胰岛素降解加速

e.中和反应发生

43.阻塞性肺气肿最突出的表现是

a.咳嗽、咳痰

b.肺部哮音

c.呼吸音粗糙

d.心音减弱

e.呼吸困难 (√)

44.胸导联 v2 探查电极放于

a.胸骨右缘第三肋间

b.胸骨右缘第四肋间

c.胸骨左缘第四肋间 (√)

d.左锁骨中线第五肋间

e.左腋前线与 v4 同一水平

45.急性心肌梗塞患者出现阵发性室性心动过速，预示即将发生

a.心房颤动

b.心室颤动 (√)

c.心室停顿

d.不完全性房室传导阻滞

e.完全性房室传导阻滞 46.呼气带有烂苹果气味见于哪一患者

a.尿毒症

b.有机磷农药中毒

c.肺脓肿

d.糖尿病酮症酸中毒 (√)

e.肝性脑病

47.慢性胃炎患者应避免口服

a.链霉素

b.庆大霉素

c.泼尼松 (√)

d.吗丁林

e.胃复安

48.支气管哮喘的主要临床表现是

a.吸气性呼吸困难伴“三凹征”

b.发作性呼吸困难伴窒息感

c.反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难 (√)

d.带哮鸣音的混合性呼吸困难

e.呼吸困难伴喘鸣音

49.体温降低见于

a.无菌性炎症

b.大量失血 (√)

c.组织破坏

d.恶性肿瘤

e.免疫反应

50.急性再生障碍性贫血病人一般不出现

- a.进行性贫血
- b.感染
- c.出血
- d.全血细胞减少
- e.肝、脾淋巴结肿大(√)

51.氯磷定切忌与碳酸氢钠混合静脉滴注，是由于可引起

- a.药液沉淀
- b.药液变色
- c.氯磷定失效
- d.碳酸氢钠失效
- e.氰化物形成(√)

52.二尖瓣狭窄患者的面容特征是

- a.两颊部蝶形红斑
- b.两颊部紫红，口唇轻度紫绀(√)
- c.两颊黄褐斑
- d.午后两颊潮红
- e.面部毛细血管扩张

53.有关静脉注射化疗药物的护理，哪项错误

- a.注射化疗药物前先以无药液体建立静脉通路
- b.确定静脉通畅后，由输液管注入化疗药物
- c.注毕继续以无药液体冲滴
- d.药液外漏应立即停输，迅速用普鲁卡因局封
- e.药液外漏部位热敷(√)

54.下列哪种心律失常应视为危急情况

- a.心房颤动
- b.窦性心动过速
- c.室性早搏，“r”落在“t”上(√)
- d.室性早搏，2~4次/min
- e.窦性心律不齐

55.脑血栓的错误护理措施是

- a.平卧位
- b.避免激动
- c.头部冷敷 (√)
- d.鼻饲流质
- e.注意保暖

56.心绞痛的错误护理是

- a.发作时就地休息
- b.注意保暖，室温不宜过低
- c.高热量、高糖饮食 (√)
- d.少食多餐，不宜过饱
- e.戒绝吸烟

57.为防止哮喘病人痰液粘稠不易咳出，应采取

- a.体位引流
- b.低盐饮食
- c.多饮水 (√)
- d.持续吸氧
- e.翻身、拍背

58.内科护理健康教育的主要目的是

- a.指导饮食增进食欲
- b.树立健康意识消除危险因素 (√)
- c.指导体育锻炼增强体质
- d.树立信心配合治疗
- e.合理用药防止复发

59.系统性红斑狼疮皮肤损害常见于

- a.胸部
- b.背部
- c.腹部
- d.下肢
- e.暴露部位 (√)

60.哮喘持续状态的错误处理是

- a.去除诱因
- b.保持呼吸道通畅
- c.高流量吸氧 (√)
- d.纠正脱水
- e.控制感染

61.以下 x 线检查前准备，哪项不正确

- a.透视检查者，需除去透视部位的厚层衣物
- b.腹部摄片者应先清洁肠道
- c.心血管造影前穿刺部位需备皮
- d.胃肠钡餐检查者应先做碘过敏试验 (√)
- e.钡餐灌肠检查者当日禁早餐

62.皮肤出血点的特征是

- a.直径 3 ~ 5mm
- b.压之不褪色 (√)
- c.稍高出皮面
- d.表面光亮
- e.周围有辐射小血管网

63.纤维胃镜检查的正确护理是

- a.术前向病人说明如感恶心应屏气
- b.术前常规抽尽胃内容物
- c.术前排空大小便 (√)
- d.术中协助病人保持头稍前倾
- e.术后即可进温凉流质

64.瘫痪病人的错误护理措施是

- a.预防褥疮和肺炎
- b.预防泌尿道感染
- c.瘫痪肢体保持功能位
- d.避免瘫痪肢体活动 (√)
- e.鼓励多饮水

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278026014056006034>