

2024 年河南省范县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题完整版附答案【综合题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 较易导致肾损伤的药品是

- A: 新霉素
- B: 阿米卡星
- C: 酮康唑
- D: 氯化钾

答案：A

2. 患者，女，72 岁，有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频，尿常规检查示大量白细胞，尿细菌数 105cfu/m ，诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 阿奇霉素片
- B: 复方磺胺甲噁唑片
- C: 阿莫西林胶囊
- D: 莫西沙星片

答案：B

3. 弱酸性药物离子化减少

- A: 肾血流量减少
- B: 肾小管重吸收增加
- C: 肾小管分泌减少
- D: 肾小球滤过减少

答案：B

4. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：C

5. 对沙眼衣原体有强大抗菌作用的药品是

- A: 硫酸锌滴眼液
- B: 红霉素眼膏
- C: 酞丁安滴眼液
- D: 磺胺醋酰钠滴眼液

答案：B

6. 以下所列药物中，适宜用于儿童患者的是()。

- A: 青霉素
- B: 氟喹诺酮类
- C: 氨基糖苷类
- D: 万古霉素

答案：A

7. 切勿嚼碎、咀嚼，宜在进餐时用水吞服，不宜睡前吞服的 IBS 治疗药物是

- A: 蒙脱石散
- B: 地芬诺酯
- C: 环孢素 A
- D: 匹维溴铵

答案：D

8. (2018 年真题) 患者,男,40 岁,因感冒所致鼻塞到药店购药,药师应推荐的药品是 ()

- A: 萘甲唑啉滴鼻液
- B: 氯苯那敏片
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 酚麻美敏片

答案：A

9. 当创伤应激严重时,给予肠外营养的热氮比调整为

- A: NPC5: 5
- B: 150kcal:1gN
- C: 100kcal:1gN
- D: NPC7:3

答案：C

10. 李某,58 岁,高血压病史 10 年,伴慢性心功能不全,给予地高辛每日维持量治疗,突然出现窦性心动过缓,宜选用的治疗药物是

- A: 肾上腺素?
- B: 阿托品?
- C: 维拉帕米?
- D: 普萘洛尔?

答案：B

11. 患者,男,42 岁,近期出现烧心(胃灼热)、咳嗽、胸痛症状,疑似胃食管反流病。可作为胃食管反流病的初步诊断方法是给予 1~2 周、每日 2 次标准剂量的

- A: 艾司奥美拉唑
- B: 硝酸甘油
- C: 阿司匹林
- D: 西咪替丁

答案：A

12. 患者，男，71 岁。患良性前列腺增生症。下列药物中不能用于治疗该病的是

- A: 选择性 α_1 受体阻断剂
- B: 抗胆碱药物
- C: 雄激素
- D: 5α 还原酶抑制剂

答案：C

13. 乙型肝炎病毒 e 抗体为

- A: 不能抑制 HBV 的增殖，可反映肝细胞受到 HBV 侵害后的一项指标
- B: 为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标
- C: 乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物
- D: 不能抑制 HBV 的增殖，出现在 HBsAg 转阴之后，证明人体对 HBsAg 有一定的免疫清除率的指标

答案：D

14. 环磷酰胺

- A: 出血性膀胱炎
- B: 心脏毒性
- C: 肺纤维化
- D: 溶血性尿毒症

答案：A

15. 提示：用药期间不饮酒（或含酒精的饮料），是针对

- A: 卡托普利
- B: 氟西汀
- C: 铋制剂
- D: 氯苯那敏

答案：B

16. 解救氰化物中毒的是

- A: 盐酸戊乙奎醚
- B: 亚硝酸异戊酯
- C: 二巯丁二钠
- D: 单价抗毒血清

答案：B

17. 下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

- A: 受精后 3 周至 3 个月接触药物，最易发生先天畸形
- B: 受精后半个月内，几乎见不到药物的致畸作用
- C: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防胎儿畸形
- D: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料

答案：C

18. 焦虑障碍最常见的表现形式为

- A: 广泛性焦虑
- B: 社交焦虑障碍
- C: 急性焦虑
- D: 惊恐发作

答案：A

19. 患者，男，46 岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

- A: 在葡萄糖溶液中稳定
- B: 其神经毒性与剂量大小无关
- C: 与氯化钠存在配伍禁忌
- D: 遇冷可加重其神经毒性

答案：B

20. （2016 年真题）含有马兜铃酸的中药，可引起的典型药源性疾病是（）。

- A: 慢性肾衰竭
- B: 消化性溃疡
- C: 粒细胞减少症
- D: 溶血性贫血

答案：A

21. 患者，男，50 岁，高血压病史 3 年，期间先后使用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和饮用多种饮料，出现血压波动情况。

- A: 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同
- B: 控释片比普通片起效快，作用时间长
- C: 控释片与普通片含量相同，可以固定时间，间替换服用
- D: 控释片比普通片含剂量高，不易嚼碎服用，不然会导致低血压

答案：D

22. 属于处方正文的内容为

- A: 开具日期

B: 医疗机构名称

C: 用法用量

D: 临床诊断

答案：C

23. 关于药物 II 期临床试验，叙述正确的是

A: 试验样本数常见病不少于 2000 例，考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应。此期不限定单一用药

B: 试验样本数一般为 20~30 例，试验对象为健康志愿者

C: 治疗作用的初步评价阶段。初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性。试验对象为目标适应证患者，试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 100 例，要求在 3 个及 3 个以上医院进行

D: 治疗作用的初步评价阶段。初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性。试验对象为目标适应证患者，多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 100 例，要求在同一个医院进行

答案：C

24. 服药饮酒可增加发生胃溃疡出血危险的是

A: 普萘洛尔

B: 甲氨蝶呤

C: 吲哚美辛

D: 格列本脲

答案：C

25. 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是：

A: 骨质疏松症或骨折

B: 横纹肌溶解或肌痛

C: 间质性胃炎或肾结石

D: 骨骼发育不良或骨软化

答案: C

26. 甲状腺功能亢进症患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

A: 溶血性贫血

B: 慢性肾衰竭

C: 粒细胞减少症

D: 消化性溃疡

答案: C

27. 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是()

A: 西地碘含片

B: 地塞米松粘贴片

C: 替硝唑含漱液

D: 氯己定含漱液

答案: B

28. 饮食对粪外观的影响,肉食

A: 黑褐色

B: 酱色

C: 暗绿色

D: 红色

答案: A

29. 缓泻药连续使用的时间一般不应超过

A: 5 日

B: 3 日

C: 7 日

D: 10 日

答案: C

30. 以下属于急性肾盂肾炎的表现的是

A: 可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

B: 老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

C: 尿液常浑浊，有异味

D: 约 30%可出现血尿

答案: B

31. 下列引起药源性疾病的事例中，其影响因素主要是"药物制剂因素"的是

A: 输液中颗粒物引起肺部异物肉芽肿

B: 排钾利尿药增加心脏对强心苷的敏感性

C: 阿司匹林与华法林同服会增加出血风险

D: 以 50%乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的作用

答案: A

32. 患者，女，31 岁，1 个月前顺一健康男婴。近 2 周出现心境低落、乏力纳差、失眠焦虑，有自杀倾向，无法哺乳。诊断为产后抑郁症，给予氟西汀片 20mgqd。关于该患者用药教育的说法，错误的是（）

A: 氟西汀应于每日早餐后服用

B: 应足量和足疗程用药，疗效不佳可考虑换药

C: 为尽快恢复哺乳，患者应在症状改善 1 个月后逐渐减量，直至停药

D: 向患者解释“剂量滴定原则”，提示其用药剂量可能需要逐渐增加

答案: C

33. 下列白细胞计数检查结果中，属于不正常的是

- A: 成人 $4.3 \times 10^9 / L$
- B: 成人 $3.0 \times 10^9 / L$
- C: 新生儿 $16.0 \times 10^9 / L$
- D: 成人 $8.0 \times 10^9 / L$

答案：B

34. 下列药品中，新生儿局部应用过多可能导致中毒的是

- A: 滑石粉
- B: 炉甘石
- C: 氧化锌
- D: 硼酸

答案：D

35. 心力衰竭伴心绞痛应首选的药物是

- A: 单硝酸异山梨酯
- B: 氨氯地平
- C: 美托洛尔
- D: 硝酸甘油

答案：C

36. 可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

- A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- B: $>342 \mu\text{mol/L}$
- C: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

答案：D

37. 患者女性，40 岁，既往有风湿性心脏病史，近 2 年来出现劳力性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

- A: 大叶性肺炎
- B: 支气管哮喘
- C: 急性左心衰竭
- D: 急性心肌炎

答案：C

38. 治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

- A: 阿昔洛韦
- B: 利巴韦林
- C: 依非韦伦
- D: 拉米夫定

答案：C

39. 属于超适应证用药的是

- A: I 类手术切口应用第三代头孢菌素
- B: 肠炎、细菌感染性腹泻同时应用小檗碱、双八面体蒙脱石散、盐酸地芬诺酯进行治疗
- C: 黄体酮用于排除结石
- D: 食管癌应用顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星进行治疗

答案：C

40. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 微生态制剂不可用于消化不良的治疗
- B: 胰酶片必须用肠溶衣片，口服时不可嚼碎，应整片吞下
- C: 过量的干酵母和乳酶生可以引起腹泻
- D: 乳腺癌、机械性肠梗阻患者禁用多潘立酮

答案：A

41. 有关药学服务的叙述，正确的是

- A: 药学服务只涉及更高层次的临床实践，不包括处方调剂、药品检验、药品供应
- B: 用药周期长的慢性病患者属于药学服务的重要人群
- C: 药学服务的社会属性仅限服务于治疗性药物
- D: 药学服务涵盖了患者用药相关的全部需求，但不包括对公众的健康教育

答案：B

42. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 左眼

- A: NS
- B: LD
- C: O
- D: DOL

答案：D

43. 下列药物中属于溶栓药物的是 ()

- A: 利伐沙班
- B: 华法林
- C: 血凝酶
- D: 阿替普酶

答案：D

44. 医师用药咨询的内容是

- A: 抗菌药物的合理使用
- B: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大

答案：A

45. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他丁片 40mgpoqd。

- A: 华法林片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 氯吡格雷片
- D: 双嘧达莫片

答案：C

46. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 阿米替林
- B: 阿洛司琼
- C: 呋塞米
- D: 利血平

答案：A

47. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 稀糊状或水样粪便
- B: 米泔水样便

C: 黏液便

D: 冻状便

答案: D

48. 药物过量、毒性反应、继发反应、后遗效应、致畸、致癌、致突变作用归属

A: 药理作用

B: 药物制剂因素

C: 药物的使用

D: 药动学相互作用

答案: A

49. 需要在冷处贮藏的高警示药品是()

A: 降钙素

B: 高锰酸钾

C: 胰岛素

D: 肾上腺素

答案: C

50. 单核细胞正常值参考范围是

A: 0.01~0.05

B: 0~0.01

C: 0.03~0.08

D: 0.20~0.40

答案: C

51. 可引起 A/G 比值<1 的是

A: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

B: 摄入不足、消化不良时

C: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

D: 各种原因脱水所致的血液浓缩

答案：C

52. 以高 TG 为主血症首选

A: 阿昔莫司

B: 氟伐他汀

C: 依折麦布

D: 非诺贝特

答案：D

53. 每次配方尽可能 1 次完成，是针对

A: 配备足够的人力

B: 环境整齐、安静

C: 规范操作、坚持核对

D: 及时沟通

答案：C

54. 高血压伴痛风的患者慎用的药物是()

A: 卡托普利

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案：D

55. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：

体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC 12.4×10

- A: 1 片 qd
- B: 1/2 片 qd
- C: 1 片 bid
- D: 1.5 片 qd

答案：A

56. 一般给予肠外营养的热氮比为

- A: NPC7:3
- B: 100kcal:1gN
- C: NPC5: 5
- D: 150kcal:1gN

答案：D

57. 患者，男，35 岁，患有先天性双侧肾动脉狭窄。近期血压一直在 150/110mmHg 左右，药师建议服药控制，该患者禁用的药物是

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 洛伐他汀
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

58. 氟胞嘧啶属于

- A: 抗过敏药
- B: 抗肿瘤药
- C: 抗真菌药
- D: 抗病毒药

答案：C

59. 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是（）。

- A: 可能
- B: 肯定
- C: 可能无关
- D: 很可能

答案：B

60. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时候，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病可能，该病例用药与不良反应因果关系评价结果是：

- A: 很可能
- B: 肯定
- C: 可能无关
- D: 可能

答案：A

61. 氨基糖苷类抗生素排泄减慢

- A: 肾小管重吸收增加
- B: 肾小管分泌减少
- C: 肾小球滤过减少
- D: 肾血流量减少

答案：C

62. 嗜酸性粒细胞正常参考区间是

- A: 0.20~0.40
- B: 0.005~0.05

C: 0.03~0.08

D: 0~0.01

答案：B

63. 严重烧伤患者尿常规检查可发现

A: 尿血红蛋白阳性

B: 尿胆红素阳性

C: 尿淀粉酶增高

D: 尿葡萄糖阳性

答案：A

64. 老年糖尿病患者宜选用的药物是

A: 阿卡波糖

B: 罗格列酮

C: 格列喹酮

D: 二甲双胍

答案：A

65. 因不良反应很小，可在老年人群中使用的治疗失眠症的药物为

A: 艾司唑仑

B: 雷关尔通

C: 米氮平

D: 佐匹克隆

答案：B

66. 患者，男，40 岁，体重 70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于 50ml/min 时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐 (Cr) 130 $\mu\text{mol/L}$ 。医师给出的治疗方案是

- A: 延长给药间隔时间
- B: 不需要调整给药方案
- C: 经验剂量的 3/4
- D: 经验剂量的 1/2

答案：B

67. 非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂 ()

- A: NNRTIs
- B: PIs
- C: FIs
- D: NRTIs

答案：A

68. 儿童空腹血糖检查（邻甲苯胺法）的正常参考区间是

- A: 4.2~6.5mmol/L
- B: 3.3~5.0mmol/L
- C: 3.9~6.1mmol/L
- D: 3.3~5.5mmol/L

答案：D

69. 下述“药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的”中，不正确的是

- A: 缓解呼吸道症状
- B: 预防疾病进展
- C: 排痰化痰

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 减少病死率

答案：C

70. 患者在使用丙成酸钠时应监测血药浓度, 适宜的血药浓度范围是 ()

- A: 10~40ug/ml
- B: 4~12ug/ml
- C: 50~150ug/ml
- D: 10~20ug/ml

答案: C

71. 茶碱属于

- A: CYP3A4 抑制剂
- B: CYP2C19 底物药物
- C: CYP3A4 诱导剂
- D: CYP1A2 底物药物

答案: D

72. 以下联合用药中, 依据“作用相加或增加疗效”机制的是

- A: 阿托品联用普萘洛尔
- B: 磺胺甲噁唑 (SMZ) 联用甲氧苄啶 (TMP)
- C: 阿托品联用吗啡
- D: 氢溴酸山莨菪碱联用哌替啶

答案: B

73. 严重疼痛者可选用的镇痛药是

- A: 双氯芬酸钠缓释片
- B: 罗通定
- C: 塞来昔布
- D: 氨酚待因片

答案：D

74. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

A: 分泌性腹泻

B: 消化不良性腹泻

C: 感染性腹泻

D: 动力性腹泻

答案：C

75. 溃疡或胃酸过多的人不宜饮用

A: 咖啡

B: 饮茶

C: 吸烟

D: 高盐饮食

答案：A

76. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高 160cm，体重 70kg。实验室检查：白细胞 $8.0 \times 10^9 / L$ ，红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$ ，总胆红素 $11 \mu mol / L$ ，总胆固醇 $6.0 mmol / L$ ，空腹血糖 $7.6 mmol / L$ 。

A: 二甲双胍

B: 格列齐特

C: 非诺贝特

D: 辛伐他汀

答案: A

77. 可引起胎儿性发育异常的药物是

A: 沙利度胺

B: 雌激素、孕激素、雄激素

C: 叶酸拮抗剂

D: 苯巴比妥

答案: B

78. 患者,男,57岁,化验结果:TC4.6mmol/L(参考值<5.2mmol/L),TG11.0mmol/L(参考值0.56——1.70mmol/L)尿酸508umol/L(参考值<420umol/L),应首选的调脂药物为()

A: 烟酸

B: 考来烯胺

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案: C

79. 左旋多巴的禁用范围是

A: 3岁以下幼儿

B: 8岁以下儿童

C: 12岁以下儿童

D: 1岁以下婴儿

答案: A

80. 静脉滴注阿昔洛韦的适宜溶媒是

A: 50%葡萄糖注射液

B: 0.9%氯化钠注射液

C: 5%葡萄糖注射液

D: 复方氯化钠注射液

答案：B

81. 不宜选用静脉滴注 5%碳酸氢钠注射液碱化尿液的情况是

A: 异戊巴比妥中毒

B: 苯妥英钠中毒

C: 司可巴比妥中毒

D: 苯巴比妥中毒

答案：A

82. 根据《中华人民共和国药典临床用药须知》，使用前必须做皮试的药物是

A: 红霉素

B: 维生素 K1

C: 克林霉素

D: 氨苄西林

答案：D

83. 用量过大可引起低血糖反应的是

A: 甲状腺素

B: 胰岛素

C: 糖皮质激素

D: 炔雌醇

答案：B

84. (2015 年真题) 饮茶可减少其吸收的药物是 ()。

- A: 硫酸亚铁
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 去氮加压素
- D: 阿莫西林

答案：A

85. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 氯吡格雷
- D: 氨氯地平

答案：D

86. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 肺
- B: 胃肠系统
- C: 肾脏
- D: 肝脏

答案：D

87. 用于有机磷中毒症状的对抗药物是

- A: 亚甲蓝
- B: 碘解磷定
- C: 阿托品
- D: 毛果芸香碱

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/278040045044007022>