

2024 福建省延平区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题真题题库附答案 AB 卷

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列哪个药物没有散瞳作用

- A: 毛果芸香碱
- B: 去氧肾上腺素
- C: 托吡卡胺
- D: 硫酸阿托品

答案：A

2. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是()

- A: 地高辛
- B: 胺碘酮
- C: 利多卡因
- D: 苯妥英钠

答案：C

3. 戈那瑞林属于

- A: 促性腺激素释放激素类似物
- B: 雌激素类
- C: 短效口服避孕药
- D: 促性腺激素

答案：A

4. 角鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂是

- A: 特比萘芬
- B: 阿莫罗芬
- C: 制霉菌素
- D: 环吡酮胺

答案：A

5. (2015 年真题) 属于糖皮质激素禁忌症的是 ()。

- A: 类风湿性关节炎
- B: 过敏性皮炎
- C: 再生障碍性贫血
- D: 严重高血压

答案：D

6. 血浆半衰期较长的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

- A: 甲睾酮
- B: 西地那非
- C: 他达拉非
- D: 丙酸睾酮

答案：C

7. 临床上用于治疗躁狂症的是

- A: 硫酸镁
- B: 苯巴比妥
- C: 卡巴西平
- D: 苯妥英钠

答案：C

8. 大剂量碘剂

- A: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧
- B: 使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌
- C: 对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状
- D: 抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

答案：A

9. 具有较强抗铜绿假单胞菌作用的头孢菌素是()

- A: 头孢唑林
- B: 头孢他啶
- C: 头孢克洛
- D: 头孢孟多

答案：B

10. 华法林的抗凝血机制是

- A: 促进纤维蛋白溶解
- B: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子
- C: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用
- D: 抑制血小板聚集

答案：B

11. 属于抗雄激素类，首选用于晚期前列腺癌的药物是

- A: 他莫昔芬
- B: 乙烯雌酚
- C: 甲羟孕酮
- D: 氟他胺

答案：D

12. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

- A: 氯丙嗪
- B: 红霉素
- C: 他莫昔芬
- D: 维生素 C

答案：C

13. 关于庆大霉素使用的叙述，错误的是

- A: 避免该药耳部滴用
- B: 可静脉快速推注或静脉滴注给药
- C: 应定期检查尿常规、血尿素氮、血肌酐，注意患者听力变化或听力损害先兆
- D: 与第一代注射用头孢菌素类合用时可能加重肾毒性

答案：B

14. 硫脲类药物的不良反应不包括()

- A: 粒细胞减少
- B: 诱发甲亢
- C: 发热
- D: 过敏反应

答案：B

15. 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()

。

- A: 维生素 B
- B: 维生素 B

C: 依诺肝素

D: 维生素 B

答案: C

16. 只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害的是

A: 氟他胺

B: 阿那曲唑

C: 他莫昔芬

D: 曲妥珠单抗

答案: D

17. 不属于茶碱适应证的是

A: 阻塞性肺气肿

B: 喘息型支气管炎

C: 过敏性鼻炎

D: 支气管哮喘

答案: C

18. (2020 年真题) 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素 (NA) 再摄取, 增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A: 舍曲林

B: 阿米替林

C: 度洛西汀

D: 吗氯贝胺

答案: C

19. 普通肝素的作用靶点是

- A: 因子 IXa
- B: 因子 Xa
- C: 因子 IIa
- D: 凝血酶 III (AT—III)

答案：D

20. 治疗癫痫持续状态可首选

- A: 卡马西平
- B: 氯丙嗪
- C: 硫酸镁
- D: 地西泮

答案：D

21. 餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 铝碳酸镁
- C: 米索前列醇
- D: 兰索拉唑

答案：B

22. 属于膨胀性泻药的是

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 乳果糖
- C: 酚酞
- D: 甘油（开塞露）

答案：A

23. 口沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答。

- A: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- B: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- C: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时,应停用 ACEI 36 小时后方可转换
- D: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用

答案: D

24. 预防和治疗各种原因引起的肝性脑病使用

- A: 复方氨基酸 (18AA- I)
- B: 复方氨基酸注射液 (9AA)
- C: 苯丙氨酸
- D: 复方氨基酸注射液 (3AA)

答案: D

25. (2018 年真题) 同时具有短效和长效 (双时相) 作用的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

- A: 精蛋白锌胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液
- C: 预混胰岛素注射液
- D: 普通胰岛素注射液

答案: C

26. (2017 年真题) 患者, 男, 62 岁。高血压病史 10 年, 既往有骨关节炎和血脂异常, 轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg, 心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪

- B: 氢氯地平+氢氯噻嗪
- C: 利血平+氨苯蝶啶
- D: 硝酸甘油+美托洛尔

答案：B

27. 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是()

- A: 头孢米诺
- B: 头孢唑林
- C: 头孢他啶
- D: 头孢呋辛

答案：A

28. 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 螺内酯
- D: 呋塞米

答案：B

29. 广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 甲硝唑
- C: 吡喹酮
- D: 三苯双脒

答案：C

30. (2015 年真题) 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是 ()。

- A: 炔雌醇
- B: 他莫昔芬
- C: 阿那曲唑
- D: 丙酸睾酮

答案：C

31. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的药物是

- A: 卡托普利
- B: 哌唑嗪
- C: 氢氯地平
- D: 地高辛

答案：A

32. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 梭状芽孢杆菌
- B: 嗜酸乳杆菌
- C: 双歧杆菌
- D: 粪肠球菌

答案：A

33. 患者，男，50 岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148 / 90mmHg，心率 80 次 / 分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

- A: 氢氯噻嗪可增加卡托普利的肾血流量
- B: 氢氯噻嗪可拮抗卡托普利的高血钾倾向
- C: 卡托普利可提高氢氯噻嗪的血尿酸水平
- D: 卡托普利可减轻氢氯噻嗪的低血糖反应

答案：B

34. 引起睫状肌麻痹，适用于治疗虹膜睫状体炎、检查眼底前的散瞳、验光配镜屈光度检查的药物是

- A: 阿托品
- B: 碘苷
- C: 奥布卡因
- D: 20%甘露醇

答案：A

35. 林旦不应与碱性物质或铁器接触。口诀：“碱淡淡铁旦旦”。

- A: 阿达帕林
- B: 莫匹罗星
- C: 林旦
- D: 克罗米通

答案：C

36. 下列不属于局麻药物作用特点的是

- A: 对各类组织无损伤性影响
- B: 可逆性阻断神经冲动产生和传导
- C: 作用消失后神经功能不可完全恢复
- D: 可暂时、完全阻断神经传导

答案：C

37. 关于氢氧化镁的叙述正确的是

- A: 口服易吸收
- B: 对溃疡面有保护作用
- C: 不影响排便

D: 中和胃酸作用强而迅速

答案：D

38. 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

A: 一日一次，睡前使用

B: 一日一次，晨起使用

C: 一日二次，早、晚使用

D: 一日一次，固定时间使用

答案：A

39. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

A: 辛伐他汀

B: 烟酸

C: 非诺贝特

D: 依折麦布

答案：C

40. 在使用减毒活流感疫苗后一段时间内不应服用奥司他韦，该时间是

A: 1 周内

B: 4 周内

C: 3 周内

D: 2 周内

答案：D

41. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

A: 尿激酶

B: 瑞替普酶

C: 链激酶

D: 阿替普酶

答案: C

42. 氟替卡松吸入气雾剂用于轻度哮喘时的用法和用量为

A: 一次 50~100 μg ，一日 2 次

B: 一次 250~500 μg ，一日 2 次

C: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次

D: 一次 100~250 μg ，一日 2 次

答案: D

43. (2016 年真题) 可抑制细菌 β -内酰胺酶的是

A: 磷霉素

B: 替考拉宁

C: 舒巴坦

D: 利福平

答案: C

44. (2015 年真题) 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是 ()。

A: 文拉法辛

B: 氟西汀

C: 阿米替林

D: 吗氯贝胺

答案: B

45. 激动 α

A: 硝普钠

B: 肼屈嗪

C: 可乐定

D: 哌唑嗪

答案: C

46. (2015 年真题) 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁止使用的抗菌药物是 ()。

A: 四环素类

B: 林可霉素类

C: 氨基糖苷类

D: 酰胺醇类 (氯霉素)

答案: C

47. 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是 ()。

A: 索他洛尔

B: 利多卡因

C: 美托洛尔

D: 硝酸甘油

答案: A

48. 以下抗心律失常药中，对光过敏的是

A: 胺碘酮

B: 利多卡因

C: 奎尼丁

D: 普萘洛尔

答案: A

49. 可能导致牙齿黄染的抗菌药物是

A: 多西环素

- B: 甲砒霉素
- C: 庆大霉素
- D: 加替沙星

答案：A

50. 用于慢性活动性肝炎的是

- A: 精氨酸
- B: 赖氨酸
- C: 复方氨基酸注射液(3AA)
- D: 复方氨基酸(18AA)

答案：C

51. 用于真菌感染的药物是

- A: 氟康唑
- B: 拉米夫定
- C: 利巴韦林
- D: 磺胺嘧啶

答案：A

52. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 心肝肾功能不全严重者
- B: 妊娠期妇女
- C: 慢性胃炎
- D: 骨髓功能抑制者

答案：C

53. 对多种氨基糖苷类钝化酶稳定的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 奈替米星
- C: 链霉素
- D: 妥布霉素

答案：B

54. 治疗敏感菌所致成人伤寒、副伤寒的应选药物是()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 呋喃妥因
- C: 左氧氟沙星
- D: 氯霉素

答案：C

55. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 维生素 K
- C: 鱼精蛋白
- D: 氨基己酸

答案：D

56. 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162/80mmHg，心率 72 次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 氨基葡萄糖
- B: 双氯芬酸
- C: 碳酸钙 D
- D: 辛伐他汀

答案：B

57. 可用于肝性脑病的治疗的是

- A: 复方氨基酸注射液（3AA）
- B: 复方氨基酸注射液（18AA）
- C: 赖氨酸
- D: 精氨酸

答案：D

58. 微小核糖核酸病毒可致

- A: 急性出血性结膜炎
- B: 巨细胞病毒性视网膜炎
- C: 流行性结膜炎
- D: 角膜炎

答案：A

59. 头孢曲松（）

- A: 用于非典型致病原感染
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎
- C: 肾毒性较大
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：B

60. 阿司匹林的作用机制是

- A: 促进凝血因子合成
- B: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- C: 抑制血小板聚集
- D: 促进纤溶

答案：C

61. 关于美罗培南使用的叙述，正确的是

- A: 一天一次给药
- B: 癫痫等中枢神经系统不良反应发生率与亚胺培南相似
- C: 所致肾功能损害和恶心、呕吐等胃肠道反应较亚胺培南少
- D: 肝功能不全患者应用需调整剂量

答案：C

62. 治疗轻、中型糖尿病的是

- A: A 和 B 均无效
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: 磺酰脲类

答案：B

63. 有心肌梗死、脑梗死病史患者可以使用

- A: 芳基乙酸类
- B: 芳基丙酸类
- C: 选择性 COX-2 抑制剂
- D: 水杨酸类

答案：D

64. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第四代头孢菌素

D: 第三代头孢菌素

答案：C

65. 高效抑菌药是

A: 头孢菌素

B: 氯霉素

C: 磺胺嘧啶

D: 异烟肼

答案：C

66. 对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍有效的是

A: 乙琥胺

B: 苯妥英钠

C: 卡马西平

D: 丙戊酸钠

答案：D

67. 以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

A: 菠菜叶

B: 洋葱

C: 脱皮黄瓜

D: 红叶苋菜

答案：C

68. 需慎用司坦唑醇的是()

A: 高血压患者

B: 代谢性酸中毒患者

C: 肝、肾病患者

D: 低血压患者

答案：C

69. 肾功能轻度减退患者可按原治疗量应用而活动性肝病时避免应用的是

A: 红霉素

B: 氟胞嘧啶

C: 青霉素

D: 异烟肼

答案：D

70. 不能直接抑制凝血因子 Xa 的药物是

A: 华法林

B: 依度沙班

C: 利伐沙班

D: 阿哌沙班

答案：A

71. 多种抗眼部细菌感染制剂中常加入糖皮质激素，不能随意使用，应该在眼科医生、药师的密切监护下使用。如使用此类制剂，不应当超过

A: 5 日

B: 7 日

C: 10 日

D: 3 日

答案：C

72. 肝素过量可选用的拮抗药是()

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 K1
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 氨甲苯酸

答案：A

73. 关于治疗功能性胃肠病药的叙述，不正确的是

- A: 匹维溴铵可用于对症治疗与胆道功能紊乱有关的疼痛
- B: 曲美布汀可使胃排空功能的减弱得到改善
- C: 匹维溴铵宜空腹吞服
- D: 匹维溴铵为钡灌肠做准备时，应于检查前 3 日开始用药

答案：C

74. 配制静脉输液时，应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释，不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是（）

- A: 氟康唑
- B: 伏立康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 卡泊芬净

答案：D

75. 促进钙剂吸收可选用

- A: 阿法骨化醇
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 阿伦膦酸钠
- D: 依降钙素

答案：A

76. 三甲沙林属于

- A: 肾上腺皮质激类
- B: 补骨脂素及其衍生物
- C: 重金属元素及其化合物
- D: 其他光敏剂

答案：B

77. 铁剂用于治疗

- A: 再生障碍性贫血
- B: 小细胞低血红蛋白性贫血
- C: 溶血性贫血
- D: 巨幼红细胞性贫血

答案：B

78. 酒精、镇静剂、镇痛药、阿片类或神经类药物急性中毒患者禁用()
。

- A: 哌替啶
- B: 芬太尼
- C: 吗啡
- D: 曲马多

答案：D

79. 关于枸橼酸铋钾用药注意事项的说法，错误的是

- A: 妊娠期妇女、肾功能不全者禁用
- B: 如有服用左甲状腺素，需间隔 2 小时服用
- C: 服药期间口中可能带有氨味并可使舌苔及大便灰黑色
- D: 为了更好地保护胃黏膜，可与牛奶同服

答案：D

80. 治疗黏液性水肿的药物是

- A: 甲状腺片
- B: 普萘洛尔
- C: 硫脲类
- D: 硫脲类+大剂量碘

答案：A

81. 通过阻断血管紧张素 II 受体而逆转心肌肥厚，减轻心力衰竭的药物是

- A: 氨力农
- B: 美托洛尔
- C: 氯沙坦
- D: 地高辛

答案：C

82. 可导致凝血酶原时间延长的是

- A: 替硝唑+华法林
- B: 奥硝唑+乙醇
- C: 替硝唑+苯巴比妥
- D: 甲硝唑+乙醇

答案：A

83. 与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是()

- A: 葡萄糖
- B: 二磷酸果糖
- C: 碳酸钙
- D: 三磷酸腺苷

答案：A

84. 与链激酶、尿激酶联用溶栓治疗，可增加疗效，且不显著增加严重出血发生率的是

- A: 肝素
- B: 华法林
- C: 阿司匹林
- D: 低分子肝素

答案：C

85. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

- A: 低氯碱血症
- B: 血小板增多
- C: 高钾血症
- D: 低血糖

答案：C

86. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

- A: 餐后 1 小时
- B: 餐后半小时
- C: 餐前即刻或餐时
- D: 餐前半小时

答案：C

87. 可直接地抑制凝血因子 Xa，并与抗凝血酶 II 结合，形成构象改变，使凝血酶抗 Xa 因子活性增强 270 倍，阻碍凝血酶（凝血因子 IIa）产生的抗凝血药是（）。

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/278050017042007022>