2024年贵州省播州区《执业药师之西药学专业二》资格考试大全附答案【培优B卷】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.下列哪个选项不属于十一酸睾酮的适应症

A：原发性或继发性睾丸功能减退

B：女性儿童体质性青春期延迟

C：乳腺癌转移的姑息性治疗

D：前列腺增生引起的排尿障碍

答案：D

2.用于肝病的氨基酸制剂的是

A：复方氨基酸注射液（6AA）

B：赖氨酸注射液

C：复方氨基酸注射液（9AA）

D：复方氨基酸注射液（18AA）

答案：A

3.低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

A：化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

B：化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予2天的阿瑞吡坦和2~3天的地塞米松

C：化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予2天的地塞米松或昂丹司琼

D：化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

答案：A

4.可抑制胃酸分泌，升高胃及十二指肠内pH，防止胰酶失活的是

A: 胃蛋白酶

B: 雷尼替丁

C: 乳酸菌素

D: 碳酸氢钠

答案：B

5.应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的目的是

A: B淋巴细胞表面的CD20

B: 人表皮生长因子受体-2

C: 表皮生长因子受体

D: 血管内皮生长因子

答案：B

6.主要用于糖尿病，特别是1型糖尿病的治疗的药物是()

A: 磺酰脲类

B: 二甲双胍

C: A和B均无效

D: 胰岛素

答案：D

7.全身用药毒性大，仅局部用的抗病毒药是()

A: 金刚烷胺

B: 阿昔洛韦

C: 碘苷

D: 阿糖腺苷

答案：C

8.红霉素的作用机制是

A: 与核蛋白70s亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

B: 与核蛋白50s亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

C: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程

D: 与核蛋白30s亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

答案：B

9.可拮抗维生素B

A: 丙磺舒

B: 异烟肼

C: 糖皮质激素

D: 雌激素

答案：B

10.治疗肺孢子菌病的首选药物是()

A: 复方磺胺甲噁唑

B: 左氧氟沙星

C: 氯霉素

D: 呋喃妥因

答案：A

11.典型不良反应为皮肤毒性,属于酪氨酸激酶抑制剂的药物是（）

A: 奥沙利铂

B: 顺铂

C: 氟尿嘧啶

D: 吉非替尼

答案：D

12.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

A：阿卡波糖

B：贝那普利

C：二甲双胍

D：罗格列酮

答案：D

13.长期大量服用维生素E会出现

A：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重下降、肝脏肿大、肾脏损害、骨硬化

B：视物模糊、乳腺肿大、类流感样综合征、胃痉挛

C：颅内压增高、夜尿增多、毛发干枯或脱落、皮肤干燥或瘙痒、体重减轻

D：头痛、眼花、烦躁、心律失常、妇女经血不止

答案：B

14.属于孕激素类的是()

A：甲地孕酮

B：睾酮

C：他莫昔芬

D：己烯雌酚

答案：A

15.（2019年真题）患者，女，13岁，有哮喘病史，半年前月经初潮，周期28天经期持续4-5天，月经前两天疼痛明显，影响正常的学习和活动，诊断为原发性痛经，适宜该患者使用的缓解痛经的药物是（）

A：吲哚美辛栓

B：布洛芬片

C：对乙酰氨基酚片

D：塞来昔布胶囊

答案：C

16.主要作用是抗革兰阴性杆菌的半合成青霉素是

A：阿莫西林

B：替莫西林

C：哌拉西林

D：替卡西林

答案：B

17.（2019年真题）以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是（）

A：甘草酸二铵

B：还原型谷胱甘肽

C：葡醛内酯

D：多烯磷脂酸胆碱

答案：D

18.可引起肺毒性的抗肿瘤抗生素是

A：博来霉素

B：环磷酰胺

C: 卡莫司汀

D: 丝裂霉素

答案：A

19.患者，男，65 岁。高血压病史 8 年，血压峰值 180/110mmHg，冠心病史 5 年，双侧肾动脉狭窄，不宜选用的抗高血压药是

A: 吧达帕胺

B: 氨氛地平

C: 赖诺普利

D: 普萘洛尔

答案：C

20.布地奈德口服给药的效能约为皮质醇的

A: 15 倍

B: 25 倍

C: 100 倍

D: 40 倍

答案：B

21.关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述，错误的是

A: 不用于 18 岁以下银屑病患者

B: 对严重的银屑病效果显著

C: 成人每晚(睡前半小时)1 次，一般 12 周，使用面积应不超过 20%体表面积

D: 育龄期妇女用药前 2 周，应进行血清或尿液妊娠试验

答案：B

22.烷化剂

A: 顺铂
B: 喜树碱类
C: 丝裂霉素
D: 环磷酰胺
答案：D

23.（2021年真题）患者，男，54岁。拟行膝关节置换术，围手术期宣选用的预防用抗菌药物（）
A: 头孢他啶
B: 头孢唑林
C: 头孢曲松
D: 头孢噻肟
答案：B

24.属于白三烯受体阻断剂的平喘药是
A: 多索茶碱
B: 沙美特罗
C: 孟鲁司特
D: 布地奈德
答案：C

25.30岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。
A: 驱钩虫+注射右旋糖苷铁
B: 驱钩虫+口服铁剂
C: 驱钩虫
D: 输血+注射右旋糖苷铁
答案：B

26.用于流脑，阻碍细菌二氢叶酸合成酶的药物是

A: 氟康唑

B: 拉米夫定

C: 利巴韦林

D: 磺胺嘧啶

答案：D

27.氨基酸分类正确的是

A: 肾病的氨基酸制剂:复方氨基酸注射液（15AA）、复方 α-酮酸片

B: 肝病的氨基酸制剂:复方氨基酸注射液（20AA）、复方氨基酸注射液（9AA）

C: 肝病的氨基酸制剂:复方氨基酸注射液（9AA）、复方氨基酸注射液（15AA）

D: 肾病的氨基酸制剂:复方氨基酸注射液（9AA）、复方 α-酮酸片

答案：D

28.其他 β-内酰胺类抗生素的主作用靶位是

A: DNA 螺旋酶

B: 细菌胞浆膜上特殊蛋白 PBPs

C: 二氢叶酸合成酶

D: 细菌核蛋自体 50S 亚基

答案：B

29.治疗子宫内膜异位症的药物是

A: 氯地孕酮

B: 达那唑

C: 左炔诺孕酮

D: 他达拉非

答案：B

30.下列关于雌激素的描述，错误的是

A: 雌激素治疗可能增加乳腺癌的风险

B: 雌激素治疗可能诱发阴道出血

C: 雌激素治疗前需评估患者发生血栓的风险

D: 长期使用需监测血糖

答案：D

31.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染宜首选的抗菌药物是()。

A: 头孢他啶

B: 利奈唑胺

C: 罗红霉素

D: 头孢曲松

答案：B

32.有机磷酸酯中毒的解救宜选用

A: 纳洛酮

B: 阿托品

C: 多潘立酮

D: 鱼精蛋白

答案：B

33.（2019年真题）患者，女，36岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午10点及下午4点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（）

A: 奥美拉唑

B: 多潘立酮

C: 颠茄

D: 甲氧氯普胺

答案：A

34.治疗钙缺乏症可选用

A: 葡萄糖酸钙

B: 依降钙素

C: 阿法骨化醇

D: 阿伦膦酸钠

答案：A

35.属于雄激素类的是()

A: 己烯雌酚

B: 甲地孕酮

C: 他莫昔芬

D: 睾酮

答案：D

36.长期大量使用林旦后可导致的不良反应是

A: 眼部水肿

B: 白细胞减少

C: 中枢神经系统毒性

D: 肝脏损害

答案：C

37.属于雌激素类，用于补充雌激素不足的药品是()

A: 他莫昔芬

B: 戊酸雌二醇

C: 地屈孕酮

D: 依普黄酮

答案：B

38.（2017年真题）患者，男，62岁。高血压病史10年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压162mmHg，心率72次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙D。

A: 碳酸钙D

B: 氨基葡萄糖

C: 辛伐他汀

D: 双氯芬酸

答案：D

39.磺胺类药物的抗菌机制是

A: 抑制二氢叶酸还原酶

B: 改变细菌细胞膜通透性

C: 抑制四氢叶酸还原酶

D: 抑制二氢叶酸合成酶

答案：D

40.预防和治疗各种原因引起的肝性脑病使用

A: 苯丙氨酸

B: 复方氨基酸注射液（9AA）

C: 复方氨基酸注射液（3AA）

D: 复方氨基酸（18AA-Ⅰ）

答案：C

41.四环素的抗菌作用机制()

A: 与核糖体50S亚基结合，抑制移位酶的活性

B: 与核糖体30S亚基结合，抑制蛋白质的合成

C: 作用于细菌70S核糖体的50S亚基，抑制转肽酶

D: 影响胞浆膜通透性

答案：B

42.能减弱双香豆素类抗凝血作用的药物是

A: 广谱抗生素

B: 阿司匹林

C: 苯巴比妥

D: 甲苯磺丁脲

答案：C

43.仅用于绝经后妇女,不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是()

A: 阿仑磷酸钠

B: 雷洛昔芬

C: 阿法骨化醇

D: 骨化三醇

答案：B

44.红霉素不是下列哪些疾病的首选药物

A: 空肠弯曲杆菌肠炎

B: 骨髓炎

C: 婴幼儿支原体肺炎

D: 白喉带菌者

答案：B

45.（2019年真题）患者，女，孕8周，诊断为“甲状腺功能减退症”，给予左甲状腺素钠片治疗。对该患者的用药指导，错误的是（）

A：孕期甲减可能对胎儿造成不良影响，服药期间应监测甲功

B：应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服

C：服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降，应及时就诊

D：左甲状腺素钠极少通过胎盘，治疗剂量下对胎儿无不良影响

答案：B

46.戒断症状是5-HT再摄取抑制剂较常见的不良反应，产生的原因是

A：长期服用药物对5-HT受体无亲和力

B：长期服用脑内5-HT受体数目减少

C：长期服用使脑内5-HT受体敏感性下调

D：长期服用致5-HT、NE、DA分解增加

答案：C

47.下述与西地那非无药物相互作用的是

A：硝酸酯类

B：阿司匹林

C：红霉素

D：西咪替丁

答案：B

48.应用雌激素时需要停药的指征是

A：肝功异常

B：突破性出血

C：性欲改变

D: 乳房胀痛

答案：B

49.高钠血症是指

A: 血钠>130mmol/L

B: 血钠>140mmol/L

C: 血钠>135mmol/L

D: 血钠>145mmol/L

答案：D

50.（2015 年真题）辅助治疗不孕症的维生素是（）。

A: 维生素 B2

B: 维生素 E

C: 维生素 B5

D: 烟酸

答案：B

51.毛果芸香碱对眼的作用是

A: 扩瞳、升眼压，调节麻痹

B: 扩瞳、降眼压，调节痉挛

C: 缩瞳、升眼压，调节痉挛

D: 缩瞳、降眼压，调节痉挛

答案：D

52.氨基糖苷类药的主要作用靶点是

A: 核糖体的 50S 亚基

B: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

C: 核糖体的 30S 亚基

D: 细胞内膜PBP

答案：C

53.连续应用易产生耐受性的是

A: 地尔硫

B: 硝苯地平

C: 硝酸甘油

D: 普萘洛尔

答案：C

54.适宜餐前嚼服的助消化药是()。

A: 雷尼替丁

B: 乳酸菌素

C: 前列地尔

D: 泮托拉唑

答案：B

55.维生素A的适应症不包括

A: 干眼病

B: 角膜软化

C: 夜盲症

D: 甲状旁腺功能不全引起的低钙血症

答案：D

56.体内缺乏维生素E会导致

A: 夜盲症

B: 孕育异常

C: 佝偻病

D: 脚气病

答案：B

57.下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

A: 左氧氟沙星

B: 丙美卡因

C: 噻吗洛尔

D: 毛果芸香碱

答案：D

58.治疗金黄色葡萄球菌感染导致的骨髓炎首选

A: 阿米卡星

B: 头孢克洛

C: 青霉素

D: 克林霉素

答案：D

59.（2019年真题）患者女，58岁，血糖升高10年，口服二甲双胍治疗，高血压病史5年，未规律治疗，近期查体：血压158/95mmHg，尿常规示蛋白尿（+++），适宜该患者使用的降压药物是（）

A: 甲基多巴

B: 普萘洛尔

C: 依那普利

D: 硝苯地平

答案：C

60.制成脂质体以降低药物肾毒性的抗真菌药是

A: 两性霉素

B: 阿糖胞苷
C: 氟胞嘧啶
D: 卡泊芬净
答案：A

61.属于Ⅰa类抗心律失常药的是
A: 奎尼丁
B: 普罗帕酮
C: 胺碘酮
D: 利多卡因
答案：A

62.下列对铜绿假单胞菌作用最强的抗菌药物是
A: 头孢噻肟
B: 头孢曲松
C: 头孢甲肟
D: 头孢哌酮
答案：D

63.患儿，男，5日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下2．5cm，脾肋下1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。
A: 新生儿出现明显皮肤黄染时，不宜使用头孢曲松
B: 新生儿肝功能未发育完全，不宜使用头孢曲松
C: 新生儿肾功能未发育完全，不宜使用头孢曲松
D: 新生儿对头孢曲松不敏感
答案：A

64.患者,女52岁,因“闭经1年,潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊,临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为:戊酸雌二醇片,每日1次,每次1mg,醋酸甲羟孕酮片每日1次,每次2mg。

A: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定

B: 应在绝经后6年之内开始

C: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

D: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状,但增加患糖尿病的风险

答案：C

65.用于器官移植的抗排异反应的药物是()

A: 环孢素

B: 甲泼尼龙

C: 硫唑嘌呤

D: 环磷酰胺

答案：A

66.硫脲类药物的不良反应不包括()

A: 粒细胞减少

B: 诱发甲亢

C: 过敏反应

D: 发热

答案：B

67.可与克拉霉素、兰索拉唑联合抗幽门螺杆菌治疗的药物是

A: 头孢唑林

B: 青霉素

C: 苄星青霉素

D: 阿莫西林

答案：D

68.属于CYP3A4底物/抑制剂，可能会增加他汀类药物肌肉不良反应危险性的是

A：烟酸

B：地高辛

C：红霉素

D：利福平

答案：C

69.单纯疱疹病毒感染的首选药是

A：金刚烷胺

B：干扰素

C：阿昔洛韦

D：碘苷

答案：C

70.用于敏感真菌所致的深部感染的药物是

A：两性霉素B

B：制霉菌素

C：益康唑

D：咪康唑

答案：A

71.主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

A：阿昔莫司

B：瑞舒伐他汀

C：依折麦布

D：利血平

答案：B

72.胰岛素依赖型重症糖尿病需

A：西格列汀

B：吡格列酮

C：阿卡波糖

D：胰岛素皮下注射

答案：D

73.关于右美沙芬药理作用及临床评价的说法,正确的是

A：通过阻断肺一胸膜的牵张感受器产生的质迷走神经反射而起到镇咳作用

B：镇咳作用弱于可待因

C：主要用于干咳但左旋右美沙芬有镇痛作用

D：口服吸收缓慢,主要经肝脏代谢作用时间长

答案：C

74.洋地黄毒苷的半衰期是()

A：7天以上

B：48小时

C：5天

D：72小时

答案：A

75.不溶于水，微溶于有机溶剂的是

A：替尼泊苷

B：羟喜树碱

C：依托泊苷

D：博来霉素

答案：B

76.中致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

A：化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予2天的阿瑞吡坦和2~3天的地塞米松

B：化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

C：化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

D：化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予2天的地塞米松或昂丹司琼

答案：D

77.下列哪种疼痛不用吗啡治疗

A：癌性剧痛

B：胆绞痛及肾绞痛

C：神经压迫性疼痛

D：急性锐痛

答案：C

78.肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵

A：可降低血氨浓度，诱发肝性脑病

B：可降低门脉压力，诱发出血

C：可升高门脉压力，诱发出血

D：可增加血氨浓度，诱发肝性脑病

答案：D

79.下述属于第三代 α

A：哌唑嗪

B：酚苄明

C：坦洛新

D：十一酸睾酮

答案：C

80.为防止中毒，不宜与铋剂联用的是

A：硫糖铝

B：甲硝唑

C：米索前列醇

D：枸橼酸铋钾

答案：D

81.关于艾塞那肽的描述，不正确的是

A：服药期间应警惕急性胰腺炎症状

B：可造成消化不良

C：应注意是否有过敏性症状

D：适用于糖尿病酮症酸中毒

答案：D

82.抑制HIV的反转录酶，导致链合成的终止并打断病毒复制的循环的药物是

A：非核苷类反转录酶抑制药

B：核苷类反转录酶抑制药

C：整合酶抑制剂

D：蛋白酶抑制药

答案：B

83.对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

A: 红霉素

B: 庆大霉素

C: 阿昔洛韦

D: 咪康唑

答案：D

84.治疗耐药金黄色葡萄球菌所致的感染或β-内酰胺类过敏患者的G+菌严重感染，首选药物是

A: 替硝唑

B: 红霉素

C: 万古霉素

D: 克林霉素

答案：C

85.患儿，女，10岁，体重35kg，因发热、咳嗽10日而入院。体温波动于38．5℃～39．5℃之间，咳嗽为刺激性干咳，少痰，以清晨及夜间为著。于外院先后静点青霉素及头孢类抗生素共6日，病情无明显好转。查体：一般状态良，双肺呼吸音粗糙，余无阳性体征。血常规正常，结核菌素试验阴性，X线胸片示右肺中叶大片状阴影。临床诊断考虑为支原体肺炎。

A: 阿奇霉素

B: 氟康唑

C: 甲硝唑

D: 莫西沙星

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/278057027043007022