

232 . 肠道疾病(一)

一、**A1 型题**：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1 . 依据 WHO 标准，可确诊为 Crohn 病

A . 区域性肠道病变，粘膜呈铺路石样改变

B . 非连续性肠道病变伴纵行溃疡

C . 全层性炎症性肠道疾病伴肿块及狭窄

D . 节段性肠道病变，纵行溃疡

E . 非连续性肠道病变，全层性炎及非干酪性肉芽肿

正确答案:E

2 . 以下为溃疡性结肠炎常见的并发症，哪项除外

A . 中毒性巨结肠

B . 大量出血

C . 急性穿孔

D . 内瘘外瘘形成

E . 直肠结肠癌变

正确答案:D

3 . 溃疡性结肠炎一般均有

A . 腹痛

B . 腹泻

C . 发热

D . 食欲不振

E . 贫血

正确答案:B

4 . 克罗恩病好发于

A . 回盲部

B . 空肠

C . 十二指肠

D . 末端回肠与邻近结肠

E . 直肠

正确答案:D

5 . 溃疡性结肠炎病变多位于

A . 全结肠

B . 回盲部

C . 回肠下段及升结肠

D . 横结肠

E . 直肠及乙状结肠

正确答案:E

6 . Crohn 病与肠结核的最重要鉴别在于

A . 有无发热、乏力、腹泻

B . 病变是否见于回肠末段

C . 肉芽肿有无干酪坏死

D . 有无血沉增快

E . 是否形成瘻管

正确答案:C

7 . 下列克罗恩病的表现中 , 哪项最少见

A . 腹痛

B . 腹块

C . 腹泻

D . 癌变

E . 瘻管形成

正确答案:D

8 . 克罗恩病最常见的临床表现是

A . 发热

B . 腹痛腹泻

C . 肠梗阻

D . 腹部肿块

E . 肛周瘻管

正确答案:B

9 . 下列哪项不是分泌性腹泻的特点

A . 肠黏膜组织学基本正常

B . 肠液与血浆渗透压相同

C . 禁食不减轻腹泻 , 也不加重腹泻

D . 常伴有肠鸣音亢进和腹痛

E . 粪呈水样 , 量大 , 无脓血或脂肪过多

正确答案:D

10 . 下列属于炎症性肠病(IBD)的是

A . 肠结核

B . 阿米巴肠炎

C . Crohn 病

D . 细菌性痢疾

E . 缺血性肠炎

正确答案:C

11 . Crohn 病多位于

A . 结肠肝曲

B . 直肠乙状结肠

C . 横结肠

D . 回肠末端及结肠起始部

E . 全结肠

正确答案:D

12 . 下列哪项不是溃疡性结肠炎的手，适应证

A . 中毒性巨结肠

B . 肠穿孔

C . 癌变

D . 暴发型溃疡性结肠炎

E . 脓肿和瘘管形成

正确答案:D

13 . 以下为溃疡性结肠炎的治疗原则 , 但哪项除外

A . 控制急性发作

B . 防治并发症

C . 减少复发

D . 缓解病情

E . 早期手术切除全结肠可根治本病

正确答案:E

14 . 溃疡性结肠炎发生中毒性巨结肠 , 一般以下列哪一部位最严重

A . 直肠

B . 横结肠

C . 降结肠

D . 升结肠

E . 乙状结肠

正确答案:B

15 . 结肠 Crohn 病的首选治疗药物

A . 灭滴灵

B . 柳氮磺胺吡啶

C . 羟氨苄青霉素

D . 强地松

E . 硫唑嘌呤

正确答案:B

16 . 下列哪项不是克罗恩病出现腹块的因素

A . 肠粘连

B . 肠系膜淋巴结肿大

C . 内瘘形成或局部脓肿

D . 肠壁与肠系膜增厚

E . 直肠外瘘通向肛周皮肤

正确答案:E

17 . 溃疡型结肠炎最严重的并发症是

A . 结肠假息肉形成

B . 结肠狭窄

C . 瘘管形成

D . 中毒性巨结肠

E . 肛门直肠周围脓肿

正确答案:D

18 . 柳氮磺胺吡啶(SASP)治疗溃疡性结肠炎的机制是

A . 降低肠道酸度

B . 抑制氧自由基形成

C . 促使肠上皮细胞再生

D . 抑菌作用

E . 肠粘膜保护作用

正确答案:B

19 . 哪种病理表现对溃疡性结肠炎的诊断有意义

A . 非干酪性肉芽肿

B . 炎症细胞浸润

C . 干酪性肉芽肿

D . 隐窝脓肿

E . 肠系膜淋巴结肿大

正确答案:D

20 . 关于 Crohn 病的临床表现 , 下述哪项不正确

A . 痉挛性阵发性腹痛 , 常位于右下腹与脐周

B . 右下腹或脐周扪到腹块

C . 可有肛周瘘管及脓肿

D . 全腹剧痛、腹肌紧张提示有肠穿孔

E . 腹泻以粘液血便为主

正确答案:E

21 . 治疗暴发性溃疡性结肠炎的首选方法是

A . 大剂量抗胆碱药物

B . 手术治疗

C . 大剂量肾上腺皮质激素

D . 水杨酸偶氮磺胺吡啶

E . 免疫抑制剂

正确答案:C

22 . 溃疡性结肠炎采用肾上腺皮质激素治疗，下列哪项正确

A . 只适用于暴发型

B . 可控制炎症，抑制自体免疫反应，减轻中毒症状

C . 停药后用硫唑嘌呤

D . 所有病例均可采用药物保留灌肠

E . 病情控制后 , 应立即停药

正确答案:B

23 . Crohn 病最常见的临床表现是

A . 腹痛腹泻

B . 高热

C . 肠梗阻

D . 腹部肿块

E . 肛门直肠周围病变

正确答案:A

24 . 溃疡性结肠炎病情复发的先兆为

A . 血白细胞计数增高

B . 血沉加速

C . 血清 α_2 球蛋白增加

D . 凝血酶原时间延长

E . 凝血因子Ⅷ活性增加

正确答案:C

25 . 治疗暴发型溃疡性结肠炎的首选方法为

A . 大剂量抗胆碱能药物

B . 水杨酸偶氮磺胺吡啶

C . 大剂量肾上腺糖皮质激素

D . 免疫抑制剂

E . 手术治疗

正确答案:C

26 . X 线钡灌肠检查时 , 下列哪项不符合溃疡性结肠炎

A . 轻型可正常

B . 呈铅管状

C . 肠壁呈毛刺状或锯齿状

D . 可呈跳跃征

E . 可见圆形或卵圆形充盈缺损

正确答案:D

27 . 鉴别克罗恩病与溃疡性结肠炎最有价值的是

A . 肛周脓肿

B . 隐窝脓肿

C . 黏膜深溃疡

D . 结肠直肠黏膜与受累肠段之间有"跳跃"表现

E . 钡剂灌肠示结肠正常

正确答案:E

28 . 下列哪项不是溃疡性结肠炎的 X 线表现

A . 肠壁边缘呈锯齿样

B . 结肠袋消失 , 肠壁变硬

C . 病变部位呈跳跃征象

D . 肠腔见圆或卵圆形充盈缺损

E．肠管缩短，肠腔变窄，呈铅管状

正确答案:C

29．对 Crohn 病具有诊断意义的病理表现为

A．干酪性肉芽肿

B．非干酪性肉芽肿

C．炎性细胞浸润

D．肠黏膜溃疡

E．肠系膜淋巴结肿大

正确答案:B

30．一般认为克罗恩病的发病主要与下列何者有关

A．病毒感染

B．变态反应

C．结核杆菌感染

D．遗传因素

E . 免疫反应

正确答案:E

31 . 易并发中毒性巨结肠的疾病是

A . Crohn 病

B . 溃疡型结肠炎

C . 溃疡型肠结核

D . 血吸虫病

E . 增生型肠结核

正确答案:B

32 . 诊断 Crohn 病的最有意义的病理改变

A . 全壁性炎症

B . 匍行性沟槽样溃疡

C . 非干酪性肉芽肿

D . 干酪性肉芽肿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278067070023006034>