丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

护士 120 理论试题

一、单选题

1、有关脑挫裂伤意识障碍的描述，不正确的是（）[单选题]*

A 、程度和持续时间与脑挫裂伤部位相关

B、中间清醒期是其特点 √

C 、多在半小时以上

D 、伤后立即出现

E、程度和持续时间与脑挫裂伤程度相关

2、头部外伤患者，深度昏迷，呼吸基本停止，医生应首先采取的措施是（）[单选题]*

A 、脑 CT 检查

B、缝合头皮裂伤减少出血

C 、畅通气道，进行呼吸支持 √

D 、系统进行检查

E、与家属谈话，并发病危通知

3、鉴别右心力衰竭与肝硬化的主要特点是（）[单选题]*

A 、有无腹水

B、有无下肢水肿

C 、肝脏是否肿大

D 、颈静脉是否充盈 √

E、有无脾脏肿大

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

4、胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿的机制是（）[单选题]*

A、穿刺损伤肺组织

B、抽液过多、过快，胸膜腔内压突然下降√

C、胸膜超敏反应

D、穿刺损伤肺血管

E、空气栓塞

5、气管切开术后出现广泛皮下气肿，最简单的处理方法是（）[单选题]*

A、抽吸气体

B、松解伤口缝线√

C、更换气管套管

D、让其自行吸收

E、以上都不是

6、急性有机磷杀虫药中毒者在症状援解后，24-96 小时突然发生死亡，最可能的原因是：（）[单选题]*

A、中间综合征√

B、阿托品中毒

C、严重心律失常

D、应激性溃疡

E、急性肾功能衰竭

7、最能反映门静脉高压特征的是（）[单选题]*

A、脾肿大

B、腹水形成

C、食管静脉曲张 √

D、腹壁静脉曲张

E、痔核形成

8、不属于糖尿病慢性并发症的是（）[单选题]*

A 动脉粥样硬化

B、肾脏病变

C、视网膜病变

D、角膜溃疡 √

E、心肌病

9、不符合电复律并发症的是（）[单选题]*

A、皮肤灼伤

B、心律失常

C、心肌损伤

D、动脉栓塞

E、心室壁穿孔 √

10、哮喘时可闻及的体征是（）[单选题]*

A、过清音

B、鼓音

C、实音

D、水泡音

E、哮鸣音 √

11、急性腹痛伴休克最常见的病因是（）[单选题]*

A、急性心肌梗死

B、大叶性肺炎

C、急性坏死性胰腺炎 √

D、胃十二指肠溃疡急性穿孔

E、急性坏死性胆囊炎

12、毒蛇咬伤最有效的早期治疗方法是（）[单选题]*

A、局部注射胰蛋白酶

B、局部清创

C、单价抗蛇毒血清 √

D、多价抗蛇毒血清

E、中医中药

13、代谢性酸中毒常见于（）[单选题]*

A、长期静脉滴注葡萄糖

B、幽门梗阻

C、急性阑尾炎

D、食管梗阻

E、弥漫性腹膜炎 √

14、中毒伴肾功能不全或昏迷者不宜使用的治疗方法是（）[单选题]*

A、吸氧

B、硫酸镁导泻 √

C、硫酸钠导泻

D、输液

E、洗胃

15、卵巢肿瘤常见的并发症是（）[单选题]*

A、蒂扭转 √

B、破裂

C、感染

D、恶变

E、腹膜炎

16、跨阈步态一般见于（）[单选题]*

A、小脑病变

B、不完全性截瘫

C、肌营养不良

D、脑血管意外后遗症

E、腓神经麻痹 √

17、尿毒症性高钾血症最有效的治疗方法是（）[单选题]*

A、静脉滴注碳酸氢钠

B、静脉滴注高渗葡萄糖和胰岛素

C、静脉滴注葡萄糖酸钙

D、血液透析 √

E、口服钠型阳离子交换树脂

18、急性心肌梗死早期(24 小时内)的主要死亡原因是（）[单选题]*

A、心源性休克

B、心律失常 √

C、心力衰竭

D、心脏破裂

E、心肌梗死后心绞痛

19、解除舌根后坠堵塞呼吸道的简便方法是（）[单选题]*

A、环甲膜穿刺术

B、口咽管放置术 √

C、经鼻腔气管插管术

D、经口腔气管插管术

E、气管切开术

20、提示昏迷程度加重的是（）[单选题]*

A、双侧对称性浅反射减弱

B、深反射亢进或消失

C、双侧腱反射不对称

D、出现病理反射

E、浅反射由减弱到消失 √

21、烧伤急救原则中正确的是（）[单选题]*

A、凡有呼吸道烧伤者，均应作气管切开

B、热液烫伤者不能用较于净冷水冲洗

C、凡有烧伤者均用哌替啶止痛

D、应就地清创

E、立即消除烧伤原因 √

22、提示子宫即将破裂的表现是（）[单选题]*

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

A、听不到胎心音

B、宫底迅速上升

C、子宫强直性收缩，并出现病理性缩复环 √

D、持续大量阴道出血

E、胎儿先露部于内诊时触不到

23、以吸气性呼吸困难为主要表现的疾病是（）[单选题]*

A、慢性支气管炎

B、气管异物 √

C、支气管哮喘

D、肺炎球菌肺炎

E、阻塞性肺气肿

24、诊断肠梗阻最主要的依据是（）[单选题]*

A、间歇性腹痛

B、腹部隐痛

C、恶心、呕吐

D、肝门停止排便

E、X 射线见腹部有多个液气平面及胀气肠袢 √

25、不能用于治疗误服强碱性溶液的是（）[单选题]*

A、牛奶

B、蛋清

C、冷生理盐水

D、弱酸性溶液

E、弱碱性溶液 √

26、符合浅昏迷临床表现的是（）[单选题]*

A、对疼痛刺激有反应 √

B、可以唤醒

C、无意识的自主运动消失

D、四肢腱反射消失

E、定向力障碍

27、不符合流行性腮腺炎传播方式的是（）[单选题]*

A、说话

B、蚊虫叮咬 √

C、咳嗽

D、喷嚏

E、飞沫

28、双肺满布湿啰音的疾病是（）[单选题]*

A、肺结核空洞

B、支气管扩张

C、支气管肺炎

D、肺瘀血

E、急性肺水肿 √

29、缺氧对呼吸影响的主要途径是（）[单选题]*

A、中枢化学感受器

B、外周化学感受器 √

C、体液

D、神经

E、氢离子

30、急性有机磷酯类中毒的临床表现是（）[单选题]*

A、腺体分减少，胃肠平滑肌兴奋

B、膀胱逼尿肌松弛，呼吸肌麻痹

C、支气管平滑肌松弛，唾液腺分泌增加

D、脑内乙酰胆碱水平下降，瞳孔扩大

E、以上答案都不准确 √

31、不符合电烧伤特点的是（）[单选题]*

A、皮肤的损伤轻微，全身损伤较重

B、主要损害心脏，引起血流动力学改变

C、可发生电休克，甚至呼吸心搏骤停

D、有入口和出口，均为III度烧伤

E、深部损伤范围不超过皮肤入口处 √

32、张力性气胸最有诊断意义的临床表现是（）[单选题]*

A、突发性呼吸困难

B、突发性胸痛

C、气管移向健侧 √

D、患侧叩诊呈鼓音

E、患侧呼吸音减低

33、不符合肝性脑病诱因的是（）[单选题]*

A、消化道出血

B、高钾性酸中毒 √

C、便秘

D、低血糖

E、缺氧

34、急性下壁心肌梗死最常见的合并症是（）[单选题]*

A、室性期前收缩

B、房室传导阻滞 √

C、心房颤动

D、房性心动过速

E、右束支传导阻滞

35、妊娠晚期腹部撞伤后出现腹痛、阴道出血及胎心音消失，应首先考虑的诊断是（）[单选题]*

A、前置胎盘

B、胎盘早期剥离 √

C、先兆早产

D、凝血功能障碍

E、脐带脱垂

36、急性心肌梗死 24 小时内并发急性左心衰竭时，最不宜应用的是（）[单选题]*

A、吗啡

B、洋地黄 √

C、利尿剂

D、硝酸甘油

E、多巴酚丁胺

37、右心衰竭体循环瘀血的临床表现是（）[单选题]*

A、端坐呼吸

B、心源性哮喘

C、劳力性呼吸困难

D、阵发性夜间呼吸困难

E、肝颈回流征阳性 √

38、不属于急性重型胰腺炎临床表现的是（）[单选题]*

A、休克

B、呼吸衰竭

C、发热

D、腹泻 √

E、消化道出血

39、深度达皮下组织的烧伤程度是（）[单选题]*

A、Ⅰ度

B、浅Ⅱ度

C、深Ⅱ度

D、Ⅲ度 √

E、Ⅵ度

40、患者表现为昏迷，瞳孔极度缩小，呼吸深度抑制，血压降低，最可能的中毒药物是（）[单选题]*

A、苯巴比妥

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

B、吗啡 √

C、地西泮

D、氯丙嗪

E、苯妥英钠

41、电击伤死亡的首要原因是（）[单选题]*

A、呼吸抑制

B、神经损伤

C、心脏骤停 √

D、血管损伤

E、热烧伤

42、闭合性肋骨骨折的治疗要点是（）[单选题]*

A、镇痛，防治并发症 √

B、胸腔穿刺

C、胸腔闭式引流

D、开胸探查

E、气管插管或气管切开

43、不属于阿托品化指标的是（）[单选题]*

A、心率减慢 √

B、颜面潮红

C、瞳孔较前增大

D、肺部啰音减少

E、口干，皮肤干燥

44、大面积严重烧伤患者转运前应首先处理的是（）[单选题]*

A、持续中心静脉压测定

B、彻底清创

C、建立输液途径 √

D、消毒敷料包扎创面，以免再感染

E、汽车运送时放置伤员与行驶方向平行

45、不属于骨折急救措施的是（）[单选题]*

A、一般处理

B、创口包扎

C、妥善固定

D、迅速运输

E、开放性骨折复位 √

46、急性颅内压增高时，患者早期生命体征的改变是（）[单选题]*

A、血压升高，脉博变缓，脉压差变小

B、血压升高，脉博增快，脉压差增大

C、血压降低，脉博变缓，脉压差变小

D、血压降低，脉搏增快，脉压差变小

E、血压升高，脉搏变缓，脉压差增大 √

47、髋关节后脱位的典型关节畸形是（）[单选题]*

A、屈曲，内收，内旋 √

B、屈曲，内收，外旋

C、屈曲，外展，内旋

D、屈曲，外展，外旋

E、屈曲，外旋

48、施工工地塌方引起工伤事故，对严重受伤患者的处理首先是（）[单选题]*

A、抗休克

B、止血、骨折固定

C、防治窒息 √

D、镇静止痛

E、抗感染

49、深Ⅱ度烧伤创面处理不正确的是（）[单选题]*

A、12000 氯已定清洗创面，去除异物

B、创面使用抗生素预防全身感染 √

C、油质纱布包扎创面

D、面部创面不包扎

E、去除水疱皮

50、关于休克患者预防急性肾衰竭的措施，不正确的是（）[单选题]*

A、及时纠正低血容量性休克

B、矫治休克时不宜使用易引起肾血管收缩的药物

C、对有溶血倾向的患者应保持肾小管通畅

D、休克合并 DIC 时，要及时应用肝素治疗

E、患者只要出现尿量减少，就要及时使用利尿剂 √

51、引起急性胆囊炎的常见病因是（）[单选题]*

A、胆管蛔虫进入胆囊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/278114042050007022