

中医眼科学试题及答案

1、以角膜映光法测斜视角时,若反光点偏角膜正中央的外侧,位于瞳孔缘,估计其斜视角约为

A.内斜 5°

B.内斜 10° —— 15°

C.内斜 25° —— 30°

D.外斜 5°

E.外斜 10° —— 15°

【答案】B

2、患者,男,82岁。黑睛深层见圆盘状灰白色翳障,漫掩黑睛,伴眼痛,畏光,流泪,视物模糊,可诊断为

A.宿翳

B.凝脂翳

C.湿翳

D.混睛障

E.聚星障

【答案】D

3、患者年过七旬,视物昏花,冷泪常流,多属

A.肝郁气逆

B.肝阳上亢

C.肝经虚热

D.肝肾亏虚

E.肺脾气虚

【答案】D

4、黑睛星翳,反复发作,缠绵难愈,舌红苔黄腻,宜用

A.新制柴连汤

B.荆防败毒散

C.羌活胜风汤

D.三仁汤

E.消翳汤

【答案】D

5、以角膜映光法测斜视角时,若反光点偏角膜正中央的外侧,位于瞳孔缘,估计其斜视角约为

A.内斜 5°

B.内斜 10° —— 15°

C.内斜 25° —— 30°

D.外斜 5°

E.外斜 10° —— 15°

【答案】B

6、患者眼前似有阴影漂浮的视觉异常是指

A.视瞻昏渺

B.视瞻有色

C.云雾移睛

D.圆翳内障

E.绿翳青盲

【答案】C

7、起止.经过眶下的经脉有

A.手少阳三焦经

B.足太阳膀胱经

C.手少阴心经

D.足太阴脾经

E.以上都不对

【答案】A

8、圆翳内障的病因是

A.外伤

B.先天

C.年老

D.中毒

E.辐射

【答案】C

9、《秘传眼科龙木论》“此眼初患之时，皆因乳母多有吃食乖违，将息失度，爱食湿面五辛诸毒丹药，积热在腹，后此令胎中患眼，生后五六岁以来，不言不笑，睹无盼视，父母始觉。”指的是

- A.目系暴盲
- B.绿风内障
- C.惊震内障
- D.胎患内障
- E.圆翳内障

【答案】D

10、关于早产儿视网膜病变表现，下列哪项不是

- A.视网膜嵴
- B.视网膜外纤维血管组织增生
- C.视网膜脱离
- D.视网膜血管化与非血管化区域之间存在分界线
- E.视网膜出血、水肿

【答案】E

11、患者，男，33岁，右眼碜涩疼痛，畏光流泪，视力下降，检查见抱轮红赤，黑睛边缘骤生翳障，四周高起，中间低陷，舌红苔薄黄，脉浮数。其中医诊断为

- A.凝脂翳

B.花翳白陷

C.混睛障

D.湿翳

E.聚星障

【答案】B

12、黑睛异物取出术后3天,患眼畏光流泪目痛,抱轮红赤.黑睛星翳,舌淡红,苔薄,脉浮数,治疗方选

A.生蒲黄汤

B.祛瘀汤

C.石决明散

D.泻脑汤

E.血府逐瘀汤

【答案】C

13、绿风内障的西医治疗宜用

A.缩瞳剂

B.扩瞳剂

C.抗生素

D.房水抑制剂

E.脱水剂

【答案】ADE

14、《眼科金镜》“盖因病后热留经络,壅闭玄府,精华不能上升荣养之故”,是对()病因病机的描述

A.小儿青盲

B.暴盲

C.视瞻昏渺

D.云雾移睛

E.圆翳内障

【答案】A

15、散瞳合剂的组成是

A.阿托品.托品酰胺.肾上腺素

B.阿托品.可卡因.新福林

C.阿托品.可卡因.肾上腺素

D.后阿托品.可卡因.肾上腺素

E.阿托品.托品酰胺.可卡因

【答案】C

16、绿翳青盲相当于西医学之

A.视神经萎缩

B.开角型青光眼

C.急性闭角型青光眼

D.老年性白内障

E.慢性闭角型青光眼

【答案】C

17、湿邪外侵或湿浊内蕴所引起的眼病,其内治法是

A.益气养血法

B.疏风清热法

C.软坚散结法

D.活血化瘀法

E.祛湿法

【答案】E

18、远视力检查时,下列描述正确的是

A.表上 0.1 行视标应与被检眼在同一高度

B.表上 0.2 行视标应与被检眼在同一高度

C.表上 0.5 行视标应与被检眼在同一高度

D.表上 1.0 行视标应与被检眼在同一高度

E.表上 1.2 行视标应与被检眼在同一高度面

【答案】D

19、鼻泪管下端开口于

A.上鼻道

B.中鼻道

C.下鼻道

D.鼻前庭

E.泪囊

【答案】C

20、风赤疮痍,风火上攻证的主方是

A.普济消毒饮

B.除风清脾饮

C.龙胆泻肝汤

D.黄连解毒汤

E.仙方活命饮

【答案】A

21、在距离视力表3米处看清0.1行视标时,其视力应记录为

A.0.3

B.0.03

C.0.06

D.0.1

E.0.04

【答案】C

22、治疗圆翳内障的原则为

A.本病初起早期,可采用内服或外用药物治疗,以期病情能够进展缓慢,若翳定障老,患者视物功能严重障碍时,则适宜手术治疗

B.内服或外用药物治疗

C.手术治疗

D.若视功能损伤严重应手术治疗,术后配合弱视训练

E.若视功能损伤严重可滴用麝珠明目滴眼液

【答案】A

23、胞生痰核,痰热蕴结证的主方是

A.化坚二陈汤

B.三仁汤

C.除湿汤

D.温胆汤

E.除风清脾饮

【答案】D

24、当左侧视束受到损伤时,视野可出现

A.右眼颞侧及左眼鼻侧视野缺损

B.右眼全盲

C.左眼全盲

D.双眼颞侧视野缺损

E.左眼颞侧及右眼鼻侧缺损

A

25、双眼频频目眨,不能自主,病属

A.目劄

B.目翳

C.风牵偏视

D.胞轮振跳

E.辘轳转关

【答案】A

26、以下哪项不是聚星障的眼部体征

A.抱轮红赤

B.黑睛表面点状混浊

C.黑睛病灶呈树枝状

D.黑睛病灶呈地图状

E.黑睛病灶状如豆腐渣

【答案】E

27、全科医疗的基本特征不包括

A.为社区居民提供连续性服务

B.提供以患者为中心的服务

C.提供以社区为基础的服务

提供以家庭为单位的服务

E. 提供以家庭病床为主的服务

【答案】E

28、前房出血引起角膜血染的原因是

A. 继发性青光眼

B. 继发低眼压

C. 积血超过了 24 小时

D. 由于角膜裂伤,使积血渗入

E. 由于角膜上皮受伤所致

【答案】A

29、肝劳的主要临床表现如头眼胀痛等,常在以下哪种情况下出现

A. 晨起后

B. 劳动后

C. 游泳后

D. 患肝病后

E. 久视后

【答案】E

30、目为哪脏之外窍

A. 心

肝

C.脾

D.肺

E.肾

【答案】B

31、风牵偏视经针.药治疗半年余,仍复视严重,可行

A.灸疗

B.按摩疗法

C.拔罐疗法

D.药浴

E.手术治疗

【答案】E

32、患者 60 岁,视力逐渐下降,晶体混浊,头痛目涩,口苦咽干,大便秘结,舌红苔薄黄,脉弦。宜选方

A.石决明散

B.杞菊地黄丸

C.补中益气汤

D.八珍汤

E.归脾汤

【答案】A

、患者,男,25岁。煤矿工人,两天前井下发生爆炸,伤及双眼,现白睛混赤,剧痛难睁,凝脂呈黄绿色,凹陷几乎累及黑睛全层,病势凶险,多考虑何种细菌感染

- A.真菌
- B.病毒
- C.霉菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.绿脓杆菌

【答案】E

34、眼与脏腑和全身其他组织器官保持密切联系依靠的是

- A.气血
- B.经络
- C.神经
- D.先天之精
- E.后天之精

【答案】B

35、六淫致眼病中,最多见的是

- A.风.火.燥
- B.风.火.湿
- C.风.寒.火
- D.湿.燥.火

风.寒.湿

【答案】B

36、以下哪项不是聚星障的眼部体征

A.抱轮红赤

B.黑睛表面点状混浊

C.黑睛病灶呈树枝状

D.黑睛病灶呈地图状

E.黑睛病灶状如豆腐渣

【答案】E

37、患者,女,65岁。素患漏睛,一周前突发头目剧痛,畏光难睁,经查见白睛混赤,神水混浊,黑睛凹陷深大,凝脂肥厚,并伴口苦,溲黄,便秘,舌红,苔黄,脉弦滑数,宜选下列何方加减治疗

A.新制柴连汤

B.托里消毒散

C.四顺清凉饮子

D.滋阴退翳汤

E.加味修肝散

【答案】C

38、眼前似有阴影飘浮,神膏混浊,视物昏花,兼见头晕心悸,乏力倦怠,舌淡苔薄白,脉细弱,宜用

明目地黄汤

B.杞菊地黄丸

C.补中益气丸

D.八珍汤

E.天麻钩藤饮

【答案】D

39、与七情过激有关的眼病有

A.绿风内障

B.青风内障

C.圆翳内障

D.高风内障

E.漏睛

【答案】AB

40、巩膜占眼球壁外层的

A.0.16.....67

B.0.6.....67

C.0.25

D.0.2

E.0.8333333333

【答案】E

【解析】

41、治疗凝脂翳属里热炽盛证的主方是

- A.银翘散
- B.龙胆泻肝汤
- C.四顺清凉饮子
- D.大承气汤
- E.新制柴连汤

【答案】C

42、瞳神干缺发生眼珠萎软的原因是

- A.神水枯竭
- B.神水瘀滞
- C.晶珠混浊
- D.瞳神闭锁
- E.神水混浊

【答案】A

43、绿风内障西医急救处理时使用 1%毛果芸香碱的目的是

- A.抑制房水生成,降低眼压
- B.利尿降压

C.缩小瞳孔

D.扩大瞳孔

E.缓解疼痛

【答案】C

44、患眼自觉涩痛畏光,泪热眵结,白睛上小泡样颗粒隆起,其周围赤脉怒张;兼有口渴鼻干,便秘溲赤;舌红苔黄,脉数有力。属于

A.肺经燥热

B.肺阴不足

C.肺脾两虚

D.肝肾两虚

E.脾胃湿热

【答案】A

45、近视眼 $>-6.00D$ 以上称为

A.中度近视

B.高度近视

C.真近视

D.轻度近视

E.假性近视

【答案】B

46、患眼内眦溢脓,不红不肿,压之不痛,指压脓出,多属

- A.脾虚有湿
- B.心经郁热
- C.心肺风热
- D.脾经风热夹湿
- E.以上都不是

【答案】A

47、正常瞳孔大小范围

- A.1——2.5 毫米
- B.2——3 毫米
- C.4——5 毫米
- D.2.5 ——4 毫米
- E.5 ——6 毫米

【答案】D

48、患者常在情绪波动.过劳或睡眠不足等情况下出现眼胀.头痛.不耐久视,中心视力较好,视野日渐缩小,平时自觉症状不明显或无症状。该病首先考虑的诊断是

- A.绿风内障
- B.青风内障
- C.黑风内障
- D.乌风内障
- E.黄风内障

【答案】B

49、角膜组织学上分为

A.3

B.4

C.5

D.8

E.10

【答案】C

【解析】

50、黑睛异物取出术后3天,患眼畏光流泪目痛,抱轮红赤.黑睛星翳,舌淡红,苔薄,脉浮数,治疗方选

A.生蒲黄汤

B.祛瘀汤

C.石决明散

D.泻脑汤

E.血府逐瘀汤

【答案】C

51、六淫致眼病中,最多见的是

A.风.火.燥

B.风.火.湿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/27813211410006132>