

## 儿科护士规范化培训自学理论测试五试题及答案

[矩阵文本题] \*

姓名：	_____
科室：	_____

1. 腹腔镜手术气腹冲气使用的气体是( ) [单选题] \*

A . CO2(正确答案)

B . CO

C . O2

D . N2

2. 手术中通过纱布来估计失血量时，普通 30 平方厘米大小的纱布饱含血液量为( ) [单选题] \*

A . 30ML(正确答案)

B . 40ML

C . 20ML

D . 50ML

3. 手术部位皮肤消毒时，消毒范围普通扩大至距切口( ) [单选题] \*

A . 5 - 10CM

B . 10 - 15CM

C . 15 - 20CM(正确答案)

D . 20 - 25CM

4. 手术室一次性物品使用合格率为() [单选题] \*

A . 99%

B . 100%(正确答案)

C . 98%

D . 97%

5. 病理标本固定液甲醛浓度为() [单选题] \*

A . 0.1%

B . 1%

C . 2%

D . 10%(正确答案)

6. 列哪种是污染手术() [单选题] \*

A . 脓肿切开引流(正确答案)

B . 肾切除

C . 脾切除

D . 甲状腺切除

7. 持物钳的用途是() [单选题] \*

A . 夹取和传递无菌物品(正确答案)

B . 夹取和传递手术用过的物品

C . 夹取和传递污染物品

D . 夹取和传递有菌物品

8. 橡皮引流条用于哪种引流() [单选题] \*

A . 深层

B . 浅层(正确答案)

C . 任何层

D . 腹部

9. 局麻手术加入肾上腺素最主要的目的是() [单选题] \*

A . 减少炎症反应

B . 提高痛阈

C . 提高血压

D . 延长局部麻醉药的作用时效(正确答案)

10. 全麻术后病人应取() [单选题] \*

A . 端坐位

B . 仰卧屈膝位

C . 截石位

D . 侧卧位

E . 平卧位(正确答案)

11. 卷轴绷带包扎，下列哪项是错误的() [单选题] \*

A . 包肢体应保持功能位

B . 应从近心端开始包扎(正确答案)

C . 包扎时用力要均匀

D . 湿绷带不宜使用

E . 绷带固定结应在肢体外侧并避开伤口

12. 灭菌后的无菌物品其有效保存期为() [单选题] \*

A . 12h

B . 24h

C . 1天

D . 7天(正确答案)

E . 7-15天

13. 下列叙述错误的是 () [单选题] \*

A . 穿好手术衣后前臂应腰水平以上

B . 无菌物品不可低于腰以下或者手术台面以下

C . 无菌手术衣的无菌范围限于身体前面、肩以下及袖子(正确答案)

D . 手套手术衣及手术用物如有污染、破损，浸泡时应即将更换

14. 手术中无菌持物钳干燥保存的时间为 () [单选题] \*

- A . h
- B . 2h
- C . 3h
- D . 4h(正确答案)

15. 无菌物品柜、架应距天花板大于等于() [单选题] \*

- A . 10cm
- B . 20cm
- C . 30cm
- D . 40cm
- E . 50cm(正确答案)

16. 胸科手术体位安置哪项是错的? () [单选题] \*

- A . .患侧在上, 侧卧 90°
- B . 患侧下肢屈曲
- C . 腋下置软垫
- D . 头低 15°, 脚低 35°(正确答案)
- E . 两膝间垫软枕

17. 气性坏疽手术后手术间负压系统在正常自净时间后应再持续运行() [单选题]

\*

- A . 10 min
- B . 15 min(正确答案)

C . 20 min

D . 30 min

E . 40 min

18. 引起伤口术后感染的主要细菌传播途径是() [单选题] \*

A . 空气传播

B . 菌尘传播

C . 接触传播(正确答案)

D . 虫媒传播

19. 室内面积大于 30 平方米的手术间空气采样布点数至少为() [单选题] \*

A . 3 个

B . 4 个

C . 5 个(正确答案)

D . 6 个

20. 剖宫产时使用组织钳夹住子宫肌层目的是 () [单选题] \*

A . 牵开

B . 止血

C . 夹紧

D . 牵拉、止血(正确答案)

E . 以上均不是

21. 下列哪项符合无菌技术操作原则() [单选题] \*

- A . 无菌操作前 30 分钟清扫地面
- B . 无菌包潮湿待干后使用
- C . 取出的无菌物品未用即将放回原处
- D . 操作时手臂保持在腰部水平以上(正确答案)

22. 标准体位不包括 () [单选题] \*

- A . 仰卧位
- B . 侧卧位
- C . 俯卧位
- D . 截石位(正确答案)

23. 负极板粘贴部位选择不合适的是 () [单选题] \*

- A . 肌肉血管丰富部位
- B . 皮肤清洁干燥部位
- C . 肌肉发达毛发丰富部位(正确答案)
- D . 易于观察部位

24. 接触恶性肿瘤的手术器械处理正确的是 () [单选题] \*

- A . 严禁再用于正常组织(正确答案)
- B . 可用生理盐水冲洗后再使用
- C . 可用碘伏擦拭后继续使用

D . 以上方法均可以

25. 低体温对机体的影响错误的是 () [单选题] \*

A . 增加手术部位感染风险

B . 心血管系统并发症增加

C . 对于创伤患者，死亡率增加

D . 增加手术出血量

E . 低血糖的发生率增加(正确答案)

26. 下列哪项不是手术室消防器材与设备 () [单选题] \*

A . 灭火器

B . 消防栓

C . 报警装置

D . 应急灯

E . 应急锤(正确答案)

27. 下列不是手术器械清点原则的是 () [单选题] \*

A . 三次清点原则(正确答案)

B . 双人逐项清点原则

C . 同步唱点原则

D . 逐项即刻记录原则

E . 原位清点原则

28. 自体输血的适应症错误的是 () [单选题] \*

- A . 异位妊娠
- B . 剖宫产大出血(正确答案)
- C . 髌关节置换
- D . 器官移植手术
- E . 动脉瘤手术

29. 手术室常用的空气培养采样方法 () [单选题] \*

- A . 仪器采样法
- B . 平板暴露法(正确答案)
- C . 过滤法
- D . 固体撞击法

30. 《医院感染管理规范》中规定, 医用垃圾与生活垃圾的处理原则为 () [单选题] \*

- A . 混合放置、一起装运
- B . 半封闭运送、分开装运
- C . 封闭运送、分开装运(正确答案)
- D . 封闭运送、一起装运

31. 腹腔镜器械保养的关键是 () [单选题] \*

- A . 清洗(正确答案)
- B . 拆卸

C . 超声

D . 干燥

32. 压疮高风险的患者，对手术部位，在不影响手术的情况下，至少应当间隔() 小时调整受压部位一次 [单选题] \*

A . 1 小时

B . 2 小时(正确答案)

C . 3 小时

D . 1.5 小时

33. 乙状结肠远端手术应采取什么卧位 () [单选题] \*

A . 平卧位

B . 侧卧位

C . 截石位(正确答案)

D . 俯卧位

34. 半限制区划分错误的是 () [单选题] \*

A . 麻醉诱导间(正确答案)

B . 洗涤间

C . 消毒室

D . 护士站

E . 敷料间

35. 空气净化技术下列正确的是 () [单选题] \*

A . 通过初、中、高效 3 级过滤控制(正确答案)

B . 通过中、高效 2 级过滤控制

C . 通过初、中、亚高、高效 4 级过滤控制

D . 只通过高效过滤控制

E . 以上均错

36. 无菌手术衣非无菌区域指 () [单选题] \*

A . 肩以下

B . 两袖子

C . 腰以上

D . 背部(正确答案)

E . 以上均错

37. 手术病人皮肤消毒范围以切口为中心是 () [单选题] \*

A . 15 ~ 20cm(正确答案)

B . 20cm

C . 15cm

D . 25cm

E . 30cm

38. 外科手消毒的时间为 () [单选题] \*

A . 2min

B . 3 ~ 5min(正确答案)

C . 5 ~ 10min

D . 5min

E . 4 ~ 6min

39. 剖腹布类包中治疗巾必须有() [单选题]\*

A . 1块

B . 2块

C . 3块

D . 4块(正确答案)

E . 6块

40. 整理显微精密器械的时候尖端要保持 () [单选题]\*

A . 向上(正确答案)

B . 向下

C . 向左

D . 向右

E . 水平

41. 能泯灭物品上包括芽孢在内的一切微生物的方法是() [单选题]\*

A . 灭菌(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/28503204022011110>