

## 一级技师药剂员考试题

1.甲氨蝶呤所致的巨幼红细胞性贫血宜用 [单选题]\*

- A.叶酸
- B.甲酰四氢叶酸 (正确答案)
- C.维生素 B12
- D.维生素 K

2.口服铁剂常见的不良反应是 [单选题]\*

- A.胃酸分泌过多
- B.肾损伤
- C.胃肠道刺激症状 (正确答案)
- D.过敏反应

3.影响维生素 B12 吸收的主要因素是 [单选题]\*

- A.内因子 (正确答案)
- B.铁离子
- C.叶酸
- D.维生素 C

4.治疗新生儿出血最好选用 [单选题]\*

- A.维生素 K (正确答案)
- B.氨甲环酸

- C.凝血酶
- D.垂体后叶素

5.肝素的抗凝作用特点是 [单选题]\*

- A.仅在体内有效
- B.尽在体外有效
- C.仅口服有效
- D.体内、体外都有效 (正确答案)

6.肝素抗凝作用的主要机制是 [单选题]\*

- A.与钙离子形成络合物
- B.促进抗凝血酶III的活性 (正确答案)
- C.激活纤溶系统
- D.对抗维生素K的作用

7.肝素用量过大引起的自发性出血，应用下列何种药物对抗 [单选题]\*

- A.维生素K
- B.鱼精蛋白 (正确答案)
- C.氨甲苯酸
- D.华法林

8.华法林过量引起的自发性出血，应用何药对抗 [单选题]\*

- A.维生素K (正确答案)
- B.鱼精蛋白
- C.垂体后叶素

D. 氨甲苯酸

9. 治疗慢性失血（如内痔出血）所致的贫血应选用 [单选题] \*

A. 维生素 K

B. 硫酸亚铁 (正确答案)

C. 叶酸

D. 维生素 B12

10. 巨幼红细胞贫血患者合并神经症状时必须应用 [单选题] \*

A. 维生素

B12 (正确答案)

B. 叶酸

C. 甲酰四氢叶酸钙

D. 硫酸亚铁

11. 长期应用广谱抗生素，为预防出血应补充 [单选题] \*

A. 铁剂

B. 叶酸

C. 维生素 K (正确答案)

D. 维生素 B12

12. 防治静脉血栓的口服药物是 [单选题] \*

A. 尿激酶

B. 链激酶

C. 低分子肝素

D.华法林(正确答案)

13.肝素体内抗凝最常用的给药途径为 [单选题]\*

A.口服

B.肌肉注射

C.静脉注射(正确答案)

D.皮下注射

14.组胺主要存在于人体何种细胞中 [单选题]\*

A.嗜酸粒细胞

B.中性粒细胞

C.肥大细胞(正确答案)

D.巨噬细胞

15.中枢抑制最弱的 H1 受体阻断药是 [单选题]\*

A.苯海拉明

B.异丙嗪

C.氯苯那敏

D.阿司咪唑(正确答案)

16.H1 受体阻断药对于下列哪种过敏反应疗效较高 [单选题]\*

A.荨麻疹(正确答案)

B.支气管哮喘

C.过敏性休克

D.接触性皮炎

17.苯海拉明不具有的作用是 [单选题]\*

- A.镇静
- B.抗过敏
- C.抑制胃酸分泌(正确答案)
- D.抗晕止吐

18.H1受体阻断药最常见的不良反应是 [单选题]\*

- A.烦躁、失眠
- B.镇静、嗜睡(正确答案)
- C.致畸
- D.过敏反应

19.下列对异丙嗪叙述，正确的是 [单选题]\*

- A.镇吐(正确答案)
- B.抗精神病
- C.减少胃酸分泌
- D.治疗支气管哮喘

20.可用于治疗晕动病的药物是 [单选题]\*

- A.苯海拉明(正确答案)
- B.西替利嗪
- C.阿司咪唑
- D.氯雷他定

21.H1受体阻断药对于下列何症无效 [单选题]\*

- A. 荨麻疹
- B. 过敏性鼻炎
- C. 过敏性休克 (正确答案)
- D. 枯草热

22. 高空作业者在工作期间不宜使用的药物是 [单选题] \*

- A. 氯雷他定
- B. 氯化钙
- C. 阿司咪唑
- D. 异丙嗪 (正确答案)

23. 钙盐因刺激性强，治疗变态反应性治病时的给药途径采用 [单选题] \*

- A. 皮下注射
- B. 静脉注射 (正确答案)
- C. 口服
- D. 肌肉注射

24. 具有保护溃疡面的抗酸药 [单选题] \*

- A. 氧化镁
- B. 碳酸氢钠
- C. 硫酸钠
- D. 氢氧化铝 (正确答案)

25. 中枢抑制药过量中毒时宜选用的导泻药是 [单选题] \*

- A. 氢氧化铝

- B. 酚酞
- C. 硫酸镁
- D. 硫酸钠 (正确答案)

26. 硫酸镁注射速度过快引起中毒可立即注射 [单选题] \*

- A. 氯化钙溶液 (正确答案)
- B. 氯化钠溶液
- C. 氯化钾溶液
- D. 葡萄糖溶液

27. 下列药物不能与碱性药物合用的是 [单选题] \*

- A. 硫糖铝 (正确答案)
- B. 哌仑西平
- C. 奥美拉唑
- D. 西咪替丁

28. 下列抗溃疡药中可引起舌及大便黑染的药物是 [单选题] \*

- A. 氢氧化铝
- B. 硫糖铝
- C. 雷尼替丁
- D. 枸橼酸铋钾 (正确答案)

29. 下列可产生成瘾性的止泻药是 [单选题] \*

- A. 地芬诺酯 (正确答案)
- B. 思密达

C.次碳酸铋

D.鞣酸蛋白

30.下列药物配伍合理的是 [单选题]\*

A.稀盐酸+氢氧化铝

B.稀盐酸+胃蛋白酶 (正确答案)

C.稀盐酸+胰酶

D.甲氧氯普胺+阿托品

31.通过阻断 M1 受体，减少胃酸分泌的药物是 [单选题]\*

A.西咪替丁

B.法莫替丁

C.哌仑西平 (正确答案)

D.奥美拉唑

32.下列平喘药中属于 M 受体胆碱受体阻断药的是 [单选题]\*

A.特布他林

B.布地奈德

C.酮替酚

D.异丙托溴铵 (正确答案)

33.属于  $\beta$ 受体激动药的平喘药是 [单选题]\*

A.孟鲁司特

B.氨基酸

C.酮替酚



D.沙丁胺醇(正确答案)

34.支气管炎症过程中有明显抑制作用的平喘药是 [单选题]\*

A.肾上腺素

B.倍氯米松(正确答案)

C.异丙肾上腺素

D.沙丁胺醇

35.下列药物无平喘作用的是 [单选题]\*

A.肾上腺素

B.可待因(正确答案)

C.异丙肾上腺素

D.氨茶碱

36.可待因是 [单选题]\*

A.吗啡的去甲衍生物

B.兼有中枢和外周作用的镇咳药

C.非成瘾性镇咳药

D.兼有镇痛作用的镇咳药(正确答案)

37.临床用于预防哮喘，对正在发作哮喘无效的是 [单选题]\*

A.氨茶碱

B.特布他林

C.异丙肾上腺素

D.色甘酸钠(正确答案)

38.

[单选题]\*

- A.某些水肿症利尿
- B.心源性哮喘
- C.急性心功能不全
- D.心绞痛 (正确答案)

39.酮替酚属于下述何类药物 [单选题]\*

- A.氨茶碱
- B. 受体激动药
- C.糖皮质激素类药
- D.抗过敏平喘药 (正确答案)

40.治疗哮喘严重持续状态或者重症哮喘时，可选用 [单选题]\*

- A.静脉注射糖皮质激素 (正确答案)
- B.肌肉注射氨茶碱
- C.气雾吸入色甘酸钠
- D.气雾吸入异丙肾上腺素

41.与地塞米松相比，倍氯米松治疗哮喘的主要优点是 [单选题]\*

- A.平喘作用强
- B.起效快
- C.抗炎作用弱
- D.长期应用也不抑制肾上腺皮质功能 (正确答案)

42.具有外周性镇咳作用的药物是 [单选题]\*

B.右美沙芬

C.苯佐那酯(正确答案)

D.乙酰半胱氨酸

43.为过敏介质阻释药，兼有 H1 受体阻断作用，可预防哮喘发作用的是 [单选题]\*

A.倍氯米松

B.特布他林

C.吸入色甘酸钠

D.酮替芬(正确答案)

44.乙酰半胱氨酸的主要作用和用途是 [单选题]\*

A.保护胃黏膜，治疗消化道溃疡

B.抑制肺牵张感受器，用于镇咳

C.裂解粘蛋白分子，用于化痰(正确答案)

D.提高肠张力，减少肠蠕动，治疗腹泻

45.对黏痰量多的患者不宜用的是 [单选题]\*

A.可待因(正确答案)

B.喷托维林

C.苯丙哌林

D.苯佐那酯

46.既能祛痰又能酸化体液和尿液的药物是 [单选题]\*

A.氯化铵(正确答案)

C.羧甲司坦

D.乙酰半胱氨酸

47.麦角新碱治疗产后出血的机制 [单选题]\*

A.收缩血管

B.促进血管修复

C.促进凝血

D.使子宫平滑肌强直性收缩，压迫肌层血管 (正确答案)

48.可用于防治早产的药物 [单选题]\*

A.利托君 (正确答案)

B.缩宫素

C.麦角新碱

D.米索前列醇

49.缩宫素在用于催产时，给药途径为 [单选题]\*

A.肌肉注射

B.口服

C.静滴 (正确答案)

D.皮下注射

50.某一临产妇，宫口开全，胎位正常，胎膜已破，但存在宫缩无力，此时应给予 [单选题]\*

A.小剂量缩宫素 (正确答案)

C.大剂量缩宫素

D.麦角新碱

51.下列哪个不属于缩宫素特点 [单选题]\*

A.对子宫体兴奋作用强

B.大剂量引起子宫平滑肌强直性收缩

C.孕激素升高子宫对缩宫素的敏感性(正确答案)

D.对子宫颈有松弛作用

52.一位艾迪生病患者，需使用地塞米松治疗，最佳的用药方案是 [单选题]\*

A.一般剂量长期疗法

B.大剂量突击疗法

C.隔日疗法

D.小剂量替代疗法(正确答案)

53.糖皮质激素对下列哪种休克治疗效果最好 [单选题]\*

A.过敏性休克

B.感染性休克(正确答案)

C.中毒性休克

D.低血容量性休克

54.糖皮质激素不具有下列哪种药理作用 [单选题]\*

A.抗炎作用

B.抑制细胞免疫和体液免疫

D.提高机体对外毒素的耐受力 (正确答案)

55.糖皮质激素不能用于下列哪种疾病的治疗 [单选题]\*

A.水痘和带状疱疹 (正确答案)

B.风湿性关节炎

C.感染性休克

D.急性粟粒性肺结核

56.严重肝功能不全的患者不宜用 [单选题]\*

A.甲泼尼松龙

B.氢化可的松

C.泼尼松龙

D.泼尼松 (正确答案)

57.糖皮质激素治疗严重感染，下列哪项作用是无益的 [单选题]\*

A.抗炎作用

B.抗休克作用

C.退热作用

D.抗免疫作用 (正确答案)

58.糖皮质激素隔日疗法的给药时间为 [单选题]\*

A.隔日早上8点 (正确答案)

B.隔日中午12点

C.隔日下午4点

8 点

59.长期使用糖皮质激素突然停药后,可导致 [单选题]\*

- A.骨质疏松
- B.库欣综合征
- C.肾上腺皮质功能不全症(正确答案)
- D.急性消化道溃疡

60.婴幼儿期甲状腺不足易患 [单选题]\*

- A.侏儒症
- B.单纯性甲状腺肿
- C.呆小病(正确答案)
- D.黏液性水肿

61.硫脲类药抗甲状腺激素的主要药理作用 [单选题]\*

- A.影响碘的摄取
- B.干扰甲状腺素的作用
- C.抑制甲状腺腺素的合成(正确答案)
- D.抑制甲状腺素的释放

62.治疗甲状腺危象宜选用 [单选题]\*

- A.大剂量碘剂单用
- B.硫脲类药单用
- C.大剂量碘+硫脲类药(正确答案)
- 受体阻断药单用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/285121021133011110>