

儿童换牙期间的注意事项



浙江大学医学院附属口腔医院

颌面外科



换牙的时间和顺序


- 为什么要换牙？
- 换牙时间 **6岁——12岁**
- 换牙顺序 左右对称，先下后上




换牙期间的常见问题

1. 乳牙滞留









正常

异常

异常


恒牙是顶着乳牙长出的。参考前面的牙齿萌出时间表，如果有恒牙在乳牙一侧萌出和迟迟不萌出或者乳牙过早脱落等情况都说明会有牙列不齐的可能。




- 
-
- 乳牙滞留的原因 恒牙萌出方向异常
 恒牙先天缺失
 - 结果 双排牙
 - 处理 拔除滞留乳牙



2、乳牙齲齿







■ 下面最容易引起龋齿的是哪种食物？

A 糖果

B 饼干

C 可乐

D 甜牛奶

E 牛肉干



- 乳牙龋齿危害

发炎

影响咀嚼

恒牙发育

颌骨发育



- 处理方法

预防（刷牙 窝沟封闭）

治疗



3、乳牙早失

■ 原因 乳牙龋坏未做治疗


■ 结果 影响咀嚼

邻牙移位


恒牙错位


处理 预防为主 间隙保持器

异位萌出的牙齿排列



异位萌出是牙齿排列不齐的表现之一，是可以预防的。








■ 4、暂时性牙齿不齐



- 
-
- 常见情况 上颌中切牙之间间隙
个别牙的错位

需要提早治疗 反颌（地包天）

5、多生牙




位置：大多数位于上中切牙之间




多生牙

healthteeth.net

21.07.2005





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/285233211133011240>