

1. 早产儿生理性黄疸血胆红素如果高于下列哪项数值，需要进行进一步检查以判断是否为病理性黄疸
()
- A. 340umol/L
B. 205.2umol/L
C. 256umol/L
D. 522umol/L
E. 119umol/L
正确答案：
C
2. 糖尿病最严重而突出的并发症是
- A. 心血管病变
B. 肾脏病变
C. 神经病变
D. 眼部病变
E. 糖尿病足
正确答案：
A
3. 患者男性，25 岁，双腿不慎被开水烫伤, 可考虑为其选用的保护具是
- A. 床档
B. 支架被
C. 肩部约束带
D. 髌部约束带
E. 踝部约束带
正确答案：
B
4. 孕妇产前检查时，护士测量腹围的部位，正确 的测量位置是
- A. 测量耻骨联合至剑突长度
B. 测量肋弓下缘平面绕腹周长
C. 测量髂前上嵴平面绕腹周长
D. 测量耻骨联合至宫底长度
E. 腹部最膨隆处绕腹周长
正确答案：
E
5. 开放性脑损伤的主要表现不包括
- A. 硬脑膜破裂
B. 头皮裂伤
C. 脑积水
D. 脑脊液漏
E. 颅骨骨折
正确答案：
C
6. 某三级甲等医院 icu，共有 10 张床位。按照国家卫生计生委对 ICU 护士与床位比的要求，该科室配备的护士人数应不少于

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

- A. 10 名
- B. 15 名
- C. 20 名
- D. 25 名
- E. 30 名

正确答案:

E

7. 患者，男性， 60 岁。诊断为慢性呼吸衰竭， 2 周前因感冒导致急性加重，经治疗后将于第 2 天出院，患者十分担心再次发病。该 患者有长期吸烟史，主管护士应对其进行的指 导包括

- A. 制订戒烟目标和戒烟计划
- B. 制订膳食方案，增进营养
- C. 尽量减少活动，防止劳苦
- D. 预防性服用抗生素
- E. 长期家庭氧疗方法

正确答案:

A

8. 患者行腰椎间盘突出症手术后，练习直腿抬高 运动目的是

- A. 镇痛、消肿
- B. 增加肌力
- C. 预防神经根粘连
- D. 预防感染
- E. 减轻肌痉挛

正确答案:

B

9. 护士为某患者发口服药时恰逢其外出，此时正确的做法是

- A. 等候患者
- B. 将药交给陪护
- C. 将药置于床头柜上
- D. 暂缓发药
- E. 交给患者同室病友

正确答案:

D

10. 尿路感染女性发病率高于男性，是因为女性尿道较男性尿道

- A. 短而宽
- B. 长而窄
- C. 扁而平
- D. 宽而长
- E. 短而窄

正确答案:

A

11. 患者，男性， 59 岁，工人。 1 年前无明显诱因浮现双腕、双手关节和双膝、踝、足、跖 趾关节肿痛，伴晨僵，时间约 12 分钟，疼痛以夜间明显，影响行动。实验室检查：血沉 55mm/h，RF(+) 。关节 X 线检查：双手骨质疏松，腕部关节间隙变窄。使用青霉素治疗 ， 护 士不用观察的不良反应是

- A. 关节肿胀

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

- B. 白细胞减少
- C. 有无皮疹、蛋白尿、血尿
- D. 肾功能异常
- E. 头痛

正确答案：

A

12. 特发性血小板减少性紫癜具有确诊意义的是：（）

- A. 血小板计数减少
- B. 可见巨大畸形血小板
- C. 出血时间延长
- D. 凝血酶原消耗不良
- E. 以上都不是

正确答案：

E

13. 急性呼吸衰竭患者缺氧的典型表现是

- A. 呼吸艰难
- B. 发绀
- C. 意识障碍
- D. 肺功能下降
- E. 球结膜水肿

正确答案：

B

14. 患者男， 50 岁。胃溃疡病史 20 余年，近 1 个月浮现腹部疼痛不似以前规律，无恶心、呕吐、体重下降现象。 入院检查大便隐血实验阳性， 考虑胃溃疡伴消化道出血。 下列生活指导正确的是

- A. 禁食
- B. 多饮肉汤
- C. 高蛋白高纤维饮食
- D. 温凉、清淡无刺激饮食
- E. 加强体育锻炼

正确答案：

D

15. 尿路感染女性发病率高于男性，是因为女性尿道较男性尿道

- A. 短而宽
- B. 长而窄
- C. 扁而平
- D. 宽而长
- E. 短而窄

正确答案：

A

16. 有机 磷中毒 时，代谢失常的神经递质是

- A. 多巴胺
- B. 乙酰胆碱
- C. 5-羟色胺
- D. 肾上腺素
- E. 去甲肾上腺素

17. 临终患者最后丧失的感觉是

- A. 视觉
- B. 嗅觉
- C. 味觉
- D. 听觉
- E. 触觉

正确答案:
D

18. 患者女， 39 岁，下肢静脉曲张数年，近日行硬化剂注射治疗，护士对其进行健康教育，正确的内容是

- A. 绷带加压期间不能行走
- B. 绷带加压包扎期间不能久站
- C. 坐时双膝可长久采取交叉位
- D. 绷带加压包扎一个月
- E. 可穿紧身衣裤

正确答案:
B

19. 某医院护理部要求各科室提交的工作计划根据医院的总体工作目标制定，护理工作的总目标，内容清晰明确，高低适当。这体现的是护理管理组织原则中的

- A. 管理层次的原则
- B. 集权分叉结合原则
- C. 任务和目标一致原则
- D. 登记和统一指挥的原则
- E. 专业化分工与协作原则

正确答案:
C

20. 患者， 30 岁。往往在晨起及晚间躺下时咳大量脓痰，伴少量鲜血，并且痰液放置后分三层，可能是()

- A. 慢性支气管炎
- B. 肺癌
- C. 肺结核
- D. 支气管扩张症
- E. 肺气肿

正确答案:
D

21. 患者，男性， 71 岁。身高 170cm，体重 80kg， 患高血压 20 年，为控制患者体重所采取的护理措施不包括

- A. 制订个体化膳食方案
- B. 检测体重变化
- C. 吃减肥药
- D. 规律运动
- E. 控制饮食

正确答案:

22. 通过增加外周组织对葡萄糖 摄取、抑制糖异生，从而降低血糖的药物是

- A. 格列波脲
- B. 格列本脲
- C. 二甲双胍
- D. 噻唑烷二酮
- E. α -葡萄糖苷酶抑制剂

正确答案：

C

23. 患者平卧抬高下肢，排空静脉血，在大腿根部扎止血带阻断大隐静脉，然后让患者站 立， 10 秒内放开止血带，若浮现自上而下的静脉逆向充盈，提示

- A. 交通静脉瓣膜功能异常
- B. 下肢深静脉通畅
- C. 小隐静脉瓣膜功能不全
- D. 大隐静脉瓣膜功能不全
- E. 下肢浅静脉通畅

正确答案：

D

24. 休克早期的临床表现是：（）

- A. 表情淡漠
- B. 发绀，四肢厥冷
- C. 血压下降，脉速
- D. 脉压小，尿量减少
- E. 抽血时血液粘稠易凝

正确答案：

D

25. 患儿男，生后 10 天。因口腔粘膜有异常来院就诊。 查体可见口腔粘膜有白色乳凝块样小点，汇集成小片，家长称不易拭去。目前患儿饮食正常，无全身症状。为该患儿进行口腔粘膜局部治疗应选用的是

- A. 2%利多卡因
- B. 3%过氧化氢溶液
- C. 10 万 U/ml 制霉菌素鱼肝油混悬溶液
- D. 2%碳酸氢钠溶液
- E. 2. 5%金霉素鱼肝油

正确答案：

C

26. 结肠造口患者出院后能够进食的蔬菜是

- A. 芹菜
- B. 韭菜
- C. 洋葱
- D. 辣椒
- E. 菜花

正确答案：

E

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

27. 患者，男性，30岁。全身水肿4周。实验室检查：血浆清蛋白22g/L，尿量800ml/d，尿蛋白5g/24h，尿红细胞（+）。患者水肿最主要的原因是

- A. 摄人盐分过多
- B. 抗利尿激素分泌过多
- C. 血管通透性下降
- D. 肾小球滤过率下降
- E. 血浆胶体渗透压下降

正确答案：

E

28. 患者男性，20岁，在海中游泳时不慎溺水，神志不清，呼吸微弱。被送到急诊室，医生不在场，护士正确的处理是

- A. 即将呼叫医生，等待医生到达即将开始呼救
- B. 即将头偏向一侧，清理口腔异物，行人工呼吸
- C. 即将进行心外按压，而且双人交替
- D. 即将心电监护，静脉补液
- E. 即将心外按压，除颤

正确答案：

B

29. 患者女，52岁。因慢性心力衰竭，长期低盐饮食及用利尿剂，洋地黄类药物治疗后，近日浮现疲惫，食欲减退，淡漠，嗜睡等，应首先考虑其发生了

- A. 左心衰竭加重
- B. 洋地黄类药物中毒
- C. 电解质紊乱
- D. 继发感染
- E. 消化不良

正确答案：

B

30. 患者，男性，65岁。3年前被诊断为“肺心病”，近日因感冒后呼吸艰难加重入院。护士对该患者所采取的氧疗方式正确的是

- A. 间歇高流量给氧
- B. 间歇低流量给氧
- C. 持续高流量给氧
- D. 持续低流量给氧
- E. 高压给氧

正确答案：

D

31. 患者男，56岁，肝硬化腹水，在放腹水的过程中蓦地浮现昏迷，首先采取的措施是

- A. 吸氧
- B. 头部降温
- C. 住手放腹水
- D. 补充血容量
- E. 保持呼吸道通畅

正确答案：

C

32. 患者女，19岁，主诉因“怕脏反复洗手，双手变得粗糙皴裂，明知没必要却无法控制”来就诊。最佳治疗方案是

- A. 药物治疗+心理治疗
- B. 抗精神病药物治疗
- C. 工娱治疗
- D. 电休克治疗
- E. 精神分析治疗

正确答案：

A

33. 患者男， 52 岁。肾癌行肾部份切除术后 2 天。护士告知患者要绝对卧床歇息，其主要目的是

- A. 防止出血
- B. 防止感染
- C. 防止肿瘤扩散
- D. 防止静脉血栓形成
- E. 有利于肾功能恢复

正确答案：

A

34. 初孕妇， 29 岁，孕 20 周行产前检查。检查时腹 部触及多个小肢体，考虑多胎妊娠。以下检查方法中最有助于明确诊断的是

- A. 腹部 B 超
- B. 胎心监护
- C. 腹部 X 线片
- D. 腹部 MIR 检查
- E. 腹部 CT

正确答案：

A

35. 患儿， 1 岁半，因腹泻 3 天，无尿 6 小时入院，目前经补液治疗后已排尿，护士遵医嘱 赋予继续补液 400ml，该液体中最多可加入 10%氯化钾

- A. 6ml
- B. 8ml
- C. 10ml
- D. 12ml
- E. 14ml

正确答案：

D

36. 妊娠合并心脏病患者，下列不正确的处理措施是

- A. 不宜妊娠者应在 12 周前行人工流产
- B. 孕 20 周后控制食盐
- C. 避免过劳和情绪激动
- D. 心功能 I ~ II 级者，应在妊娠 36~38 周入院待产
- E. 心功能III级或者以上者，应即将入院治疗

正确答案：

B

37. 患儿， 3 岁，患有先天性动脉导管未闭，反复发生肺部感染，浮现艾森曼格综合征，相对应的体征是（）

- A. 左心房肥大
 - B. 水冲脉
 - C. 肺动脉压力异常增高
 - D. 肺血流减少
 - E. 左心室肥大
- 正确答案：
C

38. 患者男， 75 岁，因“发热、反复咳嗽并伴有脓性痰液 2 周”入院，诊断为急性支气管炎。易加重病情的药物是

- A. 可待因
 - B. 必嗽平
 - C. 复方甘草合剂
 - D. 复方氯化铵
 - E. 沐舒坦
- 正确答案：
A

39. 纯母乳喂养多长期最好

- A. 2 个月
 - B. 4 个月
 - C. 6 个月
 - D. 9 个月
 - E. 12 个月
- 正确答案：
C

40. 患者女， 30 岁，下肢急性蜂窝织炎伴全身感染症状，需采血做抗生素敏感试验，最佳的采血时间应该是在患者

- A. 寒颤时
 - B. 高热时
 - C. 发热间歇期
 - D. 静脉滴注抗生素时
 - E. 抗生素使用后
- 正确答案：
A

41. 产妇， 28 岁。产后 2 个月，母乳喂养，产妇要 求对避孕方式进行指导，最适宜的避孕方法是

- A. 长效口服避孕药
 - B. 短效口服避孕药
 - C. 安全期避孕
 - D. 避孕套
 - E. 探亲避孕药
- 正确答案：
D

42. 患者女， 25 岁。产后 1 周浮现会阴侧切伤口感染，细菌培养结果为金黄色葡萄球菌感染。该细菌最有可能对下列哪种抗生素存在耐药性()。

- A. 头孢菌素
- B. 红霉素

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

C. 甲硝唑

D. 青霉素

E. 两性霉素 B

正确答案：

D

43. 患者男性， 45 岁。诊断为破伤风。护理患者后的敷料处理正确的是

A. 焚烧法

B. 熏蒸法

C. 紫外消毒

D. 高压蒸汽灭菌

E. 电离辐射灭菌法

正确答案：

A

44. 患儿，女， 5 岁。因高热、腹泻、进行性呼吸困 难入院，考虑为中毒性细菌性痢疾。护士在为患 儿 留取粪便标本时应注意

A. 在抗菌治疗后采集标本

B. 选择有黏液脓血部份的粪便送检

C. 留取部份成形粪便送检

D. 可多次采集标本，集中送检

E. 患儿无大便时，用导泻剂后留取标本

正确答案：

B

45. 患者男， 23 岁。直肠肛管周围脓肿切开引流术后 3 天，在饮食指导中错误的是

A. 多喝水

B. 均衡饮食

C. 少吃水果蔬菜

D. 避免辛辣食物

E. 避免油炸食物

正确答案：

C

46. 慢性型特发性血小板减少性紫癜不宜输血小板悬液的原因是为了避免：（）

A. 产生同种抗血小板抗体

B. 产生异种抗血小板抗体

C. 抑制血小板生成

D. 致肺栓塞症状

E. 产生溶血现象

正确答案：

A

47. 患儿男， 10 个月，今晨家长发现其眼眶周围密集针尖大小的出血点，经实验室检查诊断为特发性（急性型）血小板减少性紫癜，为及早识别颅内出血的发生，应重点监测患儿的

A. 骨髓象巨核细胞比例

B. 血小板计数

C. 红细胞计数

D. 白细胞计数

E. 血红蛋白含量

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

正确答案：
B

48. 某患者因胃癌行胃大部切除术，术后第一天除生命体征外，护士最需要重点观察的是

- A. 神志
- B. 伤口敷料
- C. 肠鸣音
- D. 腹胀
- E. 胃管引流液

正确答案：
E

49. 肝硬化合并腹水患者腹腔穿刺时，每次放腹水在

- A. 1000 ~2000ml
- B. 2000 ~4000ml
- C. 3000~5000ml
- D. 4000~6000ml
- E. 5000 ~6000ml

正确答案：
D

50. 患儿女， 1.5 岁。疱疹性口腔炎。护士在口腔涂药后应协助患儿闭口

- A. 5 分钟
- B. 10 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟
- E. 25 分钟

正确答案：
B

51. 患者，男， 56 岁。入院行经腹腔镜胆囊切除术，术前 1 天护士应及时告知医生考虑更改手术时间的情况是()

- A. 血压 110/70mmHg
- B. 脉率 70 次/分
- C. 体温 38.9℃
- D. 白细胞 60×10⁹/L
- E.呼吸 20 次/分

正确答案：
C

52. 患者男， 48 岁。因患 胰腺癌 入院拟行手术治疗，现空腹血糖 7.8mmol/L 。术前赋予注射 胰岛素 ，其作用是

- A. 促进蛋白质合成
- B. 利于吻合口愈合
- C. 抑制胰腺分泌
- D. 抑制 胰酶 活性
- E. 控制血糖

正确答案：
E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/285301143130012033>