

2025-2026.....

识与技能练习试题附有答案详解

单选题（共 20 题）

1. 用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等“双硫仑样反应”的药品是

用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等“双硫仑样反应”的药品是

- A. 青霉素钾?
- B. 克林霉素?
- C. 庆大霉素?
- D. 替硝唑?
- E. 依替米星?

【答案】 D

2. （2016 年真题）药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是（ ）。

(2016年真题) 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()。

- A. 西地碘片
- B. 乳酶生片
- C. 双歧三联活菌胶囊
- D. 硫普罗宁片
- E. 托烷司琼注射液

【答案】 C

3. 患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温 39.1°C ，血压 $138/80\text{mmHg}$ ，心率102次/分，呼吸32次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细胞百分比85%。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温 39.1°C ，血压 $138/80\text{mmHg}$ ，心率102次/分，呼吸32次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/\text{L}$ ，中性粒细

胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A. 肺炎链球菌
- B. 支原体
- C. 衣原体
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 流感嗜血杆菌

【答案】 D

4. 不应剧烈震动、开启前应充分降温的是

不应剧烈震动、开启前应充分降温的是

- A. 乙醚
- B. 甘露醇注射剂
- C. 重组人促红素
- D. 降钙鼻喷雾剂
- E. 乙型肝炎免疫球蛋白

【答案】 A

5. 使用硫酸亚铁片治疗缺铁性贫血，元素铁的治疗量是

使用硫酸亚铁片治疗缺铁性贫血，元素铁的治疗量是

A. 60mg qd

B. 60mg bid

C. 60mg tid

D. 100mg/次

E. 180mg/次

【答案】 C

6. 患者，男，32岁。急性铅中毒，应用硫酸镁导泻，适宜的给药途径是

患者，男，32岁。急性铅中毒，应用硫酸镁导泻，适宜的给药途径是

A. 口服给药

B. 吸入给药

C. 静脉注射

D. 直肠给药

E. 皮下注射

【答案】 A

7. 患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白(HbA)9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片0.5g tid 格列美脲片2mg tid po,罗格列酮片2mg bid po,甲钴胺片0.5mg tid po,羟苯磺酸钙胶囊250mg bid po

患者,女,71岁,2型糖尿病史10年。化验结果糖化血红蛋白(HbA)9.2%,空腹血糖10.5mmol/L,餐后血糖15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片0.5g tid 格列美脲片2mg tid po,罗格列酮片2mg bid po,甲钴胺片0.5mg tid po,羟苯磺酸钙胶囊250mg bid po

A. 门冬胰岛素餐前30~60min,皮下注射,tid

B. 甘精胰岛素睡前30min,皮下注射,qd

C. 普通胰岛素餐前30min,皮下注射,qd

D. 低精蛋白锌胰岛素餐前30min,皮下注射

E. 精蛋白锌胰岛素餐前 30min, 皮下注射, tid

【答案】 B

8. 有强烈的血管收缩作用，输液过程中不慎渗出血管，可致组织坏死的药物是

有强烈的血管收缩作用，输液过程中不慎渗出血管，可致组织坏死的药物是

A. 多巴胺

B. 去乙酰毛花苷

C. 维拉帕米

D. 米力农

E. 洋地黄毒苷

【答案】 A

9. 患者，男，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

患者，男，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A. 阿司匹林
- B. 布洛芬
- C. 抗菌药物
- D. 糖皮质激素
- E. 阿替普酶

【答案】 D

10. (2018年真题) 干眼症可选用 ()

(2018年真题) 干眼症可选用 ()

- A. 色甘酸钠滴眼液
- B. 七叶洋地黄双苷滴眼液
- C. 玻璃酸钠滴眼液
- D. 氧氟沙星滴眼液
- E. 碘苷滴眼液

【答案】 C

11. 患者男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

患者男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 下肢动脉栓塞
- C. 肺动脉栓塞
- D. 病理性骨折
- E. 脉管炎

【答案】 A

12. 患者，女，30岁。患先兆子痫，以硫酸镁治疗，适宜的给药途径是

患者，女，30岁。患先兆子痫，以硫酸镁治疗，适宜的给药途径是

- A. 口服给药

B. 吸入给药

C. 静脉注射

D. 直肠给药

E. 皮下注射

【答案】 C

13. 适用于早期、轻度症状者

适用于早期、轻度症状者

A. 苯海索

B. 左旋多巴

C. 司来吉兰

D. 恩托卡朋

E. 拉莫三嗪

【答案】 C

14. 可用于治疗沙眼的处方药是

可用于治疗沙眼的处方药是

A. 磺胺醋酰钠

B. 硫酸锌

C. 酞丁安滴眼剂

D. 红霉素眼膏

E. 米诺环素

【答案】 A

15. 提示“噻托溴铵粉吸入剂所附胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，不能直接吞服”，是针对

提示“噻托溴铵粉吸入剂所附胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，不能直接吞服”，是针对

A. 药品贮存

B. 药品有效期

C. 特殊剂型用法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/285333004032012034>