

2024 年 5 月份 120 急救中心业务学习试题

脑卒中的识别与院前急救

1. 心搏骤停的首选复苏药物为：（） [单选题] *

- A. 去甲肾上腺素
- B. 肾上腺素 (正确答案)
- C. 阿托品
- D. 利多卡因

2. 选择除颤能量，双相波用 150J，若仍未转复，能量增加至（） [单选题] *

- A. 200J (正确答案)
- B. 250J
- C. 300J
- D. 350J

3. 患者肌力能作拮抗阻力动作，但肌力有不同程度减弱，此时患者的肌力为几级
（） [单选题] *

- A. 5 级
- B. 2 级
- C. 4 级 (正确答案)
- D. 3 级

4. 肢体因肌力下降而出现的运动障碍称为（） [单选题] *

A. 单瘫

B. 偏瘫

C. 瘫痪 (正确答案)

D. 截瘫

5.小脑病变不会出现下列哪种情况 () 单选题]*

A. 呼吸衰竭 (正确答案)

B. 动作不稳

C. 闭目难立

D. 共济失调

6.口唇、甲床呈樱桃红色提示 () 单选题]*

A. 缺氧

B. 休克

C. 有机磷农药中毒

D. 一氧化碳中毒 (正确答案)

7.脑出血中最常见的出血部位是 () 单选题]*

A. 脑干出血

B. 丘脑出血

C. 脑壳出血 (正确答案)

D. 小脑出血

8.皮内注射时用于皮肤的消毒液为 () 单选题]*

A. 75% 酒精 (正确答案)

B. 95% 酒精

C. 50% 酒精

D. 碘伏

9.异常脉搏应测量（） 单选题]*

A. 30 秒

B. 15 秒

C. 1 分钟 (正确答案)

D. 2 分钟

10.下列哪项不属于 GCS 评分的主要内容（） 单选题]*

A. 睁眼反应

B. 脑干反射 (正确答案)

C. 运动反应

D. 语言反应

11.电除颤准备时间不能超过（） 单选题]*

A. 15 秒

B. 20 秒

C. 25 秒

D. 30 秒 (正确答案)

12.当血压低于（）时，可诊断为低血压。 单选题]*

A. 80/50

B. 90/50

C. 90/60(正确答案)

D. 85/50

13.静脉穿刺扎止血带部位是（） 单选题]*

A. 穿刺点上方 5-6cm

B. 穿刺点上方 6-8cm(正确答案)

C. 穿刺点上方 7-8cm

D. 穿刺点上方 6-7cm

14.行臀大肌注射时，应避免损伤（） 单选题]*

A. 臀部动脉

B. 臀部静脉

C. 坐骨神经(正确答案)

D. 臀部淋巴管

15.皮下注射进针的深度为针梗的（） 单选题]*

A. 1/2-2/3(正确答案)

B. 1/4-1/3

C. 1/5-1/4

D. 1/2-3/5

16.无菌容器打开后，应记录开启的日期、时间，其有效时间不超过（） 单选题]*

A. 4 小时

B. 12 小时

C. 24 小时(正确答案)

D. 8 小时

17.使用约束带时，应该保持肢体处于（） 单选题]*

- A. 患者喜欢的位置
- B. 患者舒适的位置
- C. 接受治疗的强迫位置
- D. 功能位置 (正确答案)

18.下列哪个因素是脑卒中发病的首位伴发危险因素（） 单选题]*

- A. 高胆固醇
- B. 高血压 (正确答案)
- C. 高密度脂蛋白偏低
- D. 糖尿病

19.洗手时应认真揉搓双手至少（） 单选题]*

- A. 10 秒
- B. 1 分钟
- C. 30 秒
- D. 15 秒 (正确答案)

20.对急性尿潴留、膀胱高度膨胀的患者，一般先放尿（） 单选题]*

- A. 300ml
- B. 500ml
- C. 600ml
- D. 1000ml (正确答案)

21.以下哪项不属于物理降温的方法（） 单选题]*

- A. 温水擦浴
- B. 酒精擦浴
- C. 退热栓塞肛门(正确答案)
- D. 冰敷

22.电动吸引器连续使用时间不宜太久，贮液瓶内液体达（）时，应及时倾倒。 单选题]*

- A. 1/3
- B. 2/3(正确答案)
- C. 1/2
- D. 3/4

23.病人用氧后，缺氧症状无改善、呼吸困难加重，你首先应取（） 单选题]*

- A. 马上通知医生处理
- B. 调节氧流量，加大吸氧量
- C. 注射呼吸兴奋剂
- D. 检查吸氧装置及病人鼻腔(正确答案)

24.心肺复苏时，人工呼吸的频率，每（）1次呼吸，按压与呼吸的比为（ B） 单选题]*

- A. 4-5秒， 15:2
- B. 5-6秒， 30:2(正确答案)
- C. 5-6秒， 15:2
- D. 7-8秒， 30:2

25.成人心肺复苏时胸外按压的深度为（）。 单选题]*

- A. 4~5cm
- B. 大于 5cm
- C. 5~6cm (正确答案)
- D. 越深越好

26.氧气筒内氧气不能用尽，一般需留 5kg / cm，其目的是（） 单选题]*

- A. 便于再次充气
- B. 防充气时引起爆炸 (正确答案)
- C. 便于检查氧气装置有无漏气
- D. 便于调节氧流量

27.以下不是尿失禁的诱因（） 单选题]*

- A. 咳嗽、喷嚏
- B. 大笑
- C. 提举重物
- D. 说话 (正确答案)

28.空腹静脉血糖正常值（） 单选题]*

- A. 2.9—6.0mmol/L
- B. 3.8—6.1mmol/L (正确答案)
- C. 3.0—5.9mmol/L
- D. 4.9—7.0mmol/L

29.腹痛，但诊断不明确的患者，要遵循“四禁”，选项中错误的是（） 单选题]*

- A. 禁饮食
- B. 禁灌肠
- C. 禁泻药
- D. 禁活动 (正确答案)

30.股静脉的位置是（） 单选题]*

- A. 位于股神经内侧 0.5cm 处
- B. 位于股动脉内侧 0.5cm 处 (正确答案)
- C. 位于股动脉外侧 0.5cm 处
- D. 位于股神经外侧 0.5cm 处

31.腹痛伴呕吐时，呕吐物呈喷射状并大量鲜血提示（） 单选题]*

- A. 胃部病变
- B. 胰腺疾病
- C. 食管下段胃底静脉曲张破裂 (正确答案)
- D. 肠道梗阻

32.大咯血患者发生窒息时的处理，错误的是（） 单选题]*

- A. 清理呼吸道，保持气道通畅
- B. 立即给予高流量氧气吸入
- C. 建立静脉通道并保持通畅
- D. 监测生命体征，适量下床活动 (正确答案)

33.意识障碍患者瞳孔检查的内容不包括（） 单选题]*

- A. 瞳孔直径

B. 反射

C. 灵敏

D. 颜色 (正确答案)

34.危重病人呼吸微弱，测量呼吸时一般情况下应测量（） 单选题]*

A. 20 秒

B. 1 分钟 (正确答案)

C. 30 秒

D. 10 秒

35.当血压低于（）时，可诊断为低血压。 单选题]*

A. 80/50

B. 90/50

C. 90/60 (正确答案)

D. 85/50

36.电除颤清洁皮肤要使用（） 单选题]*

A. 清水 (正确答案)

B. 70% 酒精

C. 碘酊

D. D. 95% 酒精

37.皮内注射时进针角度与皮肤呈（） 单选题]*

A. $5^{\circ}\sim 15^{\circ}$ (正确答案)

B. $20^{\circ}\sim 25^{\circ}$

C. 30°~40°

D. 40°~50°

38.既往有脑血管病史的患者，其血压应控制在多少以下？（） 单选题]*

A. 120/80mmHg

B. 150/85mmHg

C. 140/90mmHg (正确答案)

D. 120/90mmHg

39.疑有颈、腰椎骨折的病人使用的搬运法是（） 单选题]*

A. 搀扶

B. 四人搬运法 (正确答案)

C. 担架

D. 三人平托法

40.监测血糖时，应选用（）消毒。 单选题]*

A. 0.9%盐水

B. 蒸馏水

C. C.碘伏

D. D. 75% 酒精 (正确答案)

41.吸氧时，应将鼻导管插入病人鼻孔（） 单选题]*

A. 3cm

B. 0.5cm

C. 2cm

D. 1cm (正确答案)

42.每次吸痰时间不宜超过 15 秒的最主要原因是 () [单选题] *

- A. 减少患者痛苦
- B. 减轻气管黏膜受损
- C. 防止患者缺氧 (正确答案)
- D. 避免痰液阻塞导管

43.心肺复苏时，按压和人工呼吸的频率为 () [单选题] *

- A. 60-100次/分， 16-18次/分
- B. 60-100次/分， 16-18次/分
- C. 60-100次/分， 16-18次/分
- D. 100-120次/分， 10-12次/分 (正确答案)

44.心肺复苏的顺序是 () [单选题] *

- A. A —B→C
- B. B→A→C
- C. C→A→B (正确答案)
- D. 以上都对

45.用氧安全要切实做好“四防”() [单选题] *

- A. 防震、防火、防热、防水
- B. 防尘、防火、防热、防水
- C. 防震、防火、防热、防油 (正确答案)
- D. 防震、防暴、防热、防水

46.尿失禁的诱因包括（） 单选题]*

- A. 咳嗽
- B. 喷嚏、大笑
- C. 提举重物
- D. 以上都是 (正确答案)

47.为婴儿进行静脉注射时，最常用的静脉是（） 单选题]*

- A. 大隐静脉
- B. 肘正中静脉
- C. 头皮静脉 (正确答案)
- D. 贵要静脉

48.建议在吸痰前的（），向儿童和成人提供 100% 的氧。 单选题]*

- A. 2 分钟
- B. 30-60秒 (正确答案)
- C. 1 小时
- D. 半小时

49.心肺复苏时主张早期电除颤，除颤后判断除颤效果的时机为（） 单选题]*

- A. 除颤完毕立即进行判断
- B. 除颤无效，立即再次除颤
- C. 勿须判断，避免按压中断
- D. 除颤完毕后立即行 5 个循环胸外按压，再进行判断 (正确答案)

50.糖尿病患者血糖低于（），即可诊断为低血糖 单选题]*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286005144031011003>