

2023-24 年黑龙江省甘南县《执业药师之西药学专业二》考试题库 A4 版打印

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 有关纤维蛋白溶解药的叙述，错误的是
- A: 该药也称为血栓溶解药
 - B: 主要代表药有链激酶、尿激酶
 - C: 能使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶
 - D: 主要不良反应为凝血障碍

答案：D

2. 黏液性水肿选用
- A: 甲状腺素
 - B: 血管神经性水肿
 - C: 粒细胞下降
 - D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

3. 作用于前列腺平滑肌，减轻膀胱出口梗阻的是()
- A: 坦洛新
 - B: 西地那非
 - C: 吲达帕胺
 - D: 普适泰

答案：A

4. 属于抗雄激素类，首选用于晚期前列腺癌的药物是

- A: 甲羟孕酮
- B: 他莫昔芬
- C: 乙烯雌酚
- D: 氟他胺

答案：D

5. 以下不属于强心苷的禁忌症的选项是

- A: 梗阻性肥厚型心脏病
- B: 室性心动过速、心室颤动
- C: 慢性收缩性心力衰竭
- D: 预激综合征伴心房颤动或扑动

答案：C

6. 兼有镇静、催眠、抗惊厥和抗癫痫作用的药物是

- A: 苯巴比妥
- B: 卡马西平
- C: 苯妥英钠
- D: 佐匹克隆

答案：A

7. (2018 年真题) 在体内不经细胞色素 P450 酶代谢的药物是 ()

- A: 普伐他汀
- B: 阿托伐他汀
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 氟伐他汀

答案：A

8. (2018 年真题) 不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是 ()

- A: 伏立康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 卡泊芬净
- D: 氟康唑

答案：D

9. 对抗香豆素类过量引起出血可选用

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素
- C: 垂体后叶素
- D: 维生素 K

答案：D

10. (2019 年真题) 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是 ()

- A: 庆大霉素
- B: 呋喃妥因
- C: 苄星青霉素
- D: 甲硝唑

答案：D

11. 维生素 A 缺乏时可患

- A: 夜盲症
- B: 糙皮病
- C: 成人佝偻病
- D: 脚气病

答案：A

12. 蛇毒血凝酶的给药方式不包括

- A: 静脉注射
- B: 皮下注射
- C: 皮内注射
- D: 肌肉注射

答案：C

13. 甲氨蝶呤主要用于()

- A: 室管膜瘤
- B: 髓母细胞瘤
- C: 慢性粒细胞性白血病
- D: 儿童急性白血病

答案：D

14. (2021 年真题) 用于治疗湿性视网膜黄斑变性的药物是 ()

- A: 雷珠单抗注射液
- B: 硫酸阿托品眼用凝胶
- C: 毛果芸香碱滴眼液
- D: 聚乙二醇滴眼液

答案：A

15. 丙烯胺类抗真菌药()

- A: 特比萘芬
- B: 氟康唑
- C: 阿莫罗芬
- D: 两性霉素

答案：A

16. 关于替加环素的使用，错误的是

- A: 8 岁以下儿童禁用替加环素
- B: 替加环素是 P—gp 的底物
- C: 肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整
- D: 替加环素抑制 CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6 和 3A4 介导的药物代谢

答案：D

17. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂

- A: 克霉唑
- B: 灰黄霉素
- C: 咪康唑
- D: 环丙沙星

答案：D

18. 急性广泛性肺栓塞宜选用()

- A: 叶酸
- B: 尿激酶
- C: 肝素
- D: 维生素 K

答案：B

19. 长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充

- A: 维生素 A 和维生素 D
- B: 维生素 C 和烟酸
- C: 维生素 E 和叶酸
- D: 复合维生素 B 和维生素 K

答案：D

20. 与甘露醇相比，甘油果糖具有的特点不包括

- A: 起效更快，维持作用时间较长
- B: 对患者电解质的平衡无明显影响
- C: 可为患者提供一定的能量
- D: 利尿作用小

答案：A

21. 强心苷中毒引起的室性心律失常首选

- A: 利多卡因
- B: 普萘洛尔
- C: 苯妥英钠
- D: 胺碘酮

答案：C

22. 与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

- A: 氯化钾
- B: 枸橼酸钾
- C: 氯化钠
- D: 氯化钙

答案：A

23. 蛋白结合率较高（>70%）的头孢菌素类是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢曲松
- D: 头孢吡肟

答案：C

24. 可用肝病的氨基酸制剂是

- A: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（6AA）
- B: 复方氨基酸注射液（9AA）、赖氨酸注射液
- C: 复方氨基酸注射液（6AA）、复方氨基酸注射液（9AA）
- D: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（9AA）

答案：A

25. 袢利尿药主要作用于髓袢升支粗段，利尿作用强，其代表药物是()

- A: 呋塞米
- B: 依他尼酸
- C: 托拉塞米
- D: 布美他尼

答案：A

26. 弥散性血管内凝血早期可选用()

- A: 叶酸
- B: 尿激酶
- C: 肝素
- D: 维生素 K

答案：C

27. （2020 年真题）属于第一代抗精神病药物的是

- A: 氯丙嗪
- B: 利培酮
- C: 奥氮平
- D: 氯氮平

答案：A

28. 适用于合并有肾功能损害的高血压患者的药物是

- A: 维拉帕米
- B: 多巴酚丁胺
- C: 氯沙坦
- D: 卡维地洛

答案：C

29. 下述不属于扩瞳药不良反应的是()

- A: 接触性眼睑皮肤炎
- B: 结膜炎
- C: 眼压降低
- D: 一过性针刺感

答案：C

30. 硝酸甘油的药理作用不包括

- A: 增加心率
- B: 增加心室壁张力
- C: 扩张容量血管
- D: 减少回心血量

答案：B

31. 布地奈德的作用特点是

- A: 适用于轻度持续型（2级以上）哮喘的长期治疗
- B: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效
- C: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿
- D: 10 $\mu\text{g/ml}$ 为有效治疗浓度，15-20 $\mu\text{g/ml}$ 以上会出现毒性反应

答案：A

32. 临床常用于治疗结核病的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 两性霉素 B
- C: 甲硝唑
- D: 链霉素

答案：D

33. 患者，男，55 岁。1 小时前因右侧腰背部剧烈疼痛。难以忍受，出冷汗，服颠茄片不见好转，来院急诊。尿常规检查：可见红细胞。B 型超声波检查：肾结石。

- A: 镇痛和解痉作用
- B: 防止成瘾
- C: 增加解痉作用
- D: 增加镇痛作用

答案：A

34. (2021 年真题) 属于细胞血凝素抑制剂的抗流感病毒药物是 ()

- A: 博洛昔韦
- B: 阿比多尔
- C: 法匹拉韦
- D: 奥司他韦

答案：B

35. 与避孕药同时服用，不会导致避孕失败的药物是

- A: 四环素
- B: 苯巴比妥
- C: 利福平

D: 环孢素

答案：D

36. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是

A: 噻嘧啶

B: 哌嗪

C: 氯喹

D: 青蒿素

答案：B

37. 常作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌作用的药物是()

A: 氨基糖

B: 美罗培南

C: 他唑巴坦

D: 克拉维酸

答案：A

38. 长期大量使用可导致肝功能异常

A: 氯霉素

B: 利巴韦林

C: 更昔洛韦

D: 四环素可的松

答案：B

39. 属于 DPP-4 抑制剂的药物是

A: 那格列奈

B: 伏格列波糖

C: 阿格列汀

D: 利拉鲁肽

答案: C

40. 属于维生素 K 类抗出血药的是

A: 甲萘氢醌

B: 氨甲环酸

C: 酚磺乙胺

D: 艾曲泊帕乙醇胺

答案: A

41. (2020 年真题) 主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

A: 塞来昔布

B: 阿司匹林

C: 吲哚美辛

D: 对乙酰氨基酚

答案: D

42. 可与强心苷类药物发生相互作用的是

A: 呋塞米

B: 伐地那非

C: 坎利酮

D: 丙酸睾酮

答案: A

43. 属于抗雌激素类的是

A: 他莫昔芬

- B: 睾酮
- C: 己烯雌酚
- D: 甲地孕酮

答案: A

44. 长期服用广谱抗生素，导致出血倾向选用

- A: 氨甲环酸
- B: 低分子肝素
- C: 维生素 K
- D: 尿激酶

答案: C

45. 代谢后产生丙烯醛，引起膀胱毒性

- A: 卡莫司汀
- B: 环磷酰胺
- C: 巯嘌呤
- D: 氟尿嘧啶

答案: B

46. 细胞膜的重要组分，协调磷脂和细胞膜功能的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 异甘草酸镁
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 双环醇

答案: A

47. 用药后可使尿液呈橘红色的药物是

- A: 利福平

B: 乙胺丁醇

C: 链霉素

D: 异烟肼

答案：A

48. 可增加心脏毒性的药物是

A: 利福平

B: β 受体阻断剂

C: 甲氨蝶呤

D: 阿糖胞苷

答案：B

49. 促进房水流出和减少房水生成的是

A: 前列腺素衍生物

B: 碳酸酐酶抑制剂

C: 拟胆碱药

D: α_2 受体激动剂

答案：D

50. 有关痤疮治疗用药注意事项，描述不正确的是()

A: 过氧苯甲酰凝胶合用维 A 酸乳膏可加强疗效

B: 维 A 酸的用药部位要避免强烈的日光照射，宜在晚间睡前应用

C: 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用在同一时间、同一部位有物理性配伍禁忌

D: 对林可霉素磷酸酯凝胶过敏者禁用

答案：A

51. 关于普萘洛尔抗心律失常作用的描述，错误的是

- A: 延长房室结的功能性不应期
- B: 减慢心房和房室结的传导
- C: 阻滞 β 肾上腺素能受体
- D: 增强交感神经效应

答案：D

52. 患者,男,30 岁有长期便秘病史,因胃痛就医,诊断为胃溃疡,该患者治疗胃溃疡应避免使用的药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 雷贝拉唑
- C: 西咪替丁
- D: 氢氧化铝

答案：D

53. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是 ()。

- A: 依那普利
- B: 哌唑嗪
- C: 坦洛新(坦索罗辛)
- D: 替米沙坦

答案：D

54. 妨碍铁剂在肠道吸收的物质是 ()

- A: 维生素 C
- B: 食物中的高磷、鞣酸等
- C: 枸橼酸钠
- D: 食物中的半胱氨酸

答案：B

55. 患者，男，57 岁，肾功能正常，既往有动脉粥样硬化、高血压合并 2 型糖尿病，用下列药物后出现踝关节肿胀，到药房咨询，药师提示有可能引起该不良反应的药物是

- A: 赖诺普利片
- B: 阿司匹林肠溶片
- C: 格列吡嗪肠溶片
- D: 硝苯地平缓释片

答案：D

56. 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

- A: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素
- B: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇
- C: 异烟肼、利福平、莫西沙星
- D: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸

答案：B

57. （2019 年真题）伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是（）

- A: 长效 β_2 受体激动剂
- B: M 胆碱受体阻断剂
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

58. 用 1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

- A: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流
- B: 收缩血管，降低其通透性
- C: 收缩血管，减轻炎症反应
- D: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌

答案：A

59. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是()

- A: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵
- B: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫
- C: 克罗米通具有局部麻醉作用
- D: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用

答案：A

60. 下列药物中，与雌二醇无相互作用的是

- A: 卡马西平
- B: 苯巴比妥
- C: 氢化可的松
- D: 利福平

答案：C

61. 大剂量使用维生素 K

- A: 氨甲苯酸
- B: 双香豆素
- C: 维生素
- D: 肝素

答案：D

62. (2021 年真题) 通过直接抑制凝血因子 Xa 而发挥作用的抗凝血药物()

- A: 依诺肝素
- B: 华法林
- C: 利伐沙班

D: 氯吡格雷

答案: C

63. 减鼻充血药所致的典型不良反应是()。

A: 共济失调

B: 血管舒张

C: 血压升高

D: 心率减慢

答案: C

64. 与林可霉素类抗菌药物存在交叉耐药性的是

A: 头孢菌素类

B: 四环素类

C: 大环内酯类

D: 氨基糖苷类

答案: C

65. (2020 年真题) 长期使用可引起维生素 K 缺乏的药物是

A: 头孢哌酮

B: 二甲双胍

C: 华法林

D: 阿司匹林

答案: A

66. 索他洛尔最严重的不良反应是

A: 尖端扭转型室速

B: 心动过缓

C: 头晕

D: 呼吸困难

答案：A

67. 长期大剂量服用可产生欣快感，可能出现药物依赖性的具有阿片样作用的止泻药是

A: 硫酸镁

B: 地芬诺酯

C: 蒙脱石散

D: 洛哌丁胺

答案：B

68. 下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

A: 糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素

B: 丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素

C: 氟轻松是强效外用糖皮质激素

D: 醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素

答案：A

69. 洛伐他汀的作用是()

A: 影响脂蛋白合成、转运及分解

B: 主要影响甘油三酯合成

C: 主要影响胆固醇合成

D: 主要影响胆固醇吸收

答案：C

70. 立克次体感染首选

A: 氯霉素

B: 四环素

C: 多黏菌素

D: 头孢菌素

答案: B

71. 小剂量孕激素用于

A: 回奶

B: 绝经期综合征

C: 再生障碍性贫血

D: 痛经

答案: D

72. 血浆半衰期较长的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂的是

A: 甲睾酮

B: 丙酸睾酮

C: 他达拉非

D: 西地那非

答案: C

73. 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是()。

A: 磷霉素

B: 舒巴坦

C: 替考拉宁

D: 利福平

答案: D

74. (2021 年真题) 渗透性强, 可透过甲板, 属于吡啶酮类的抗真菌药物是 ()

- A: 克霉唑
- B: 环吡酮胺
- C: 米卡芬净
- D: 特比萘芬

答案：B

75. 抑制胸腺核苷酸合成酶

- A: 羟基脲
- B: 氟尿嘧啶
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿糖胞苷

答案：B

76. 下列药物中，与蛋白同化激素无相互作用的药物是

- A: 环孢素
- B: 华法林
- C: 青霉素
- D: 他克莫司

答案：C

77. （2015 年真题）患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是（）。

- A: 硝苯地平
- B: 格列齐特
- C: 雷尼替丁
- D: 双氯芬酸

答案：D

78. 口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

- A: 昔多福韦
- B: 喷昔洛韦
- C: 泛昔洛韦
- D: 伐昔洛韦

答案: D

79. 对 G

- A: 第二代头孢菌素
- B: 第三代头孢菌素
- C: 第一代头孢菌素
- D: 第四代头孢菌素

答案: B

80. 青霉素在体内的主要消除方式是

- A: 被血浆酶破坏
- B: 肾小管分泌排泄
- C: 肾小球滤过
- D: 肝脏代谢

答案: B

81. 双香豆素与苯巴比妥合用可

- A: 竞争性对抗
- B: 产生协同作用
- C: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- D: 与其竞争结合血浆蛋白

答案: C

82. (2018 年真题) 患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

- A: 西咪替丁诱导 CYP2C9，升高胺碘酮血浆药物浓度
- B: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2C19，减慢胺碘酮的代谢
- C: 西咪替丁抑制 CYP3A4，升高胺碘酮血浆药物浓度
- D: 西咪替丁抑制 CYP1A2，升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：C

83. 患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2.5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

- A: 新生儿肾功能未发育完全，不宜使用头孢曲松
- B: 新生儿肝功能未发育完全，不宜使用头孢曲松
- C: 新生儿出现明显皮肤黄染时，不宜使用头孢曲松
- D: 新生儿对头孢曲松不敏感

答案：C

84. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 3 周
- B: 4 周
- C: 1 周
- D: 2 周

答案：D

85. 主要用于复发转移乳腺癌、乳腺癌术后转移的辅助治疗和子宫内膜癌的治疗的药物是

- A: 依西美坦
- B: 来曲唑
- C: 他莫昔芬
- D: 氟维司群

答案：C

86. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 替米沙坦
- B: 埃索美拉唑钠
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 美托洛尔

答案：C

87. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

- A: 呋塞米
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 丙磺舒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/286043240104011030>