
[医学类试卷]儿科主治医师基础知识模拟试卷 7

1 青春期生长发育的最大特点是

- (A) 体格发育稳步增长
- (B) 智力发育速度加快
- (C) 内分泌调节功能稳定
- (D) 生殖系统迅速发育
- (E) 性格品质成熟

2 院前现场急救时，判断患儿心跳的最正确方法是

- (A) 触摸桡动脉搏动
- (B) 触摸足背动脉
- (C) 触摸颈动脉搏动
- (D) 观察有无自主呼吸
- (E) 观察瞳孔是否散大

3 1 岁婴儿，2 个月前多汗、惊厥，出牙 3 颗就诊。查体前囟 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ ，方颅、串珠肋，血钙 $2\text{mmol} / \text{L}$ ($8\text{mg} / (11)$)，钙磷乘积 28，注射维生素 D30 万 U，口服钙剂治疗 1 个月后睡眠安静，出汗减少，出牙 5 颗。继续采用何种治疗方案最合理

- (A) 继续使用钙剂

(B) 停用维生素 D 及钙剂

(C) 再给 1 ~ 2 次维生素 D , 肌注并口服钙

(D) 每日给维生素 D 5000U 口服 , 同时给钙

(E) 每日给维生素 D 400U 口服 , 同时给钙

4 维生素 D 缺乏性手足搐搦症多见于

(A) 1 岁以上小儿

(B) 6 个月以下婴幼儿

(C) 新生儿

(D) 6 个月以上婴儿

(E) 以上都不是

5 关于上部量 , 正确的是

(A) 从头顶到耻骨联合上缘

(B) 从头顶到耻骨联合下缘

(C) 从头顶到坐骨结节

(D) 6 岁时上部量与下部量相等

(E) 12 岁时上部量小于下部量

6 对迁延性和慢性腹泻的治疗，下列哪项是正确的

- (A) 及时足量、足疗程使用抗生素进行病原治疗
- (B) 因消化能力低，禁食时间要长，这样有利于消化功能的恢复
- (C) 消化酶分泌不足，最好长期选用脱脂奶
- (D) 寻找并解除病程迁延的原因
- (E) 尽快调整饮食，以防止和纠正营养不良

7 下列血气分析结果，哪项提示可能存在混合性酸中毒

- (A) 标准碳酸氢盐下降，但高于实际碳酸氢盐
- (B) 标准碳酸氢盐下降，且低于实际碳酸氢盐
- (C) 标准碳酸氢盐正常，实际碳酸氢盐下降
- (D) pH 下降，血液碱剩余下降
- (E) pH 正常，实际碳酸氢盐下降

8 有关小儿呼吸系统的解剖特点，下列哪项是错误的

- (A) 婴幼儿鼻黏膜易肿胀致鼻塞
- (B) 鼻窦中上颌窦发育最迟
- (C) 右支气管短而粗，异物容易进入

(D) 婴儿咽鼓管较宽，且直而短，呈水平位

(E) 肺血流量相对较多而含气量少

9 人工喂养时，下列哪一点是不恰当的

(A) 按小儿年龄及生理特点调制乳品量和浓度

(B) 每次喂哺应煮沸消毒食具

(C) 每日喂哺次数和间隔时间一般与母乳喂哺相近

(D) 喂哺完毕后应竖抱并轻拍后背

(E) 3 个月以下婴儿可用豆类代乳品

10 下列哪种情况不是正常阴离子间隙(AG)型代谢性酸中毒

(A) 肾小管酸中毒

(B) 腹泻

(C) 胆管引流

(D) 高乳酸血症

(E) 应用醛固酮拮抗药

11 供给婴儿能量的主要营养素之间的比例按蛋白质、脂肪、碳水化合物分别为

(A) 10%、20%、70%

(B) 20% 、 20% 、 60%

(C) 15% 、 35% 、 50%

(D) 30% 、 20% 、 50%

(E) 20% 、 10% 、 70%

12 母乳喂养维持泌乳的关键因素是

(A) 每次哺乳的时间

(B) 哺乳的次数

(C) 哺乳的姿势

(D) 催乳的药物

(E) 乳母的饮食

13 前囟最大的时间为

(A) 出生时

(B) 2 个月

(C) 6 个月

(D) 8 个月

(E) 12 个月

14 婴儿对蛋白质的需要量比成人相对多是因为

- (A) 婴儿以乳制品为主要食品
- (B) 氨基酸在体内并非全部吸收
- (C) 由于生长发育需要正氮平衡
- (D) 婴儿对蛋白消化吸收功能差
- (E) 婴儿利用蛋白质的能力差

15 关于 4 个月婴儿，下列说法哪项不妥

- (A) 啼哭应考虑系看见陌生人所致
- (B) 会笑出声
- (C) 尚未出牙
- (D) 骨缝已闭合
- (E) 能抬头与挺胸

16 下列哪个器官在风湿热时不受累

- (A) 关节
- (B) 心脏
- (C) 肾脏

(D) 皮肤

(E) 神经系统

17 川崎病患者血清中常存在的自身抗体是

(A) 抗 dsDNA 抗体

(B) 抗 Sm 抗体

(C) 抗中性粒细胞胞浆抗体

(D) 抗核抗体

(E) 抗心磷脂抗体

18 先天性卵巢发育不全综合征最常见的核型是

(A) 45 · XO

(B) 45 · XO / 46 · XX

(C) 46 · Xdel(Xp)

(D) 46 · Xdel(Xq)

(E) 46 · xi(Xq)

19 糖原累积病最常见的类型是

(A) I 型

(B) II 型

(C) III 型

(D) IV 型

(E) VI 型

20 21-三体综合征属于

(A) 染色体畸变

(B) 常染色体显性遗传

(C) 常染色体隐性遗传

(D) X 连锁显性遗传

(E) X 连锁隐性遗传

21 婴儿消化系统特点，下列不符合的是

(A) 胃幽门括约肌发育良好

(B) 贲门括约肌发育不成熟

(C) 婴儿肠道相对较短

(D) 胃酸、胃蛋白酶活性较低

(E) 婴儿胃呈水平位

22 造成苯丙酮尿症患儿体内苯丙氨酸积聚的原因是

- (A) 磷酸化酶缺陷
- (B) 酪氨酸缺乏
- (C) 铜蓝蛋白缺乏
- (D) 苯丙氨酸羟化酶缺陷或四氢生物蝶呤缺乏
- (E) 磷酸化酶激酶缺乏

23 除新生儿外，以下哪项脑脊液检查是不正常的

- (A) 压力 $0.69 \sim 1.96 \text{ kPa}$
- (B) 白细胞数 $(0 \sim 5) \times 10^6 / \text{L}$
- (C) 糖定量为 $2.2 \sim 4.4 \text{ mmol} / \text{L}$
- (D) 蛋白定量为 $0.2 \sim 0.4 \text{ g} / \text{L}$
- (E) 氯定量为 $90 \sim 100 \text{ mmol} / \text{L}$

24 目前我国最常见的细菌性痢疾的病原菌是

- (A) 福氏痢疾杆菌
- (B) 宋氏痢疾杆菌
- (C) 鲍氏痢疾杆菌

(D) 舒氏痢疾杆菌

(E) 志贺痢疾杆菌

25 关于我国预防接种流行性脑脊髓膜炎疫苗方面，下列哪项是正确的

(A) A、B、C 菌群混合疫苗

(B) A 群多糖菌苗

(C) B 群多糖菌苗

(D) 菌苗注射后预防效果可达 100%

(E) 菌苗注射对象为 10 岁以下儿童

26 先天性喉喘鸣发病的主要原因是

(A) 感染

(B) 血管环压迫

(C) 肌肉发育不良

(D) 软骨组织软化

(E) 钙缺乏

27 作为毛细支气管炎的原发病原，下列哪种可能性最小

(A) 呼吸道合胞病毒

(B) 流感病毒

(C) 副流感病毒

(D) 腺病毒

(E) 肺炎球菌

28 人体内铜代谢的主要器官是

(A) 肝脏

(B) 脾脏

(C) 肾脏

(D) 肠道

(E) 胰腺

29 肝豆状核变性时铜在体内的蓄积开始于

(A) 学龄期

(B) 学龄前期

(C) 幼儿期

(D) 青春期

(E) 婴儿期

30 呼吸系统分为上下呼吸道，其分界处为

(A) 喉部

(B) 声带

(C) 环状软骨

(D) 总气管分叉部

(E) 会厌软骨

31 引起夏季婴儿腹泻的病原菌主要是

(A) 致病性大肠埃希菌

(B) 副大肠埃希菌

(C) 变形杆菌

(D) 克雷伯杆菌

(E) 金黄色葡萄球菌

32 下列哪项不是婴儿下呼吸道的解剖生理特点

(A) 黏液腺分泌不足

(B) 纤毛运动差

(C) 黏膜血管少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/286052231052010230>