

安徽省芜湖县 2024 年《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题大全汇编

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 真菌引起的阴道炎宜选用

- A: 咪康唑
- B: 甲硝唑
- C: 聚甲酚磺醛
- D: 庆大霉素

答案：A

2. （2017 年真题）目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是（）

- A: 绝经后 5 年之内
- B: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前
- C: 绝经后 5 年之内或大于 60 岁
- D: 大于 60 岁

答案：B

3. 以下不属于胃黏膜保护剂的是（）

- A: 硫糖铝
- B: 胶体果胶铋
- C: 米索前列醇
- D: 克拉霉素

答案：D

4. 运动员禁用药物中，蛋白同化激素产生的危害是

- A: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡
- B: 易造成人体严重脱水、肾衰竭
- C: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖
- D: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

答案：D

5. (透析患者常用药物)可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

- A: 乳果糖
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿法骨化醇
- D: 铁剂

答案：A

6. 无症状菌尿

- A: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml
- B: 宜选用毒性小的抗菌药物
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- D: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再出现菌尿，菌种与上次相同

答案：A

7. (2018 年真题) 患者,男,38 岁,因腹部受寒胃脘疼痛,应选用的药物是 ()

- A: 山莨菪碱
- B: 卡马西平
- C: 布洛芬
- D: 麦角胺咖啡因

答案：A

8. 醛固酮受体拮抗剂螺内酯久用引起的主要不良反应是

- A: 低钾血症
- B: 高钾血症
- C: 水肿
- D: 多毛症

答案：B

9. 氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用的机制是

- A: 减少不良反应
- B: 协同作用
- C: 拮抗作用
- D: 敏感化作用

答案：C

10. 有机酸排出减少

- A: 肾血流量减少
- B: 肾小球滤过减少
- C: 肾小管重吸收增加
- D: 肾小管分泌减少

答案：D

11. 成人空腹血糖正常参考区间是

- A: 3.7~6.1mmol/L
- B: 3.3~5.5mmol/L
- C: 3.9~6.1mmol/L
- D: 3.5~6.1mmol/L

答案：C

12. 患者，女，58 岁，有 2 型糖尿病病史，因头疼、头晕就诊。体征和实验室检查：餐前血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 8.8%，血压 166/96mmHg，蛋白尿>1g/24h。推荐在降糖的基础上合并选用

- A: 氢氯噻嗪
- B: 二甲双胍
- C: 赖诺普利
- D: 特拉唑嗪

答案：C

13. 从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是()

- A: 布洛芬
- B: 伪麻黄碱
- C: 氯苯那敏
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

14. 应用格列本脲时，应注意的事项是

- A: 服药期间不宜饮酒
- B: 用药期间宜吃高蛋白食物
- C: 服药期间不宜饮茶
- D: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物

答案：A

15. 属于钙通道阻滞剂（第Ⅳ类）的抗心律失常药是

- A: 胺碘酮
- B: 拉贝洛尔
- C: 美西律
- D: 维拉帕米

答案：D

16. 由国家药典委员会组织编写的是

- A: 《医师案头参考》
- B: 《中国药典临床用药须知》
- C: 《国家基本药物处方集》
- D: 《中国国家处方集》

答案：B

17. （2017 年真题）缺铁性贫血患者常表现为（）

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 红细胞增多

答案：A

18. 治疗皮肤疾病，最适宜选用的给药途径是

- A: 直肠给药
- B: 吸入给药
- C: 局部给药
- D: 口服给药

答案：C

19. 患者，男，54 岁，以“咳嗽、不适、呼吸困难和喘息、咳痰逾 3 日”就诊，患者无基础疾病，近 1 周内未服用药物，诊断为支气管炎。

对该患者的经验治疗应选择

- A: 复方甲氧那明胶囊
- B: 头孢克洛颗粒剂
- C: 阿奇霉素分散片
- D: 美托洛尔片

答案：A

20. 腔道疾病时宜选用

- A: 片剂
- B: 软膏剂
- C: 栓剂
- D: 注射剂

答案：C

21. 服用时不宜嚼碎的是

- A: 质子泵抑制剂
- B: 解痉、镇痛药
- C: 胃黏膜保护剂
- D: 抗酸药

答案：A

22. 结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

- A: 3HRZE / 9HR

B: 2HRZE / 4HR

C: 2HRZE / 4HR

D: 2HRE / 7HR

答案：D

23. 用药不适宜处方

A: 二甲双胍用于糖尿病患者

B: 黄连素用于细菌性腹泻

C: 无适应证用药

D: 无正当理由不首选国家基本药物

答案：D

24. 促进肾小管对钠的重吸收，引起高血压的药物是

A: 重组人促红细胞生成素

B: 伪麻黄碱

C: 咖啡因

D: 糖皮质激素

答案：D

25. 关于尿路感染的说法，不正确的是

A: 多见于育龄期和绝经后女性

B: 大肠埃希菌感染最为常见

C: 由细菌感染引起

D: 男性发病率稍高

答案：D

26. 可引起视力模糊的是

A: 抗过敏药

- B: 右美沙芬
- C: 阿米洛利
- D: 东莨菪碱

答案: D

27. 抗高血压药物的禁忌证双侧肾动脉狭窄 ()

- A: 依那普利
- B: 美托洛尔
- C: 维拉帕米
- D: 氢氯噻嗪

答案: A

28. 可用于慢性消耗性疾病的蛋白同化激素是

- A: 甲羟孕酮
- B: 司坦唑醇
- C: 他莫昔芬
- D: 依普黄酮

答案: B

29. 选择合适药物的首要标准是

- A: 药物治疗的规范性
- B: 药物治疗的有效性
- C: 药物治疗的安全性
- D: 药物治疗的方便性

答案: B

30. 可引起血红蛋白减少的疾病为

- A: 肾移植术后发生排斥反应

B: 胃溃疡

C: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

D: 糖尿病

答案：B

31. 伴痛风者禁用()。

A: 利尿剂（噻嗪类）

B: 非二氢吡啶类钙通道阻滞剂

C: ACEI

D: 利尿剂（袢利尿药）

答案：A

32. 1 日 1 次用药、初治短程化疗方案是

A: 2HSP(E)/10HP(E)

B: 2S(E)HR2/4HR

C: 2S(E)HR2/4H3R3

D: 1HS/11H2S2

答案：B

33. 以下可提示“高度黄疸，完全梗阻性黄疸”的总胆红素检查结果是

A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

B: $>342 \mu\text{mol/L}$

C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

D: $<85.5 \mu\text{mol/L}$

答案：B

34. 有机磷农药中毒者体内血胆碱酯酶活力下降，中度中毒者可降至

A: 30%~50%

B: 50%~70%

C: 30%以下

D: 20%以下

答案：A

35. 临床可作为氨基糖苷类药物的替代品的是

A: 氨基曲南

B: 亚胺培南

C: 头孢哌酮

D: 克拉维酸

答案：A

36. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

A: 吗啡

B: 痰液稀释剂

C: 泼尼松

D: 氨茶碱

答案：D

37. 易造成人体严重脱水、肾衰竭

A: 精神刺激剂

B: 利尿剂

C: 蛋白同化激素

D: β -受体阻断剂

答案：B

38. 峰值一般在清晨 7~8 时，谷值则在午夜 0 时，是指

- A: 糖皮质激素的分泌规律
- B: 肝脏合成胆固醇的规律
- C: 胰岛 B 细胞的分泌规律
- D: 胃酸的分泌规律

答案：A

39. 三环类抗抑郁药中毒应

- A: 禁止使用肟类复能剂
- B: 静脉滴注烟酰胺
- C: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙
- D: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃

答案：C

40. 用于紧急避孕的药物是

- A: 黄体酮
- B: 罗格列酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: X 睾酮

答案：C

41. 应在每日的同一时间服用并且不能有一日间断，仅数小时的给药间隔变化也会降低避孕效果的药物是

- A: 探亲避孕药
- B: 口服低剂量孕激素避孕药
- C: 甲地孕酮硅胶环
- D: 长效复方口服避孕药

答案：B

42. 铅严重中毒患者出现的最难救治的临床症状是（）

- A: 贫血
- B: 铅毒性脑病
- C: 中毒性肝炎
- D: 中毒性肾炎

答案：B

43. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 氯吡格雷
- B: 氨氯地平
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案：A

44. 对预防用药错误的策略而言，个人观认为发生用药错误的原因主要是

- A: 工作流程不规范
- B: 环境缺陷
- C: 人的行为失常
- D: 人员短缺

答案：C

45. 用药期间禁止饮酒否则可出现面部潮红、头痛、眩晕等“双硫仑样反应”的药品是

- A: 青霉素钾？
- B: 替硝唑？

C: 克林霉素?

D: 庆大霉素?

答案: B

46. 口服补液盐(氯化钠 3.5g、碳酸氢钠 2.5g 和葡萄糖 20g, 加水至 1000ml)用于中度脱水腹泻病人, 成人给予 3400ml。问给予体重 10kg 的患儿口服补液盐多少克, 应配制成多少毫升

A: 12.69, 485ml

B: 20.89, 800ml

C: 22.19, 850ml

D: 24.79, 950ml

答案: A

47. 患者, 男性, 36 岁, 主因“反复上腹部疼痛 3 年, 加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前, 餐后偶感上腹部隐痛不适, 曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗(具体药物及剂量不详)后症状有所好转。入院前 2 天开始, 上述症状发作较为频繁, 以胃灼痛为主, 多以辛辣刺激及不良饮食为诱因, 伴反酸及嗝气, 并伴有黑便, 呈糊状, 共排 3 次, 每次约 250g 左右, 同时伴有恶心。患者自发病以来, 无头晕及头痛, 有恶心但无呕吐, 无胸闷及心慌, 无咳嗽及咳痰, 无腹泻, 体重未见明显增减。查体: T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg, 腹平软, 未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波, 中上腹压痛但无反跳痛, 肝、脾未扪及, 肝、肾区无叩痛, 移动性浊音阴性, 肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查: ①便常规: 红细胞满视野, 隐血阳性; ②胃镜检查: 胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡; ③尿素酶试验(+)。诊断结论: 胃溃疡合并上消化道出血, 幽门螺杆菌感染。

- A: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mg bid+枸橼酸铋钾 220mg bid, 疗程 2 周
- B: 阿莫西林 1000mg bid+克拉霉素 500mg bid+艾司奥美拉唑 20mg bid+枸橼酸铋钾 220mg bid, 疗程 2 周
- C: 克拉霉素 500mg bid+左氧氟沙星 200mg bid+甲硝唑 400mg qid+艾司奥美拉唑 20mg bid, 疗程 2 周
- D: 左氧氟沙星 500mg qd+呋喃唑酮 100mg bid+四环素 500mg qid+枸橼酸铋钾 220mg bid, 疗程 2 周

答案：A

48. 患者，男 64 岁，身高 174cm，体重 92KG，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗

- A: 特拉唑嗪片、辛伐他丁、阿司匹林肠溶片
- B: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片
- C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他丁
- D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

答案：D

49. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少烟酸主要会造成

- A: 嗜酸性粒细胞减少
- B: 嗜碱性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞减少
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：A

50. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

- A: 地尔硫卓
- B: 硝苯地平
- C: 利伐沙班
- D: 胺碘酮

答案：A

51. 在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为（）

- A: H. pylori 感染
- B: 胃黏膜血流减少
- C: 胃酸
- D: 胃黏膜屏障的完整性

答案：C

52. （2015 年真题）患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L（参考范围 <7.8mmol/L），甘油三酯 1.52mmol/L（参考范围 0.56~1.70mmol/L），总胆固醇 6.26mmol/L（参考范围 <5.2mmol/L），低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L（参考范围 2.1~3.1mmol/L），高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/L（参考范围 1.2~1.65mmol/L），肌酐 60 μmol/L（参考范围 45~84 μmol/L），蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 依折麦布
- B: 阿托伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 普罗布考

答案：B

53. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 雌二醇一屈螺酮片
- B: 17 β 一雌二醇
- C: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- D: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片

答案：D

54. 表现为疲劳、软弱、全身不适、颅内压增高、皮肤干燥瘙痒、四肢痛为哪种维生素滥用的危害

- A: 维生素 B
- B: 维生素 C
- C: 维生素 A
- D: 维生素 D

答案：C

55. 患者用药治疗期间违背医师医嘱而饮酒，此时最容易导致肝损伤的药物是

- A: 布洛芬
- B: 氯苯那敏
- C: 伪麻黄碱
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

56. 患者男，70 岁高血压病史 14 年，服用依那普利 20mg/日，平时血压控制不佳今晨大便时突然出现头疼、头晕，随即出现右侧肢体活动不利。血压为 190/100mmHg，头颅 CT 检查结果为左侧脑出血，出血量约 10ml，拟采用内科治疗，该患者首先应采取的治疗措施是（）

- A: 肌内注射利血平注射液
- B: 静脉滴注甘露醇注射液
- C: 口服氨氯地平片
- D: 静脉滴注硝酸甘油注射液

答案：B

57. 引起"肾病患者清除减慢，服用呋喃妥因血药浓度升高，可引起周围神经炎"是

- A: 性别
- B: 遗传因素
- C: 年龄
- D: 基础疾病

答案：D

58. 可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

- A: 阿米卡星
- B: 头孢唑林
- C: 诺氟沙星
- D: 米诺环素

答案：C

59. 药物对医学检查指标异常结果的影响,可能导致 γ -谷氨酰转移酶升高的药物是

- A: 氯氮平
- B: 阿司匹林
- C: 胰岛素
- D: 苯妥英钠

答案：D

60. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ ，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒（正常值 13 秒），骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

- A: 维生素 C
- B: 维生素 K1
- C: 低分子肝素
- D: 鱼精蛋白

答案：D

61. （2019 年真题）患者，女，35 岁，复杂部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 低血糖
- B: 视物模糊
- C: 共济失调
- D: 牙龈增生

答案：A

62. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L（正常参考范围 <7.8mmol / L），三酰甘油 1.52mmol / L（正常参考范围 0.56~1.70mmol / L），总胆固醇 6.26mmol / L（正常参考范围 <5.2mmol / L），低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L（正常参考范围 2.1~3.1mmol / L），高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L（正常参考范围 1.20~1.65mmol / L），血肌酐 50 μmol / L（正常参考范围 45~84 μmol / L），蛋白尿（++）。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 阿托伐他汀
- B: 普罗布考
- C: 非诺贝特
- D: 依折麦布

答案：A

63. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50 μmol / L(正常参考区间 45~84 μmol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 控制体重
- B: 减少脂肪摄入
- C: 不必限盐
- D: 适当运动

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

64. 肾功能不全患者宜选用的药物是

A: 肾毒性小、经肝代谢的药物

B: 经肝肾双途径消除的药物

C: 肝毒性小、经肾代谢的药物

D: 经肝肠循环消除的药物

答案：A

65. 作为预防用药错误策略，规范处方行为与操作流程，归属于

A: 环境与流程的优化与持续改进

B: 科学发展

C: 人员知识培训

D: 管理规范到位

答案：D

66. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

A: 服药时避免与钙片同服，以免影响药物的作用

B: 用牛奶服药，减少对胃肠道的刺激

C: 服药期间，可能会发生便秘

D: 服药期间及停药一周内，避免饮用含酒精饮品

答案：B

67. 循证医学的证据分级中，"结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论"为几级证据

A: A 级

B: D 级

C: C 级

D: B 级

答案：D

68. 急性传染病的恢复期可呈现

A: 淋巴细胞增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 单核细胞增多

D: 中性粒细胞增多

答案：C

69. 营养性巨幼细胞性贫血主要因为缺乏（）

A: 维生素 C

B: 叶酸和（或）维生素 B12

C: 白细胞

D: 鞣酸

答案：B

70. #NAME?

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

71. “尽量为患者选择给药方便的药物和剂型”体现选择治疗药物的

A: 经济性

B: 有效性

C: 方便性

D: 安全性

答案：C

72. 可引起儿童良性颅内压增高、囟门隆起的药物是

A: 氯霉素

- B: 苯妥英钠
- C: 维生素 A
- D: 抗组胺药

答案：C

73. (2017 年真题) 过敏性皮炎常表现为 ()

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 中性粒细胞增多
- D: 红细胞增多

答案：A

74. 紫外线加速一些药品的氧化、分解，归属于

- A: 日光
- B: 湿度
- C: 空气
- D: 温度

答案：A

75. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。头孢曲松属于 ()

- A: C 级
- B: A 级
- C: B 级
- D: D 级

答案：C

76. 应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起

- A: 尿沉渣尿酸盐
- B: 尿沉渣管型
- C: 尿沉渣结晶
- D: 尿沉渣白细胞

答案：B

77. 对小动脉、小静脉和微静脉均有扩张作用，用于高血压危象、高血压脑病、恶性高血压等高血压急症的是

- A: 氨力农
- B: 硝普钠
- C: 地高辛
- D: 多巴酚丁胺

答案：B

78. 1 天给药 1 次；需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍针对

- A: 半衰期大于 24 小时
- B: 半衰期 8~24 小时
- C: 半衰期大于 30 小时
- D: 半衰期小于 30 分钟

答案：A

79. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 D 级的是

- A: 二甲双胍
- B: 卡马西平
- C: 雷尼替丁
- D: 泮托拉唑

答案：B

80. 以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

- A: 阿司匹林
- B: 硝酸甘油
- C: 呋塞米
- D: 维生素 E

答案：A

81. 再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

- A: 红细胞生成减少
- B: 血红蛋白生成减少
- C: 红细胞丢失过多
- D: 红细胞生成过多

答案：A

82. 治疗轻症、慢性疾病用药持久，最适宜选用的给药途径是

- A: 舌下含服
- B: 口服给药
- C: 直肠给药
- D: 吸入给药

答案：B

83. 某女孩，6 岁，2 个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

- A: 失神发作
- B: 复杂部分性发作
- C: 简单部分性发作
- D: 肌阵挛发作

答案：A

84. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 药动学相互作用
- B: 药物制剂因素
- C: 药物的使用
- D: 药理作用

答案：B

85. 适用于夜间服用的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 氨基糖苷类
- C: 他汀类
- D: 利尿药

答案：C

86. 患者，女，48 岁，有高血压病史，右上肢震颤，呈静止性，紧张时加重，睡眠时消失，诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗，症状一度好转又反复加重，随后加大复方左旋多巴剂量，并加用苯海索治疗。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压。近日出现运动症状波动，伴有异动症。导致该不良反应的药物是

- A: 左旋多巴
- B: 苧丝肼
- C: 氨氯地平

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 苯海索

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/286052241005011032>