

2023-24 年辽宁省昌图县《执业药师之西药专业二》资格考试王牌题库带答案（满分必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 与噻嗪类利尿剂合用易发生高钙血症的药物是

- A: 奥关拉唑
- B: 枸橼酸铍钾
- C: 碳酸钙
- D: 莫沙必利

答案：C

2. 以下患者中可以使用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)的是()

- A: 孕妇
- B: 高钾血症患者
- C: 双侧肾动脉狭窄患者
- D: 高血压患者和心力衰竭患者

答案：D

3. 柔红霉素可能与()存在交叉耐药性。

- A: 甲氨蝶呤
- B: 环磷酰胺
- C: 阿糖胞苷
- D: 多柔比星

答案：D

4. 甲氧苄啶与磺胺甲噁唑合用的原因是

- A: 促进吸收
- B: 促进分布
- C: 抗菌谱不相似
- D: 双重阻断敏感菌的叶酸代谢

答案：D

5. 庚酸炔诺酮()

- A: 抑制排卵作用
- B: 促进蛋白质合成
- C: 减少精子数目
- D: 抗着床

答案：A

6. 高血压合并慢性阻塞性肺病不宜选用()

- A: 肼屈嗪
- B: 胍乙啶
- C: 氢氯噻嗪
- D: 普萘洛尔

答案：D

7. 与唑来膦酸合用可增加多发性骨髓瘤患者发生肾功能不全风险的谷氨酸衍生物是

- A: 萘普生
- B: 抗血管生成药
- C: 沙利度胺
- D: 高钙食品

答案：C

8. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 瑞替普酶
- B: 阿替普酶
- C: 尿激酶
- D: 链激酶

答案：D

9. 下述利尿药中，可增加卡那霉素耳毒性的是

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨苯蝶啶
- D: 螺内酯

答案：A

10. 易引起低血钾的利尿药是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 氨苯蝶啶
- C: 山梨醇
- D: 阿米洛利

答案：A

11. 抗心绞痛的首选联合治疗方案是()

- A: 维拉帕米+普萘洛尔
- B: 长效硝酸酯类+普萘洛尔
- C: 短效硝酸酯类+螺内酯
- D: 维拉帕米+氢氯噻嗪

答案：B

12. 长期大量服用维生素 E 会出现

A: 视物模糊、乳腺肿大、类流感样综合征、胃痉挛

B: 颅内压增高、夜尿增多、毛发干枯或脱落、皮肤干燥或瘙痒、体重减轻

C: 头痛、眼花、烦躁、心律失常、妇女经血不止

D: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重下降、肝脏肿大、肾脏损害、骨硬化

答案：A

13. 属于胃黏膜保护药的是

A: 胶体果胶铋

B: 山莨菪碱

C: 多潘立酮

D: 熊去氧胆酸

答案：A

14. 氨苄西林

A: 对支原体有效

B: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效

C: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

D: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效

答案：D

15. 作用于对青霉素敏感的革兰阳性菌以及部分革兰阴性杆菌的药物是
()

A: 阿莫西林

B: 克拉维酸

C: 氨曲南

D: 亚胺培南

答案：A

16. 可用于烧伤及伤后感染的是()

A: 磺胺甲噁唑

B: 磺胺米隆

C: 磺胺嘧啶

D: 柳氮磺吡啶

答案：C

17. 可用于急慢性支气管炎的治疗，还能用于环磷酰胺出血性膀胱炎治疗的药物是

A: 氨溴索

B: 羧甲司坦

C: 溴己新

D: 乙酰半胱氨酸

答案：D

18. 神经毒性较严重的是

A: 亚叶酸钙

B: 顺铂

C: 奥沙利铂

D: 卡铂

答案：C

19. 丙硫氧嘧啶最严重的不良反应是

- A: 头痛
- B: 胃肠道反应
- C: 粒细胞缺乏症
- D: 关节痛

答案：C

20. 关于双胍类药物的作用特点描述，错误的是

- A: 促进组织摄取葡萄糖
- B: 不与蛋白结合，不被代谢，尿中排出
- C: 抑制胰高血糖素的分泌
- D: 不会降低正常的血糖

答案：C

21. 与多柔比星合用或配伍可增加肝毒性的药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 利福平
- C: β 受体阻断剂
- D: 阿糖胞苷

答案：B

22. 患者，男，52 岁，BMI28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚 8 点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 碳酸氢钠
- C: 别嘌醇
- D: 非布司他

答案：A

23. 可与奎尼丁发生与 P 糖蛋白有关的相互作用的药物是()

- A: 达比加群酯
- B: 肝素钠
- C: 华法林
- D: 低分子肝素

答案: A

24. 可用于治疗伤寒的药物是

- A: 青霉素类
- B: 四环素类
- C: 氟喹诺酮类
- D: 氨基糖苷类

答案: C

25. 青霉素类用药后发生过敏性休克，属于

- A: III型变态反应
- B: IV型变态反应
- C: I型变态反应
- D: II型变态反应

答案: C

26. 可用肝病的氨基酸制剂是

- A: 复方氨基酸注射液(15AA)、复方氨基酸注射液(6AA)
- B: 复方氨基酸注射液(15AA)、复方氨基酸注射液(9AA)
- C: 复方氨基酸注射液(6AA)、复方氨基酸注射液(9AA)
- D: 复方氨基酸注射液(9AA)、赖氨酸注射液

答案: A

27. 可用于治疗青光眼的是

- A: 哌替啶
- B: 新斯的明
- C: 阿托品
- D: 毛果芸香碱

答案：D

28. 抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的抗菌药是

- A: 喹诺酮类
- B: 苯唑西林
- C: 甲硝唑
- D: 四环素

答案：A

29. 原形从肾脏排泄率最高的喹诺酮类药物是()

- A: 诺氟沙星
- B: 培氟沙星
- C: 环丙沙星
- D: 氧氟沙星

答案：D

30. 弱效(使 LDL-ch 水平降低<30%)的他汀类调血脂药是()

- A: 小剂量阿托伐他汀
- B: 小剂量氟伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 大剂量阿托伐他汀

答案：B

31. 可降低外周血管阻力，还可减轻前列腺增生症状的药物是()

- A: 坎地沙坦
- B: 格列吡嗪
- C: 哌唑嗪
- D: 利血平

答案：C

32. 半合成青霉素类中，属于广谱青霉素类的是()

- A: 羧苄西林
- B: 氨苄西林
- C: 替莫西林
- D: 甲氧西林

答案：B

33. (2019 年真题) 患者，男，67 岁，既往有癫痫病史。因感染性脑膜炎入院治疗，在脑脊液标本的病原学结果回报之前，可经验性选用的抗菌药物是()

- A: 卡泊芬净
- B: 头孢曲松
- C: 亚胺培南西司他丁
- D: 米诺环素

答案：B

34. 治疗维生素 D 中毒导致的变应性骨炎可选用

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 阿法骨化醇
- C: 奥利司他

D: 鲑降钙素

答案: D

35. 糖皮质激素的抗炎作用是

- A: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- B: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理
- C: 提高中枢神经系统的兴奋性
- D: 提高机体对细菌内毒素的耐受力

答案: A

36. 磺酰脲类降糖药的作用机制是

- A: 提高胰岛 β 细胞功能
- B: 抑制胰岛素降解
- C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- D: 加速胰岛素合成

答案: C

37. 司来吉兰用于

- A: 神经源性尿崩症
- B: 慢性脑功能不全
- C: 早期帕金森病
- D: 特发性震颤

答案: C

38. 属于III类抗心律失常药的是

- A: 奎尼丁
- B: 普罗帕酮
- C: 胺碘酮

D: 利多卡因

答案: C

39. 属于促性腺激素释放激素类似物的是()

A: 米非司酮

B: 戈那瑞林

C: 达那唑

D: 普拉睾酮

答案: B

40. 可抑制细菌 β -内酰胺酶的是()。

A: 磷霉素

B: 利福平

C: 替考拉宁

D: 舒巴坦

答案: D

41. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿药是

A: 呋塞米

B: 氢氯噻嗪

C: 乙酰唑胺

D: 螺内酯

答案: D

42. 抑制 DNA 回旋酶，使 DNA 复制受阻，导致 DNA 降解而细菌死亡的药物是

A: 红霉素

B: 甲氧苄啶

C: 利福平

D: 诺氟沙星

答案: D

43. 长效的 5-HT₂受体阻断剂是

A: 甲氧氯普胺

B: 帕洛诺司琼

C: 劳拉西泮

D: 氯丙嗪

答案: B

44. 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

A: 更昔洛韦

B: 阿昔洛韦

C: 金刚烷胺

D: 恩替卡韦

答案: D

45. 格列本脲的降糖作用机制是

A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B: 艾塞那肽

C: 胰岛素皮下注射

D: 二甲双胍

答案: A

46. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

A: 多柔比星

- B: 氟尿嘧啶
- C: 伊立替康
- D: 多西他赛

答案：A

47. 属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常的药物是

- A: 奎尼丁
- B: 普鲁卡因胺
- C: 胺碘酮
- D: 普罗帕酮

答案：C

48. 不属于氟喹诺酮类的药物是

- A: 莫西沙星
- B: 小檗碱
- C: 依诺沙星
- D: 环丙沙星

答案：B

49. 以下抗心律失常药中，对光过敏的是

- A: 奎尼丁
- B: 利多卡因
- C: 胺碘酮
- D: 普萘洛尔

答案：C

50. 老年人对苯二氮（𠂇）卓）类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上称为

- A: “宿醉”现象
- B: 老年期痴呆
- C: 震颤麻痹综合征
- D: 戒断综合征

答案: A

51. 单纯性下尿路感染可选择的药物是

- A: 磷霉素钠+万古霉素
- B: 利奈唑胺+哌替啶
- C: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- D: 磷霉素氨丁三醇

答案: D

52. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂
- B: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色
- C: 肾功能不全者可以使用
- D: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇

答案: C

53. 肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

- A: 抗休克
- B: 抗炎
- C: 免疫抑制
- D: 抗病毒

答案: D

54. 毒性较大，尤其对第Ⅷ对脑神经和肾损害严重的药物是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 异烟肼
- C: 卡那霉素
- D: 利福平

答案：C

55. 变异型心绞痛不宜选用

- A: 地尔硫
- B: 维拉帕米
- C: 普萘洛尔
- D: 硝苯地平

答案：C

56. 属于电解质补充药，可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 门冬氨酸钾镁
- C: 异甘草酸镁
- D: 双环醇

答案：B

57. (2017 年真题) 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是 ()

- A: 氟马西尼
- B: 苯甲酸钠咖啡因
- C: 纳洛酮
- D: 阿托品

答案：D

58. 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时，适宜的服药时间是()

- A: 餐前即刻
- B: 餐后 2h
- C: 餐中
- D: 清晨或睡前

答案: C

59. (2016 年真题) 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

- A: 双八面体蒙脱石散
- B: 洛哌丁胺片
- C: 地衣芽孢杆菌胶囊
- D: 双歧三联活菌胶囊

答案: B

60. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数 $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^{\circ}C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)

- A: 地西泮
- B: 左乙拉西坦
- C: 丙戊酸钠
- D: 乙琥胺

答案: C

61. 治疗青光眼宜选用

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 复方托吡卡胺滴眼液
- C: 碘苷滴眼液

D: 左氧氟沙星滴眼液

答案: A

62. 下列哪项不是血管紧张素转换酶抑制药的主要临床应用

A: 高血压

B: 充血性心力衰竭

C: 心肌梗死

D: 心律失常

答案: D

63. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片 20mg/d 治疗。服药期间应监测血生化指标，其中超过正常值上限 10 倍，应立即停药的指标是()。

A: Hcy

B: Cr

C: BUN

D: CK

答案: D

64. 用于高钾血症或普鲁卡因胺引起的心律失常伴有酸血症者的药品是()

A: 乳酸钠

B: 硫酸镁

C: 谷氨酸

D: 氯化钾

答案: A

65. 利福平与口服避孕药合用()

- A: 代谢加速而导致意外怀孕
- B: 子宫内膜突破性出血
- C: 抑制排酸作用
- D: 代谢加快而失效

答案: A

66. (2018 年真题) 关于地高辛作用特点的说法, 正确的是 ()

- A: 地高辛消除半衰期为 12h
- B: 地高辛口服生物利用度小于 50%
- C: 地高辛通过激动 Na^+, K^+ -ATP 酶增强心肌收缩力
- D: 地高辛不经细胞色素 P450 酶代谢, 以原形药物从肾脏排泄

答案: D

67. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

- A: 第四代头孢菌素
- B: 第二代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案: A

68. 氨基糖苷类药的主要作用靶点是

- A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- B: 核糖体的 30S 亚基
- C: 细胞内膜 PBP
- D: 核糖体的 50S 亚基

答案: B

69. 关于治疗功能性胃肠病药的叙述，不正确的是

- A: 匹维溴铵可用于对症治疗与胆道功能紊乱有关的疼痛
- B: 匹维溴铵宜空腹吞服
- C: 匹维溴铵为钡灌肠做准备时，应于检查前 3 日开始用药
- D: 曲美布汀可使胃排空功能的减弱得到改善

答案：B

70. 对 G

- A: 第二代头孢菌素
- B: 第四代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：C

71. 成人口服左甲状腺素替代治疗，开始剂量每日 25~50 μg ，每 2 周增加

- A: 4 μg / kg
- B: 5 μg / kg
- C: 25 μg
- D: 6 μg / kg

答案：C

72. (2018 年真题) 可用于治疗非何杰金 (非霍奇金) 淋巴瘤的单克隆抗体是 ()

- A: 曲妥珠单抗
- B: 西妥昔单抗
- C: 贝伐珠单抗

D: 利妥昔单抗

答案: D

73. 诱导肝微粒体酶、是皮质激素和雌激素药效降低的是()

A: 异烟肼

B: 利福平

C: 链霉素

D: 乙胺丁醇

答案: B

74. 通过促进或恢复凝血过程而止血的药物是

A: 氨甲苯酸

B: 氨基己酸

C: 卡巴洛克

D: 酚磺乙胺

答案: D

75. (2015 年真题) 易导致血糖异常的药品是 ()。

A: 多西环素

B: 庆大霉素

C: 头孢哌酮

D: 加替沙星

答案: D

76. 强效 (使 LDL-ch 水平降低 $\geq$ 50%) 的他汀类调血脂药

A: 小剂量阿托伐他汀

B: 依折麦布

C: 大剂量阿托伐他汀

D: 小剂量氟伐他汀

答案: C

77. 属于硝基呋喃类的是()

A: 磺胺甲噁唑

B: 夫西地酸

C: 呋喃妥因

D: 甲硝唑

答案: C

78. 阿司匹林的抗血小板作用机制为

A: 抑制血小板中 TXA

B: 促进内皮细胞中 PGI

C: 抑制内皮细胞中 TXA

D: 激活环氧酶

答案: A

79. 周某，男，31 岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A: 选择适宜的病期、疗程和监测

B: 尽量选择三价铁

C: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离

D: 注意预防铁负荷过重

答案: B

80. 氯磺丙脲的降糖作用机制是

A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B: 能明显降低空腹血糖、胰岛素和 C 肽水平

C: 降低靶组织对胰岛素的敏感性

D: 防治遗传性血管神经性水肿

答案: A

81. (2017 年真题) 可能引起中性粒细胞减少的药物 ()

A: 鲨肝醇

B: 碘, 碘化物

C: 左甲状腺素

D: 丙硫氧嘧啶

答案: D

82. (2021 年真题) 常见不良反应为泌尿生殖系统感染的口服降糖药物是 ()

A: 达格列净

B: 吡格列酮

C: 二甲双胍

D: 沙格列汀

答案: A

83. (2020 年真题) 患者, 女, 26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊, 实验室检查游离甲状腺素 (FT3、FT4) 增高、促甲状腺素 (TSH) 降低, 诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药物治疗。

A: 普萘洛尔

B: 特布他林

C: 利多卡因

D: 碘化钾

答案: A

84. 属于靶向抗肿瘤药物的是

- A: 昂丹司琼
- B: 多柔比星
- C: 紫杉醇
- D: 吉非替尼

答案：D

85. 可用于慢性支气管炎引起的痰液稠厚、呼吸困难的是

- A: 氨溴索
- B: 右美沙芬
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 羧甲司坦

答案：D

86. 促进大脑对磷脂和氨基酸的利用，增加蛋白质合成，改善脑缺氧和脑损伤的是

- A: 胞磷胆碱钠
- B: 吡拉西坦
- C: 多奈哌齐
- D: 银杏叶提取物

答案：B

87. 成人与头孢类并用舒巴坦最大剂量为每日

- A: 1g
- B: 4g
- C: 3g

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 2g

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/287030045056010024>