

2024 贵州省花溪区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题完整版及答案（易错题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可造成儿童呼吸抑制，故 5 岁以下的儿童不宜应用的是

- A: 苯丙哌林
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 喷托维林

答案：D

2. （2016 年真题）关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）。

- A: 应个体化用药
- B: 提倡无创给药方式，尽量口服
- C: 按阶梯给药
- D: 疼痛时用药，不痛时不需用药

答案：D

3. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的药物信息来源是

- A: 《中国国家处方集》
- B: 《马丁代尔药物大典》
- C: 《医师案头参考》
- D: 《英国国家处方集》

答案：B

4. $90\text{g/L} \leq \text{Hb}$ 量

- A: 轻度贫血
- B: 基本正常
- C: 重度贫血
- D: 中度贫血

答案：A

5. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息} 世界卫生组织的网址是

- A: org.cn
- B: www.cm
- C: www.cp
- D: org.cn

答案：C

6. 常引起粪便白细胞增多的是

- A: 阻塞性黄疸
- B: 细菌性痢疾
- C: 溶血性黄疸
- D: 急性胰腺炎

答案：B

7. 对由营养不良、婴儿期所致的恶性贫血者应选用

- A: 富马酸亚铁
- B: 甲磺酸去铁胺
- C: 叶酸+维生素 B12
- D: 维生素 K1

答案：C

8. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 氯苯那敏
- C: 伪麻黄碱
- D: 右美沙芬

答案：A

9. 前列腺增生症治疗药物度他雄胺的不良反应是

- A: 加重闭角型青光眼
- B: 性功能障碍
- C: 心动过缓
- D: 体位性低血压

答案：B

10. 他汀类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 神经系统疾病
- B: 胃肠道疾病
- C: 肌病
- D: 血液系统疾病

答案：C

11. 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 餐中多饮水
- B: 戒烟酒
- C: 避免高脂饮食
- D: 控制体重

答案：A

12. 最常用的解热镇痛药为

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿司匹林
- D: 谷维素

答案：B

13. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于循证医学证据推荐强度的

- A: C 级
- B: E 级
- C: B 级
- D: D 级

答案：C

14. (2021 年真题) 避免与辛伐他汀合用的药物是 ()

- A: 头孢哌酮
- B: 克拉霉素

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 美罗培南

D: 万古霉素

答案：B

15. 引起"老年人应用普萘洛尔可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应"是

- A: 年龄
- B: 基础疾病
- C: 性别
- D: 遗传因素

答案：A

16. (2019 年真题) 患者，男，70 岁，高血压病史 14 年，服用依那普利 20mg/日，平时血压控制不佳，今晨大便时突然出现头疼、头晕，随即出现右侧肢体活动不利。血压为 190/100mmHg，头颅 CT 检查结果为左侧脑出血，出血量约 10ml，拟采用内科治疗，该患者首先应采取的治疗措施是

- A: 肌肉注射利血平注射液
- B: 口服氨氯地平片
- C: 静脉滴注硝酸甘油注射液
- D: 静脉滴注甘露醇注射液

答案：D

17. 高血压合并冠心病，偶发窦性心动过速宜选用的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 非洛地平
- D: 缬沙坦

答案：A

18. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

- A: 替米沙坦
- B: 二甲双胍
- C: 别嘌醇
- D: 奥利司他

答案：D

19. 甲状旁腺素制剂属于

- A: 促进骨矿化剂
- B: 激素替代剂
- C: 骨吸收抑制剂
- D: 骨形成刺激剂

答案：D

20. 外用杀精剂的主要活性成分为（）

- A: 黄体酮
- B: 壬苯醇醚
- C: 甲地孕酮
- D: 米非司酮

答案：B

21. 多柔比星的通用名是

- A: 病毒唑
- B: 克毒星
- C: 无环乌昔片
- D: 阿霉素

答案：D

22. 患老年高血压并发心力衰竭，宜选用的药物是

- A: 缬沙坦
- B: 美托洛尔
- C: 非洛地平
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

23. 鼻腔黏膜上有丰富的血管、黏液腺的纤毛，鼻中隔前下部也有纤密的毛细血管网，当受到刺激、过敏、感染时，鼻黏膜血管迅速扩张和肿胀，出现鼻塞。其常见病因有：感冒、慢性单纯性鼻炎、慢性鼻窦炎、过敏性鼻炎等。

- A: 麻黄碱滴鼻剂
- B: 萘甲唑啉鼻喷雾剂
- C: 羟甲唑啉鼻喷雾剂
- D: 布地奈德鼻喷雾剂

答案：D

24. 结核病化学治疗成功的关键措施是

- A: 采用大剂量
- B: 避免与克服细菌耐药
- C: 采用短程疗法
- D: 采用间歇疗法

答案：B

25. 香豆素类抗凝血药

- A: 华法林
- B: 利伐沙班

C: 肝素

D: 氯吡格雷

答案：A

26. 药酶的活性可被部分药品所增强或灭活，能增强肝药酶活性的药品是

A: 左氧氟沙星

B: 丙磺舒

C: 利福平

D: 多潘立酮

答案：C

27. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A: 胰酶口服时应嚼碎服用

B: 多潘立酮可能引起心脏相关风险

C: 复方消化酶制剂送服时不宜用热水

D: 助消化药与吸附剂合用须间隔 2~3h

答案：A

28. 餐中服用，可以减少对胃肠道刺激的药品是

A: 甲氧氯普胺片

B: 二甲双胍片

C: 瑞舒伐他汀片

D: 复方铝酸铋片

答案：B

29. 适用于肝性脑病及长期卧床的老年便秘患者的药物是

- A: 硫酸镁
- B: 乳果糖
- C: 甘油栓
- D: 比沙可啶

答案：B

30. 可用于不明毒物中毒、与其形成腐蚀性较小化合物的洗胃液是

- A: 3%~5%鞣酸溶液
- B: 鸡蛋白
- C: 药用炭混悬液
- D: 1%氯化钠溶液

答案：D

31. 患过敏性疾病的驾驶员可选用的药物是

- A: 氯雷他定
- B: 赛庚啶
- C: 异丙嗪
- D: 苯海拉明

答案：A

32. HMG-CoA 还原酶抑制剂

- A: 阿昔莫司
- B: 考来烯胺
- C: 辛伐他汀
- D: 吉非贝齐

答案：C

33. 可能导致血小板 (PLT) 计数减少的药物是

- A: 氯氮平
- B: 苯妥英钠
- C: 胰岛素
- D: 阿司匹林

答案：D

34. 癌症患者化疗出现腹泻合并中性粒细胞核左移时，需给予的预防性治疗药物是

- A: 广谱抗生素
- B: 莫沙必利
- C: 药用炭
- D: 洛哌丁胺

答案：A

35. 蒽环类抗生素容易引起急、慢性心脏毒性，可导致左心室功能受损、心衰等，可以采用何种药物预防（）

- A: 阿托品
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 辅酶 Q

答案：D

36. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力，正确、妥善地应对投诉的重要意义是

- A: 增进患者对药师工作的信任
- B: 提高用药顺应性
- C: 警惕与防范用药错误

D: 使患者获得有关的用药指导

答案: A

37. 与两性霉素 B 合用需要严密监测血钾

A: 碳酸氢钠

B: 酮康唑

C: 链霉素

D: 强心苷

答案: D

38. 将 0.5g 氨茶碱注射液加到 5%葡萄糖注射液 350ml 中，临床要求给药速度是 60mg/h，输注速度是

A: 60ml/h

B: 36ml/h

C: 15ml/h

D: 42ml/h

答案: D

39. II 度烫伤的临床表现为

A: 全层皮肤甚至肌肉或骨头坏死，皮肤变色，最后呈黑色

B: 局限性蚕豆或指甲大小的紫红色肿块，边缘鲜红，中央青紫

C: 水疱性，患处产生水疱

D: 红斑性，皮肤变红，并有火辣辣的刺痛感

答案: C

40. 提示首次取硝酸甘油片的患者"要随身携带、在心绞痛发作时含于舌下"，是针对

A: 交代药物的用量

- B: 交代药品贮存条件与方法
- C: 交代用药注意事项
- D: 交代用药途径及用药方法

答案：D

41. (2018 年真题) 临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 后, 出现黑色沉淀。出现沉淀的原因是 ()

- A: 酚妥拉明和多巴胺发生反应
- B: 酚妥拉明和呋塞米发生反应
- C: 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解
- D: 多巴胺和呋塞米发生反应

答案：D

42. 易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 阿霉素
- C: 氟尿嘧啶
- D: 紫杉醇

答案：C

43. 痉挛性便秘可选

- A: 乳果糖
- B: 比沙可啶
- C: 聚乙二醇粉
- D: 硫酸镁

答案：C

44. 患者向药师咨询停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中正确的是()

- A: 复方短效口服避孕药停药后即可备孕
- B: 复方短效口服避孕药停药 3 个月后方可备孕
- C: 长效避孕药停药后即可备孕
- D: 复方短效口服避孕药停药 6 个月后方可备孕

答案: A

45. 以下中毒解救措施中，正确的药物拮抗是

- A: 二巯丙醇拮抗亚硝酸钠
- B: 阿托品拮抗颠茄碱类中毒
- C: 二巯丙醇结合铅
- D: 弱酸中和强碱

答案: D

46. (2017 年真题) 处方中外文缩写 OS. 代表 ()

- A: 左眼
- B: 左耳
- C: 双眼
- D: 右耳

答案: A

47. 维生素 E 用于

- A: 防治夜盲症
- B: 防治坏血病
- C: 习惯性流产的辅助治疗
- D: 防治佝偻病

答案: C

48. 以下对各类处方的描述中，不正确的是

- A: 儿科处方印刷用纸颜色为淡绿色、右上角标注“儿科”
- B: 麻醉药品处方印刷用纸颜色为淡红色、右上角标注“麻醉”
- C: 第二类精神药品处方印刷用纸为白色，右上角标注“精二”
- D: 普通处方印刷用纸为白色，右上角无标注

答案：B

49. 患者，男，50 岁。临床诊断慢性肾衰竭（尿毒症期），进行肾移植治疗，配合应用免疫抑制剂他克莫司，其初始剂量为

- A: 0.02~0.03mg/（kg·d）
- B: 0.75~1mg/（kg·d）
- C: 2~5mg/（kg·d）
- D: 0.05~0.15mg/（kg·d）

答案：D

50. 高血压伴高钾血症患者慎用的药物是()

- A: 依那普利
- B: 氢氯噻嗪
- C: 美托洛尔
- D: 氨氯地平

答案：A

51. 血液净化疗法可使重症毒物中毒者愈后大为改观，血液净化的方法不包括

- A: 血液透析
- B: 血液置换
- C: 腹膜透析

D: 血液滤过

答案：B

52. 处方按性质可分为

A: 法定处方、麻醉药品处方

B: 法定处方、医师处方

C: 普通处方、协定处方

D: 法定处方、普通处方

答案：B

53. 蒽环类药物

A: 溶血性尿毒症

B: 心脏毒性

C: 肺纤维化

D: 出血性膀胱炎

答案：B

54. 宜用常量短期治疗，以免产生依赖性，可用于 IBS 患者止泻的药物是

A: 环孢素 A

B: 匹维溴铵

C: 地芬诺酯

D: 蒙脱石散

答案：C

55. 血清 γ -谷氨酰转移酶正常参考区间是

A: 男性 11~50U/L

B: 成人 <50U/L

C: 男性 $<40\text{U/L}$

D: 成人 $<40\text{U/L}$

答案：A

56. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

A: 阿嗝米特肠溶片

B: 奥美拉唑

C: 乳酶生

D: 多潘立酮片

答案：C

57. 引起心悸、心绞痛发作的药物是

A: 左甲状腺素

B: 胰岛素

C: 碘和碘化物

D: 丙硫氧嘧啶

答案：A

58. 能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的粪便细胞显微镜检出物是

A: 红细胞

B: 吞噬细胞增多

C: 上皮细胞

D: 真菌

答案：D

59. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

- A: 哌替啶
- B: 金刚烷胺
- C: 氟桂利嗪
- D: 双氯芬酸

答案：A

60. 苯二氮（𠫪卓）类药物中毒的特异性治疗药物为

- A: 纳洛酮
- B: 去甲肾上腺素
- C: 氟马西尼
- D: 醒脑静

答案：C

61. 饮酒过多也可能致命，导致儿童丧生的纯乙醇致死量是（）

- A: 25ml
- B: 10ml
- C: 15ml
- D: 20ml

答案：A

62. 结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

- A: 2HRZE / 4HR
- B: 2HRE / 7HR
- C: 3HRZE / 9HR
- D: 2HRZE / 4HR

答案：D

63. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

A: B 级

B: A 级

C: C 级

D: D 级

答案: A

64. 提供药师药学服务的重要方式和途径的是

A: 参与临床药物治疗

B: 处方调配

C: 静脉药物配置

D: 治疗药物监测

答案: D

65. 伴有过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘可选用的药物是

A: 沙美特罗

B: 沙丁胺醇

C: 异丙托溴铵

D: 孟鲁司特

答案: D

66. 通常开封启用 4 周后, 不宜再继续使用的剂型是 ()

A: 含漱剂

B: 滴眼剂

C: 软膏剂

D: 直肠栓剂

答案: B

67. 可抑制血小板聚集和释放的药物是

- A: 噻氯匹定
- B: 链激酶
- C: 华法林
- D: 肝素

答案：A

68. (2019 年真题) 患者，女，72 岁，有青霉素过敏史。主诉尿痛、尿频，尿常规检查示大量白细胞，尿细菌数 $>10^5$ cfu/ml，诊断为急性膀胱炎。应选用的药物是

- A: 复方磺胺甲噁唑片
- B: 阿奇霉素片
- C: 阿莫西林胶囊
- D: 莫西沙星片

答案：D

69. 可造成儿童呼吸抑制，故 5 岁以下儿童不宜应用的是

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 喷托维林

答案：D

70. 食管癌患者应用顺铂+氟尿嘧啶+多柔比星+依托泊苷属于

- A: 超剂量用药
- B: 超适应证用药
- C: 非适应证用药

D: 过度治疗用药

答案：D

71. 下列药品宜于冷处贮存，但不应冷冻的是

A: 复方氨基酸注射剂

B: 替硝唑注射剂

C: 托烷司琼注射剂

D: 双歧三联活菌制剂

答案：D

72. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

B: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

C: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

D: 瑞格列奈片应于餐前服用

答案：A

73. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 感染性腹泻？

B: 分泌性腹泻？

C: 动力性腹泻?

D: 消化不良性腹泻?

答案: A

74. 老年糖尿病患者不建议使用

A: 噻唑烷二酮类

B: α -葡萄糖苷酶抑制剂

C: 长效磺脲类

D: 双胍类

答案: C

75. 可主要引起嗜酸性粒细胞增多的疾病为

A: 糖尿病

B: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

C: 肾移植术后发生排斥反应

D: 胃溃疡

答案: B

76. 有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是()

A: 干酵母

B: 双歧杆菌

C: 硫酸镁

D: 比沙可啶

答案: D

77. 促使儿茶酚胺释放，减少药物吸收

A: 地西洋

B: 胰岛素

C: 呋塞米

D: 氨茶碱

答案: B

78. 服用维生素 B

A: 食醋

B: 脂肪

C: 食盐

D: 酒

答案: D

79. 可引起视物模糊、辨色困难的药物是

A: 氯苯那敏

B: 右美沙芬

C: 东莨菪碱

D: 阿米洛利

答案: C

80. 用于消渴的中成药中可能添加的化学药成分是

A: 苯巴比妥

B: 吲哚美辛

C: 格列本脲

D: 阿卡波糖

答案: C

81. 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是()

A: 乳酶生片

B: 双歧三联活菌胶囊

C: 西地碘片

D: 硫普罗宁片

答案: B

82. 痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

A: 别嘌醇

B: 秋水仙碱

C: 阿司匹林

D: 丙磺舒

答案: D

83. 当药品存在安全隐患，需要进行召回时，决定召回药品的名称、规格、生产商、召回范围、召回级别、主要执行者等事宜的相关人员应该是

A: 药品质量安全管理小组成员

B: 药剂科负责人

C: 质量部人员

D: 业务院长

答案: A

84. 抗利尿药

A: 去氨加压素

B: 胃黏膜保护剂

C: 甘草合剂

D: 硝酸甘油

答案: A

85. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

- A: 钙剂可促进铁剂吸收
- B: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进其吸收
- C: 正常人维持体内铁平衡需要每日从食物中摄取铁 2~2.5mg
- D: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

答案：D

86. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

- A: 2 周
- B: 4 周
- C: 3 周
- D: 1 周

答案：A

87. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

- A: 沙奎那韦
- B: 恩夫韦替
- C: 扎西他滨
- D: 奈韦拉平

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/287032021046010024>