

2024 年贵州省天柱县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题真题题库附答案【名师推荐】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑对曲霉菌有效
- B: 氟康唑首次使用不需给予负荷剂量
- C: 氟康唑是肝药酶诱导剂
- D: 氟康唑用于治疗侵袭性念珠菌感染

答案：D

2. 物质代谢过程中催化“一碳单位”转移反应的辅酶组成成分是

- A: 维生素 A
- B: 维生素
- C: 叶酸
- D: 维生素 B1

答案：C

3. 某病人服用溴己新，不会出现下列哪种不良反应

- A: 心动过速
- B: 腹泻
- C: 支气管痉挛
- D: 体位性低血压

答案：B

4. 可使人体对维生素 B

- A: 异烟肼
- B: 雌激素
- C: 糖皮质激素
- D: 丙磺舒

答案：D

5. 麻黄碱滴鼻剂的适应证是

- A: 鼻黏膜充血
- B: 药物性鼻炎
- C: 过敏性鼻炎
- D: 萎缩性鼻炎

答案：A

6. 氨基糖苷类的作用特点是

- A: 口服给药可治疗全身性感染
- B: 在酸性环境中抗菌作用增强
- C: 日剂量一次给药可达到满意杀菌效果
- D: 只对繁殖期细菌有杀菌作用

答案：C

7. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 绿色
- B: 黑色
- C: 蓝色
- D: 红色

答案：B

8. 噻嗪类利尿药的作用部位是

- A: Na⁺-Cl⁻-共转运子
- B: 远曲小管近端
- C: Na⁺-K⁺-2Cl⁻-同向转运子
- D: 磷酸二酯酶

答案：B

9. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是

- A: 阿瑞吡坦
- B: 托烷司琼
- C: 甲氧氯普胺
- D: 维生素 B6

答案：C

10. (2018 年真题) 肾病综合征患者长期使用泼尼松时，用法为隔日清晨给药一次，这种给药方法的原理是 ()

- A: 利用糖皮质激素的脉冲式分泌原理
- B: 利用人体糖皮质激素分泌的昼夜节律性原理

C: 利用糖皮质激素与盐皮质激素互为补充的原理

D: 利用外源性糖皮质激素的生物等效原理

答案：B

11. 下列关于吉非替尼的描述，错误的是

A: 用药期间应监测肝肾功能

B: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

C: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

D: 与传统化疗药存在交叉耐药

答案：D

12. 可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

A: 替硝唑+华法林

B: 替硝唑+苯巴比妥

C: 奥硝唑+乙醇

D: 甲硝唑+乙醇

答案：B

13. 阿奇霉素()

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎

B: 用于非典型致病原感染

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

D: 肾毒性较大

答案：B

14. (2020 年真题) 通过选择性抑制 5-HT 再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度，从而增强 5-HT 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A: 度洛西汀

B: 阿米替林

C: 舍曲林

D: 吗氯贝胺

答案：C

15. 属于非噻吩并吡啶类二磷酸腺苷(ADP)P2Y₁₂受体阻断剂的是

A: 替罗非班

B: 双嘧达莫

C: 阿司匹林

D: 替格瑞洛

答案：D

16. (2019 年真题) 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

A: 奥美拉唑

B: 复方碳酸钙

C: 胶体果胶铋

D: 替普瑞酮

答案：A

17. 对氨基水杨酸抗结核菌作用原理是 ()

A: 形成 NAD 的同系物，抑制结核菌生长

B: 抑制 DNA 回旋酶

C: 干扰叶酸合成

D: 抑制蛋白质合成

答案：A

18. 属于环氧酶抑制剂的是

A: 乙酰唑胺

B: 双嘧达莫

C: 阿司匹林

D: 替格瑞洛

答案: C

19. 属于第四代头孢菌素的药物是()

A: 头孢吡肟

B: 头孢噻肟

C: 头孢哌酮

D: 头孢噻吩

答案: A

20. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A: 多巴胺受体阻断剂

B: H₂ 受体阻断剂

C: 5-HT₃ 受体阻断剂

D: 神经激肽（NK-1）受体阻断剂

答案: C

21. 下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

A: 氧化镁

B: 阿莫西林

C: 四环素类

D: 噻嗪类利尿剂

答案: D

22. (2019 年真题) 伴有炎性肠病、溃疡、胃肠道梗阻和腹部手术史的糖尿病患者，不宜使用的降糖药物是 ()

- A: 格列美脲
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 吡格列酮

答案: C

23. 乙酰半胱氨酸的祛痰作用机制是

- A: 直接分解痰中的黏蛋白，降低痰的黏性，易咳出
- B: 使痰量逐渐减少，产生化痰作用
- C: 恶心性祛痰作用
- D: 增强呼吸道纤毛运动，促使痰液排出

答案: A

24. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 多潘立酮
- B: 莫沙必利
- C: 胰酶
- D: 甲氧氯普胺

答案: C

25. (2018 年真题) 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是 ()

- A: 噻吗洛尔

- B: 毛果芸香碱
- C: 拉坦前列素
- D: 地匹福林

答案：D

26. 用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

- A: 克拉霉素
- B: 红霉素
- C: 万古霉素
- D: 克林霉素

答案：B

27. 卡泊三醇治疗银屑病的作用机制是

- A: 与维 A 酸细胞核受体有较高亲和力
- B: 通过角蛋白表达正常化，促进角质细胞末端分化
- C: 能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化，从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正
- D: 可抑制表皮细胞的有丝分裂，使皮肤增生速率恢复正常

答案：C

28. 酰胺醇类药的主要作用靶点是

- A: 细胞内膜 PBP
- B: 核糖体的 50S 亚基
- C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- D: 核糖体的 30S 亚基

答案：B

29. (2017 年真题) 主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是 ()

- A: 利血平
- B: 阿昔莫司
- C: 瑞舒伐他汀
- D: 依折麦布

答案: C

30. (2016 年真题) 用于治疗低磷血症的药物是

- A: 葡萄糖
- B: 碳酸钙
- C: 三磷酸腺苷
- D: 二磷酸果糖

答案: D

31. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是 ()

- A: 此类药物需在餐前即刻服用
- B: 此类药物可降低 2 型糖尿病患者的餐前血糖
- C: 此类药物不能单独服用
- D: 格列美脲属于本类药物

答案: A

32. (2018 年真题) 属于 M 胆碱受体阻断剂的平喘药是 ()

- A: 沙美特罗
- B: 茶碱
- C: 噻托溴铵
- D: 孟鲁司特

答案: C

33. 治疗 MRSA 的首选药物是

- A: 青霉素
- B: 林可霉素
- C: 四环素
- D: 万古霉素

答案：D

34. 氟尿嘧啶、卡培他滨属于()

- A: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- B: 核苷酸还原酶抑制剂
- C: DNA 多聚酶抑制剂
- D: 胸腺核苷合成酶抑制剂

答案：D

35. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60 / 40mmHg，血红蛋白 120g / L，白细胞 12×10^9 / L，血小板 30×10^9 / L，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒(正常值 13 秒)，骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

- A: 低分子肝素
- B: 维生素 C
- C: 鱼精蛋白
- D: 维生素 K1

答案：C

36. 应用强心苷期间或停用后 7 日内不宜使用的药物是

- A: 氯化钠

B: 枸橼酸钾

C: 氯化钙

D: 氯化钾

答案: C

37. 与多柔比星存在交叉耐药性的抗肿瘤药物是

A: 右雷佐生月德

B: 阿糖胞苷

C: 柔红霉素

D: 甲氨蝶呤

答案: C

38. 链霉素首选用于()

A: 钩端螺旋体病

B: 伤寒、副伤寒

C: 鼠疫、土拉菌病

D: 布鲁菌病

答案: C

39. 与磺胺甲噁唑具有协同抑菌和杀菌作用的是()

A: 磺胺嘧啶

B: 甲氧苄啶

C: 呋喃唑酮

D: 诺氟沙星

答案: B

40. 下列属于 β 受体阻断剂的是

A: 卡托普利

B: 美托洛尔

C: 阿利吉仑

D: 螺内酯

答案: B

41. 属于多烯类的是

A: 制霉菌素

B: 卡泊芬净

C: 氟胞嘧啶

D: 特比萘芬

答案: A

42. 糖皮质激素用于某些慢性病的长期疗法中，采用隔日 1 次给药法，将 48 小时用量一次服用，合适的时间是

A: 下午 3 时

B: 上午 8 时

C: 中午 12 时

D: 下午 6 时

答案: B

43. 属于 5α 还原酶抑制剂的是

A: 度他雄胺

B: 坦洛新

C: 西地那非

D: 他达拉非

答案: A

44. 下列不属于一线抗结核药的是

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 吡嗪酰胺
- D: 对氨基水杨酸

答案：D

45. 对小肠和结肠平滑肌无明显作用的促胃肠动力药是

- A: 多潘立酮
- B: 西沙比利
- C: 甲氧氯普胺
- D: 伊托必利

答案：A

46. 属于 M 期细胞周期特异性的抗肿瘤药是

- A: 长春碱
- B: 阿糖胞苷
- C: 氮芥
- D: 顺铂

答案：A

47. 艾达司珠单抗可用来解救

- A: 肝素
- B: 达比加群
- C: 华法林
- D: 阿哌沙班

答案：B

48. 肝功能不全、哺乳期妇女禁用()

- A: 夫西地酸
- B: 四环素可的松
- C: 氯霉素
- D: 利福平

答案：A

49. 主要不良反应为踝部关节水肿，晨轻午重的药物是

- A: 卡托普利
- B: 地高辛
- C: 氨氯地平
- D: 硝酸甘油

答案：C

50. (2021 年真题) 属于烷化剂，能破坏 DNA 的抗肿瘤药物是 ()

- A: 长春新碱
- B: 来曲唑
- C: 厄洛替尼
- D: 环磷酰胺

答案：D

51. 下述保肝药物中可导致低钾血症的是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 复方甘草酸苷
- D: 门冬氨酸鸟氨酸

答案：C

52. 下列药物中，属于非二氢吡啶类钙通道阻滞剂药物的是 ()。

- A: 尼莫地平
- B: 氨氯地平
- C: 维拉帕米
- D: 硝苯地平

答案：C

53. (2020 年真题) 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药物是

- A: 硫酸镁
- B: 乳酸钠
- C: 氯化铵
- D: 氯化钠

答案：B

54. 典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

- A: 亚叶酸钙
- B: 卡铂
- C: 奥沙利铂
- D: 顺铂

答案：D

55. 抑制 DNA 回旋酶和拓扑异构酶 IV 的抗菌药是()

- A: 喹诺酮类
- B: 甲硝唑
- C: 四环素
- D: 苯唑西林

答案：A

56. 毛果芸香碱的作用特点不包括

- A: 术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用
- B: 用于白内障人工晶状体植入手术中缩瞳
- C: 收防止激光手术后的反应性眼压升高
- D: 减少房水生成

答案：D

57. 以下关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是

- A: 可杀灭痤疮丙酸杆菌
- B: 可导致皮肤干燥，脱屑
- C: 为强还原剂，极易分解
- D: 可分解出新生态氧而发挥作用

答案：C

58. 下列药物可用于治疗小细胞肺癌首选的是

- A: 奥沙利铂
- B: 长春新碱
- C: 替尼泊苷
- D: 依托泊苷

答案：D

59. 甲羟孕酮口服用于功能性闭经的用法用量是

- A: 于月经后半周期(撤退性出血的第 16~25 日)开始口服，一次 10mg，一日 1 次，连用 10~14 日，酌情应用 3~6 个周期
- B: 口服，一次 10~20mg，每 4~8 小时一次，连用 2~3 日；血止后每隔 3 日递减 1/3 剂量，直至维持量每日 100mg，连续用药至血止后 21 日停药
- C: 口服一日 4~8mg，连服 5~10 日
- D: 一日 30mg，连服 6 个月

答案：C

60. 主要作用于聚合态的微管，抑制微管解聚

A: 高三尖杉酯碱

B: 顺铂

C: 氟尿嘧啶

D: 紫杉醇

答案：D

61. (2016 年真题) 鱼精蛋白可用于救治

A: 吗啡过量导致的呼吸抵制

B: 华法林过量导致的出血

C: 肝素过量导致的出血

D: 异烟肼中毒导致的神经毒性

答案：C

62. 减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状其所激动的受体是 ()

A: α 受体

B: H 受体

C: N 受体

D: M 受体

答案：A

63. 发热需采用非甾体抗炎药时，应首选

A: 双氯芬酸

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 布洛芬

答案：B

64. 通过影响葡萄膜巩膜通道促进房水流出的的是

- A: 拟胆碱药
- B: 前列腺素衍生物
- C: 碳酸酐酶抑制剂
- D: α_2 受体激动剂

答案：B

65. 作用机制是抗代谢的是

- A: 紫杉醇
- B: 巯嘌呤
- C: 吉非替尼
- D: 枸橼酸他莫昔芬

答案：B

66. 抑制心肌收缩力、延长 APD 及 ERP 的药物是()

- A: 苯妥英钠
- B: 奎尼丁
- C: 美西律
- D: 利多卡因

答案：B

67. 长期大剂量服用可产生欣快感，可能出现药物依赖性的具有阿片样作用的止泻药是

- A: 地芬诺酯
- B: 蒙脱石散
- C: 硫酸镁

D: 洛哌丁胺

答案: A

68. 利伐沙班的药理作用是

A: 抑制已与纤维蛋白结合的凝血酶

B: 抑制游离凝血酶

C: 抑制血小板聚集

D: 阻止了 Xa 对凝血酶原的作用

答案: D

69. 预防急性肾衰竭可选用

A: 螺内酯

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 乙酰唑胺

答案: B

70. 糖皮质激素在临床上一般不用于

A: 中毒性感染

B: 全身性红斑狼疮

C: 真菌感染

D: 支气管哮喘

答案: C

71. (2021 年真题) 关于钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 (SLG-2) 抑制剂达格列净作用特点和不良反应的说法, 错误的是 ()

A: 重度肾功能不全患者禁用

B: 降糖作用不依赖于胰岛 B 细胞的功能及机体对胰岛素的敏感性

C: 适用于 1 型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒

D: 降糖效果受肾小球滤过的葡萄糖负荷的影响

答案: C

72. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

A: 多柔比星

B: 氟尿嘧啶

C: 伊立替康

D: 多西他赛

答案: A

73. 糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

A: 甘油

B: 硫酸镁

C: 聚乙二醇 4000

D: 乳果糖

答案: A

74. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗，体征和实验室检查，白细胞计数 $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)。

滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)。

A: 乙琥胺

B: 地西泮

C: 丙戊酸钠

D: 左乙拉西坦

答案: C

75. 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是

- A: 氨甲环酸
- B: 依诺肝素
- C: 华法林
- D: 达比加群酯

答案：C

76. 磺酰脲类药物的不良反应不包括

- A: 诱发甲亢
- B: 粒细胞减少
- C: 肝炎
- D: 口中金属味

答案：A

77. 不易导致便秘和腹泻不良反应的抗酸药是

- A: 铝碳酸镁
- B: 碳酸钙
- C: 三硅酸镁
- D: 氢氧化铝

答案：A

78. ACEI 与其联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸和血糖的不良影响的是()

- A: β 受体阻断药
- B: 留钾利尿药
- C: 噻嗪类利尿药
- D: 人促红素

答案：C

79. 可以降低血尿酸水平，但升高尿尿酸水平而导致肾结石的抗痛风药是

- A: 别嘌醇
- B: 丙磺舒
- C: 秋水仙碱
- D: 呋塞米

答案：B

80. 血肌酐升至

- A: 大于 $7\text{ }\mu\text{mol/L}$
- B: 大于 6mmol/L
- C: 大于 $265\text{ }\mu\text{mol/L}$
- D: 大于 $172\text{ }\mu\text{mol/L}$

答案：C

81. 急性室性心律失常可选用

- A: 美西律
- B: 利多卡因
- C: 阿托品
- D: 硝苯地平

答案：B

82. 餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 铝碳酸镁
- C: 兰索拉唑
- D: 米索前列醇

答案：B

83. (2019 年真题) 患者，男，67 岁，为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者，如果使用复方磺胺甲噁唑，可能引发的药源性疾病是 ()

- A: 急性溶血性贫血
- B: 红人综合征
- C: 抗生素相关性腹泻
- D: 肌肉震颤

答案：A

84. 对丙咪嗪过敏的患者禁用

- A: 氨己烯酸
- B: 丙戊酸钠
- C: 卡马西平
- D: 苯妥英钠

答案：C

85. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

- A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状
- B: 碱化尿液，促进尿酸排泄
- C: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- D: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿酸量

答案：A

86. 可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，适用于各种原因引起的刺激性干咳的药物是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/287065055050010024>