

肝胆外科专科知识习题含答案

一、单选题（共 60 题，每题 1 分，共 60 分）

1、肝硬化腹水呈血性时最先考虑并发

- A、结核性腹膜炎
- B、门静脉血栓形成
- C、原发性腹膜炎
- D、原发性肝癌
- E、肝肾综合症

正确答案：D

2、男性，39 岁，8 超和 C.T 检查发现右肝 3cm×5cm 占位性病变，性质不明，A. FP 阴性。哪项检查 对明确诊断最有帮助

- A、肝脏穿刺+病理学检查
- B、肝动脉造影
- C、CT 检查
- D、动态观察 A. FP 变化
- E、MRI 检查

正确答案：A

3、胆道结石并发急性胰腺炎最合适的治疗是

- A、立即手术
- B、非手术治疗缓解后，可择期手术治疗
- C、做好术前准备后再手术
- D、中西医结合治疗
- E、抗感染，对症处理

正确答案：B

4、下列有关术后病人不适的原因和处理，叙述不正确的是（ ）

- A、应有效解除术后疼痛
- B、术后尿潴留可引起泌尿系统感染
- C、严重腹胀需及时处理
- D、如发热持续不退可能为并发症所致
- E、顽固性呃逆时应使用镇静剂控制

正确答案：E

5、PN 宜现用现配，应在（ ）内输注完毕。

- A、12h
- B、96h

C、24h

D、48h

E、72h

正确答案：C

6、下列哪一项不是放置 T 形管引流的目的

A、引流残余结石

B、有利于腹壁伤口愈合

C、防止胆道狭窄

D、有利于胆汁引流

E、防止胆汁渗漏

正确答案：B

7、下列哪一项不是门静脉高压症病人术前的护理诊断

A、有出血的危险

B、体液过多

C、焦虑

D、疼痛

E、营养失调, 低于机体需要量

正确答案：D

8、预防急性胰腺炎有重要意义的措施是

A、经常应用抗生素预防感染

B、控制糖尿病

C、防治胆道疾病

D、注意饮食卫生

E、经常服用消化酶类药物

正确答案：C

9、引起急性胰腺炎的主要病理机制为

A、胰腺的自我消化

B、消化酶生成过多

C、细胞自溶

D、组织细胞破坏

E、消化酶缺乏

正确答案：A

10、门静脉高压症最危险的并发症是

A、脾功能亢进

- B、食管胃底静脉曲张破裂出血
- C、全血细胞减少
- D、肝性脑病
- E、腹水

正确答案：B

11、门静脉的正常压力是

- A、15~25cmH₂O
- B、14~24cmH₂O
- C、13~24cmH₂O
- D、15~24cmH₂O
- E、13~25cmH₂O

正确答案：C

12、5 LC 常采用何种气体建立气腹

- A、一氧化碳
- B、氧气
- C、二氧化碳
- D、氯气

正确答案：C

13、在急性胰腺炎病人中，血钙<1.75mmol/L，常提示

- A、甲状旁腺功能亢进
- B、病情好转
- C、病情平稳
- D、甲状旁腺功能低下
- E、病情严重

正确答案：E

14、胆总管结石合并胆管炎病人非手术治疗期间，出现下列哪项表现，应立即做好急诊手术前准备（ ）

- A、白细胞计数增高
- B、体温升高，脉速
- C、胆囊肿大，有压痛
- D、黄疸进行性加深
- E、低血压、意识不清

正确答案：E

15、若门静脉高压症病人发生柏油样黑便，未呕血，估计出血量为

A、100ml

B、250ml

C、60ml

D、150ml

E、70ml

正确答案：C

16、女性，58 岁。反复出现剑突下疼痛、寒战高热、黄疸近 10 年，根据 C. harcot 三联症典型表现，应考虑的疾病是

A、胆囊结石

B、肝内胆管结石

C、胆总管结石

D、慢性胆囊炎

E、慢性胰腺炎

正确答案：B

17、原发性和继发性肝癌的主要鉴别方法是

A、 γ -谷酰转酞酶测定

B、肝脏肿块的大小

C、反复测定肝功能试验

D、有无原发性癌肿病灶

E、甲胎蛋白测定

正确答案：D

18、男性，35 岁，高热，右上腹疼痛 10 天，B 超：肝脏肿大，肝右叶 5*6cm 不均质低回声区，CT 示肝右叶不均质回声团块，增强后周边有强化，该病诊断为

A、肝脓肿

B、肝血管瘤

C、肝囊肿

D、肝血管瘤

E、原发性肝癌

正确答案：A

19、出现夏柯三联征的胆道疾病是

A、急性胆囊炎

B、胆管结石并胆管炎

C、萎缩性胆囊炎

- D、胆囊结石
- E、肝内胆管结石

正确答案：B

20、急症胰腺炎最常见的并发症是

- A、休克
- B、化脓性腹膜炎
- C、胰周围脓肿
- D、急性肾功能衰竭
- E、败血症

正确答案：A

21、肝癌切除术后发生胆漏并发症的时间通常是

- A、术后 7-10 天
- B、术后 5-7 天
- C、术后 2 周
- D、术后 3-4 天
- E、术后 4-5 天

正确答案：B

22、肝 V 段位于

- A、左内侧叶
- B、右前叶
- C、左外侧叶
- D、右后叶
- E、尾状叶

正确答案：B

23、各种休克的共同病理生理改变是()

- A、血压下降
- B、血管张力降低
- C、脉压缩小
- D、有效循环血量锐减
- E、中心静脉压下降

正确答案：D

24、下列急性胰腺炎的治疗措施,应禁用

- A、抗胆碱能药物
- B、生长抑素

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

C、胰岛素

D、吗啡

E、钙剂

正确答案：D

25、急性胰腺炎非手术治疗过程中禁食与胃肠减压时间为

A、2d

B、2~3 周

C、3~5d

D、1 个月

E、4 周

正确答案：B

26、肝血液供应 75%来自

A、肝窦血供

B、肠系膜上动脉

C、肝动脉

D、门静脉

E、胃底动脉

正确答案：D

27、细菌性肝脓肿最多见的致病菌是

A、金黄色葡萄球菌

B、铜绿假单胞菌

C、大肠埃希菌

D、脆弱类杆菌

E、溶血性链球菌

正确答案：C

28、肝硬化最常见的死亡原因

A、自发性腹膜炎

B、肝性昏迷

C、原发性肝癌

D、肝性昏迷

E、肝肾综合症

正确答案：D

29、如果直径<2cm 的肝癌,最好的定位方法是

A、选择性腹腔动脉造影术

- B、选择性放射性核素扫描
- C、B. 超检查
- D、胆道造影术
- E、肝穿刺术

正确答案：A

30、腹部外伤后脐上方疼痛,坐位时减轻而俯卧时加重,受累器官最可能为

- A、肝脏
- B、胰腺
- C、肾上腺
- D、脾脏
- E、肾脏

正确答案：B

31、门静脉高压时常行贲门周围血管离断术以阻断门奇静脉间的反常血流,其中不是在该手术中被切断的血管是()。

- A、胃短静脉
- B、左膈下静脉
- C、胃后静脉
- D、冠状静脉
- E、胃下静脉

正确答案：E

32、原发性肝癌最有效的治疗方法是

- A、肝移植术
- B、手术切除
- C、化疗
- D、射频消融术
- E、介入治疗

正确答案：B

33、脾切除术后病人出现腹痛腹胀应考虑

- A、肠胃道感染
- B、肠系膜血栓形成
- C、属于正常现象
- D、术后肠梗阻
- E、腹腔感染

正确答案：B

34、腹部手术数日后反复呕吐，最可能的原因是（ ）

- A、低钾低钠
- B、急性胃扩张
- C、颅内压升高
- D、尿毒症
- E、酮症酸中毒

正确答案：B

35、急性胰腺炎时，血清淀粉酶升高的规律是

- A、发病后 3~12 小时开始升高，24~48 小时达高峰
- B、发病后 2 小时开始升高，12~24 小时达高峰
- C、发病后 24 小时开始升高，48 小时达高峰
- D、发病后 24 小时开始升高，72 小时达高峰
- E、发病后 48 小时开始升高，72 小时达高峰

正确答案：A

36、应用最广泛、简易的诊断急性胰腺炎的方法是

- A、B 超
- B、MRI
- C、血清钙测定
- D、血气分析
- E、血、尿淀粉酶测定

正确答案：E

37、关于水肿性胰腺炎，下列哪一项是错误的

- A、血清淀粉酶增高
- B、轻度黄疸
- C、恶心呕吐
- D、脐周出现青紫淤斑
- E、持续性疼痛，阵发性加剧

正确答案：D

38、下列哪项与胆道蛔虫症的转归无关

- A、并发肝脓肿
- B、诱发胆管癌
- C、并发胆管出血
- D、急性胰腺

E、诱发阻塞性胆管炎

正确答案：B

39、半肝以上切除的病人需间歇吸氧目的是

A、提高肝脏氧供给保护肝功能

B、提高脑组织的氧供给

C、改善呼吸功能

D、改善循环功能

E、以上都是

正确答案：A

40、胆道结石并胰腺炎的治疗

A、抗感染,对症处理

B、非手术治疗不缓,进一步手术治疗

C、中西医结石治疗

D、做好术前准备后再手术

E、立即手术

正确答案：B

41、下列属于门静脉系统的是

A、肾上腺静脉

B、卵巢静脉

C、肠系膜下静脉

D、直肠下静脉

E、髂内静脉

正确答案：C

42、女,50岁,寒战、发热、上腹痛、黄疸。此患者首先应考虑()。

A、胆囊积水

B、急性化脓性阑尾炎

C、病毒性肝炎

D、急性胰腺炎

E、胆总管结石

正确答案：E

43、ERCP术后最严重的并发症是

A、出血

B、十二指肠穿孔

C、胆道感染

- D、胰管感染
- E、急性胰腺炎

正确答案：E

44、夏柯综合征的典型表现次序为

- A、黄疸, 寒战高热, 腹痛
- B、寒战高热, 腹痛, 黄疸
- C、寒战高热, 黄疸, 腹痛
- D、腹痛, 寒战高热, 黄疸
- E、腹痛, 黄疸, 寒战高热

正确答案：D

45、门静脉高压症病人在手术前不放置胃管, 主要原因是

- A、易损伤食管曲张静脉
- B、容易丢失消化液
- C、容易引起呕吐
- D、影响胃肠功能
- E、影响病人休息

正确答案：A

46、输入下列哪种溶液时速度宜慢（ ）

- A、5%葡萄糖溶液
- B、抗生素
- C、保肝药
- D、甘露醇
- E、升压药

正确答案：E

47、食管静脉曲张时, 门静脉压力大多数为

- A、17~20cmH₂O
- B、11~13cmH₂O
- C、16~18cmH₂O
- D、14~16cmH₂O
- E、8~10cmH₂O

正确答案：A

48、男性, 45 岁, 10 年前有乙型肝炎病史, 因呕血、黑便, 伴头晕出冷汗而入院, 经治疗后出血停止, 但出现低蛋白血症和腹水, 经常 SGP 升高, 择期手术治疗的最主要目的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288001054112007041>