

2024 年甘肃省临夏县《执业药师之西药学专业二》资格考试题库带答案（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2020 年真题）克罗米通乳膏用于治疗

- A: 体、股癣
- B: 疥疮
- C: 寻常痤疮
- D: 蛲虫感染

答案：B

2. 口服避孕药的禁忌证不包括()

- A: 甲状腺功能减退
- B: 激素依赖性肿瘤
- C: 不明原因阴道出血
- D: 重度肝功能不全

答案：A

3. 维生素 C 缺乏时引起

- A: 坏血病
- B: 脚气病
- C: 成人佝偻病
- D: 角膜软化症

答案：A

4. 不宜与三环类抗抑郁药合用的药物是

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 赛洛唑啉滴鼻液
- C: 羟甲唑啉滴鼻液
- D: 麻黄碱滴鼻液

答案：D

5. 高钠血症是指

- A: 血钠 $>135\text{mmol/L}$
- B: 血钠 $>145\text{mmol/L}$
- C: 血钠 $>130\text{mmol/L}$
- D: 血钠 $>140\text{mmol/L}$

答案：B

6. 对凝血的各环节均有作用，体内外均有抗凝作用，可防止急性血栓形成而成为对抗血栓的首选的抗凝血药是()。

- A: 磺达肝葵钠
- B: 阿哌沙班
- C: 依诺肝素
- D: 水蛭素

答案：C

7. 下列药物中，与维生素 D 合用能出现高钙血症的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 矿物油
- C: 考来烯胺
- D: 硫酸铝

答案：A

8. 用于肿瘤化疗引起的中性粒细胞减少症的药物是()

- A: 利可君
- B: 沙格司亭
- C: 糖皮质激素
- D: 非格司亭

答案: D

9. 通过选择性抑制 5α -还原酶而抑制前列腺增生的药物是

- A: 依立雄胺
- B: 特拉唑嗪
- C: 甲睾酮
- D: 哌唑嗪

答案: A

10. (2019 年真题) 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药物是()

- A: 复方醋酸环内孕酮 ($35\mu\text{g}/2\text{mg}$)
- B: 炔雌醇去氧孕烯 ($30\mu\text{g}/150\mu\text{g}$)
- C: 十一酸睾酮 (40mg)
- D: 左炔诺孕酮 (1

答案: D

11. 双香豆素与保泰松合用可

- A: 与其竞争结合血浆蛋白
- B: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- C: 竞争性对抗
- D: 产生协同作用

答案: A

12. (2018 年真题) 肝素过量所致出血的解救药物是 ()

- A: 维生素 K
- B: 鱼精蛋白
- C: 酚磺乙胺
- D: 蛇毒血凝酶

答案: B

13. 服用伊马替尼的时间是

- A: 睡前
- B: 餐前 1 小时
- C: 进餐时
- D: 餐后 2 小时

答案: C

14. 可用于烧伤及伤后感染的是 ()

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 磺胺嘧啶
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺米隆

答案: B

15. 头孢拉定 ()

- A: 肾毒性大
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- D: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

答案: A

16. (2019 年真题) 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是 ()

- A: 二甲双胍
- B: 螺内酯
- C: 美司钠
- D: 氯化钾

答案: C

17. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下, 请结合问题作答。

- A: 患者，男，47 岁，诊断为高血压，生活方式干预无效，随机血压 155/95mmHg
- B: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭，LVEF=35%，血压 120/65mmHg
- C: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭伴高钾血症 (血 K⁺5)
- D: 患者，男，47 岁，诊断为难治性高血压，使用依那普利、氯氯噻嗪、氨氯地平治疗仍未达标

答案: B

18. 蒙脱石散是

- A: 抗分泌药
- B: 抗动力药
- C: 吸附剂
- D: 微生态制剂

答案: C

19. 属于阴道杀精药的是

- A: 米非司酮

- B: 氯地孕酮
- C: 壬苯醇醚
- D: 左炔诺孕酮

答案: C

20. 全身性红斑狼疮宜用

- A: 倍他米松
- B: 氢化可的松
- C: 泼尼松
- D: 地塞米松

答案: C

21. 下列药物中通过促进纤维蛋白溶解的药物是

- A: 噻氯匹定
- B: 尿嘧啶
- C: 氨甲苯酸
- D: 链激酶

答案: D

22. (2016 年真题) 12 岁以下儿童禁用的非甾体抗炎药是

- A: 阿司匹林
- B: 尼美舒利
- C: 双氯芬酸
- D: 塞来昔布

答案: B

23. (2016 年真题) 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是

- A: 替米沙坦

B: 坦洛新（坦索罗辛）

C: 哌唑嗪

D: 依那普利

答案：A

24.（2018 年真题）不易发生“双硫仑样”反应的药物是（）

A: 头孢曲松

B: 头孢哌酮

C: 头孢他啶

D: 头孢替安

答案：C

25. 与吗啡合用可发生严重的、甚至致死的不良反应，包括躁狂、多汗、僵直、呼吸抑制、昏迷、惊厥和高热的药物是

A: 苯巴比妥

B: 吗氯贝胺

C: 丙戊酸钠

D: 氯硝西洋

答案：B

26.（2018 年真题）属于 β_2 受体激动剂的平喘药是（）

A: 孟鲁司特

B: 茶碱

C: 噻托溴铵

D: 沙美特罗

答案：D

27. 华法林是消旋体，由 S-华法林和 R-华法林组成，二者的抗凝作用是

- A: S-华法林的抗凝作用约是 R-华法林的 5 倍
- B: R-华法林的抗凝作用约是 S-华法林的 5 倍
- C: 二者抗凝作用等效
- D: 二者抗凝作用关系不确定

答案：A

28. 可致肌痛、骨关节病损、跟腱断裂的药物

- A: 氟喹诺酮类
- B: 大环内酯类
- C: 四环素类
- D: 氨基糖苷类

答案：A

29. 慢性肾上腺皮质功能减退症宜用

- A: 倍他米松
- B: 泼尼松
- C: 氢化可的松
- D: 地塞米松

答案：C

30. 可用于治疗伤寒的药物是

- A: 氟喹诺酮类
- B: 四环素类
- C: 青霉素类
- D: 氨基糖苷类

答案：A

31. 阿哌沙班属于

- A: 促凝血因子合成药
- B: 凝血因子 Xa 抑制剂
- C: 维生素 K 拮抗剂
- D: 直接凝血酶抑制剂

答案：B

32. 治疗期间避免使用含磨砂剂的化妆品的药物()

- A: 异维 A 酸
- B: 维 A 酸
- C: 阿达帕林
- D: 壬二酸

答案：B

33. 以下患者中可以使用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)的是()

- A: 孕妇
- B: 高钾血症患者
- C: 双侧肾动脉狭窄患者
- D: 高血压患者和心力衰竭患者

答案：D

34. 特布他林属于

- A: 黄嘌呤类药物
- B: M 胆碱受体阻断剂
- C: 白三烯调节剂
- D: β 肾上腺素受体激动剂

答案：D

35. 属于 β 受体激动剂的非强心苷类的正性肌力药是()

- A: 多巴酚丁胺
- B: 米力农
- C: 地高辛
- D: 依那普利

答案: A

36. 患者，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应选

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 奈替米星
- D: 阿莫西林

答案: A

37. 仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

- A: 雷洛昔芬
- B: 降钙素
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 骨化三醇

答案: A

38. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药的是()。

- A: 索他洛尔
- B: 美托洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 利多卡因

答案：D

39. 缓解轻、中度急性哮喘症状的首选药是

- A: 特布他林
- B: 福莫特罗
- C: 丙卡特罗
- D: 沙美特罗

答案：A

40. (2015 年真题) 长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充 ()。

- A: 维生素 B 和维生素 K
- B: 维生素 E 和叶酸
- C: 维生素 A 和维生素 D
- D: 维生素 C 和烟酸

答案：A

41. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 硝酸甘油+美托洛尔
- B: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪
- C: 氨氯地平+氢氯噻嗪
- D: 利血平+氨苯蝶啶

答案：C

42. 唑来膦酸静脉给药输注的时间应在

- A: 30 分钟以上
- B: 5 分钟以上
- C: 15 分钟以上
- D: 60 分钟以上

答案：C

43. 具有心脏毒性的抗肿瘤药物

- A: 长春新碱
- B: 紫杉醇
- C: 柔红霉素
- D: 博来霉素

答案：C

44. 1~5 岁儿童甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

- A: $5\mu\text{g} / \text{kg}$
- B: $25\mu\text{g}$
- C: $4\mu\text{g} / \text{kg}$
- D: $6\mu\text{g} / \text{kg}$

答案：A

45. 左甲状腺素成人维持量是

- A: 55-75ug
- B: 75-125ug
- C: 125ug
- D: 25-75ug

答案：B

46. 氟替卡松吸入气雾剂用于中度哮喘时的用法和用量为

- A: 一次 250~500 μg ，一日 2 次
- B: 一次 100~250 μg ，一日 2 次
- C: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次
- D: 一次 50~100 μg ，一日 2 次

答案：A

47. 通过降低血管平滑肌内钠离子浓度，使细胞内钙离子减少的是

- A: 拉贝洛尔
- B: 卡托普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 肼屈嗪

答案：C

48. 淋巴细胞白血病采用

- A: 糖皮质激素小剂量代替疗法
- B: 糖皮质激素一般剂量长期疗法
- C: 抗结核病药与糖皮质激素合用
- D: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

答案：B

49. 作用于细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 磺胺甲唑
- B: 呋喃妥因
- C: 甲氧苄啶
- D: 利奈唑胺

答案：A

50. 可用于单纯疱疹性角膜炎的药物是

A: 20%甘露醇

B: 阿托品

C: 奥布卡因

D: 碘苷

答案: D

51. 分泌盐皮质激素的是

A: 束状带

B: 网状带

C: 球状带

D: 束状带和网状带

答案: C

52. (2020 年真题) 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

A: 消化道反应

B: 肾毒性

C: 肝毒性

D: 神经毒性

答案: D

53. 甲氧沙林属于

A: 肾上腺皮质激素类

B: 其他光敏剂

C: 重金属元素及其化合物

D: 补骨脂素及其衍生物

答案: D

54. (2020 年真题) 长期使用可引起维生素 B12 缺乏的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 头孢哌酮
- C: 阿司匹林
- D: 华法林

答案：A

55. 对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

- A: 咪康唑
- B: 阿昔洛韦
- C: 红霉素
- D: 庆大霉素

答案：A

56. 属于硝基呋喃类的是()

- A: 甲硝唑
- B: 呋喃妥因
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 夫西地酸

答案：B

57. 下列关于睾酮替代治疗的描述，正确的是()

- A: 可直接改善勃起功能障碍
- B: 通过提高性欲治疗继发性勃起功能障碍
- C: 不能改善性腺功能低下
- D: 对年轻患者的作用较老年患者更显著

答案：B

58. (2015 年真题) 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是()。

- A: 青蒿素
- B: 伯氯喹
- C: 奎宁
- D: 氯喹

答案：A

59. 控制哮喘急性发作的首选药是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: M 胆碱受体阻断剂
- D: β 受体激动剂

答案：D

60. 服用二甲双胍期间应注意()

- A: 无需控制饮食
- B: 肝功能不全患者无需调整剂量
- C: 初始治疗可大剂量给药
- D: 服药期间不可饮酒

答案：D

61. 因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是()

- A: 吲哚美辛
- B: 阿司匹林
- C: 塞来昔布
- D: 双氯芬酸

答案：C

62. (2019 年真题) 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而起到抗抑郁作用的药物是 ()

- A: 马普替林
- B: 度洛西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 帕罗西汀

答案: D

63. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

- A: 孟鲁司特
- B: 噻托溴铵
- C: 沙美特罗
- D: 多索茶碱

答案: B

64. 以下关于去羟肌苷使用的叙述，错误的是

- A: 同时服用含镁和铝的抗酸药物会加重不良反应
- B: 酮康唑和伊曲康唑需至少在服用本品前两小时服用
- C: 注意外周神经病变，待神经中毒症状消退后患者仍能耐受减量的本品治疗
- D: 用药过量无已知的解毒药，但可以通过腹膜透析排出

答案: D

65. 用于过敏性休克的是 ()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 熊去氧胆酸
- C: 阿托品
- D: 肾上腺素

答案：D

66. 临床最常用的强心苷类正性肌力药是

- A: 多巴酚丁胺
- B: 地高辛
- C: 米力农
- D: 依那普利

答案：B

67. 口服可用于防治血栓性疾病如心肌梗死和脑梗死的是

- A: 维生素 B
- B: 维生素 K
- C: 香豆素类
- D: 肝素

答案：C

68. 氯沙坦的降压作用机制是

- A: 阻断 β 受体
- B: 阻断 AT₂ 受体
- C: 阻断 α 受体
- D: 阻断 AT₁ 受体

答案：D

69. 下列不属于胃肠解痉药的是

- A: 阿托品
- B: 山莨菪碱
- C: 多潘立酮
- D: 颠茄

答案：C

70. 治疗蛲虫病的首选药是()。

- A: 阿苯达唑
- B: 甲硝唑
- C: 吡喹酮
- D: 噻嘧啶

答案：A

71. 抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 静脉用胰岛素
- D: 二甲双胍

答案：C

72. 可用于降低眼压的药物是()

- A: 左氧氟沙星
- B: 卡替洛尔
- C: 阿托品
- D: 利福平

答案：B

73. 关于甲氨蝶呤，下列说法中错误的是

- A: 是二氢叶酸合成酶抑制剂
- B: 主要用于治疗急性白血病
- C: 强酸条件下的水解产物是谷氨酸和蝶呤酸
- D: 是二氢叶酸还原酶抑制剂

答案：A

74. 是 β -内酰胺酶抑制剂，常与青霉素组成复方制剂的是()

- A: 美罗培南
- B: 克拉维酸
- C: 氨曲南
- D: 他唑巴坦

答案：B

75. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 干扰素
- B: 阿昔洛韦
- C: 阿糖腺苷
- D: 奥司他韦

答案：B

76. 可用于治疗精神分裂症的是

- A: 氯丙嗪
- B: 硫酸镁
- C: 卡马西平
- D: 地西泮

答案：A

77. 作用于二氢叶酸合成酶，干扰叶酸合成的第一步的是

- A: 替硝唑
- B: 甲氧苄啶 (TMP)
- C: 磺胺甲噁唑 (SMZ)
- D: 莫西沙星

答案：C

78. 关于 α 葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

- A: 口服吸收很少
- B: 易导致低血糖
- C: 可单用于老年患者或餐后高血糖患者
- D: 临床用于各型糖尿病

答案：B

79. 催眠药应()

- A: 睡前内服
- B: 饭前内服
- C: 空腹内服
- D: 定时内服

答案：A

80. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

- A: 依托泊苷
- B: 顺铂
- C: 来曲唑
- D: 紫杉醇

答案：A

81. 以下关于非磺酰脲类促胰岛素分泌药使用的叙述，错误的是

- A: 常见不良反应是低血糖和体重增加
- B: 可以作为初始治疗，用于不能耐受二甲双胍或磺酰脲类药物或存在使用这些药物的禁忌证患者，尤其是有低血糖风险的慢性肾脏病患者

C: 对磺酰脲类敏感性差或效果不佳者可换此类药物，也可与磺酰脲类联合应用

D: 瑞格列奈无肾脏功能不全者使用的禁忌，在体内无蓄积，适用于老年和糖尿病肾病者

答案：C

82. (2016 年真题) 不属于口服避孕药所致不良反应的是

A: 低钙血症

B: 月经失调

C: 突破性出血

D: 增加血栓栓塞性疾病风险

答案：A

83. 长期、单一应用 β

A: 头痛

B: 耐药性

C: 支气管痉挛

D: 暂时性低血糖

答案：B

84. 磷酸二酯酶III抑制剂 (PDEIII抑制剂) 是

A: 地高辛

B: 多巴酚丁胺

C: 米力农

D: 依那普利

答案：C

85. 对淋病、梅毒可作为首选的是

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 土霉素
- D: 红霉素

答案：B

86. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 1 周
- B: 2 周
- C: 4 周
- D: 3 周

答案：B

87. 为了保护亚胺培南，防止其在肾中破坏，应与其配伍的药物是()

- A: 西司他丁
- B: 他唑巴坦
- C: 克拉维酸
- D: 舒巴坦

答案：A

88. 对视觉起作用的是

- A: 视黄醛
- B: 维生素 A
- C: 视黄酸
- D: 视黄醇

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/288017066044007022>