

2024 年河南省管城回族区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试完整题库有答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 一个安全、有效、稳定、经济的药品，其基本前提必须是

- A: 有明确的适应证
- B: 质量合格
- C: 有明确的使用对象
- D: 临床急需

答案：B

2. 大量或长期使用抗生素可能导致

- A: 血白细胞减少
- B: 粪便细胞显微镜检查检出真菌
- C: 血清血红蛋白升高
- D: 血清总胆固醇升高

答案：B

3. 洋地黄中毒引起的快速性心律失常，首选下列哪种药物

- A: 普鲁卡因胺
- B: 阿托品
- C: 普萘洛尔
- D: 苯妥英钠

答案：D

4. 隔日一次的外文缩写

A: q4h

B: qod

C: qn

D: tid

答案：B

5. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500mol/L；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

A: 对乙酰氨基酚

B: 阿司匹林

C: 尼美舒利

D: 布洛芬

答案：A

6. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差（）

A: 乳酸亚铁（2 价铁）

B: 琥珀酸亚铁（2 价铁）

C: 枸橼酸铁（3 价铁）

D: 右旋糖酐铁（2 价铁）

答案：C

7. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

A: 涂片、培养鉴定

B: 临床治疗方案

C: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）

D: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

答案：B

8. 以下哪项不是药物流产的适应证（）

- A: 多次人工流产术史
- B: 妊娠 ≤ 49 日
- C: 本人自愿、年龄 > 40 岁的健康女性
- D: B 超确诊为宫内妊娠

答案：C

9. 隔日 1 次用药的外文规范缩写是

- A: qh
- B: qod
- C: qn
- D: qd

答案：B

10. 尽量不用带数字的术语来表示

- A: 特别关注特殊人群
- B: 及时回答不拖延
- C: 解释的技巧
- D: 保护患者的隐私

答案：C

11. 治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

- A: 头孢唑林
- B: 莫西沙星
- C: 青霉素

D: 红霉素

答案: D

12. (2015 年真题) 细菌感染患者可出现 ()。

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 红细胞/血红蛋白减少

C: 中性粒细胞增多

D: 血小板增多

答案: C

13. 最可能引起血小板计数减少的药物是

A: 阿莫西林

B: 氯丙嗪

C: 阿司匹林

D: 乳酸钠

答案: C

14. 患者用药咨询的内容是

A: 自我保健

B: 治疗药物监测

C: 新药信息

D: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效

答案: D

15. 告知"培氟沙星合用糖皮质激素出现跟腱断裂"属于

A: 禁忌证

B: 合理用药信息

C: 药品不良反应

D: 药物相互作用

答案：D

16. 氢氯噻嗪所致的主要不良反应是

A: 支气管痉挛

B: 血钠升高

C: 血尿酸升高

D: 外周血肿

答案：C

17. 发热在应用解热镇痛药时，老年人的用药时间间隔是

A: 4~6 小时

B: 3~6 小时

C: 3~5 小时

D: 2~5 小时

答案：A

18. 非甾体抗炎药的典型不良反应是

A: 胃肠道刺激出血

B: 肝毒性

C: 肾毒性

D: 血液系统毒性

答案：A

19. 可引起药源性肾脏疾病的药物是

A: 含有马兜铃酸的中药

B: 三环类抗抑郁药

C: 异烟肼

D: 吡罗昔康

答案: A

20. 磺胺类药用于抗感染不宜食用的是

A: 蛋白质

B: 脂肪

C: 食盐

D: 食醋

答案: D

21. 下列叙述正确的是

A: 单核细胞为有粒细胞

B: 白细胞均是有粒细胞

C: 有粒细胞根据其颗粒的嗜好可分为中性、嗜酸性、嗜碱性 3 种

D: 淋巴细胞为有粒细胞

答案: C

22. 干扰敏感细菌细胞壁黏肽的合成，使细菌细胞壁缺损的药物是

A: 四环素

B: 青霉素

C: 链霉素

D: 磺胺嘧啶

答案: B

23. 影响人类寿命的因素中，社会因素占

A: 0.15

B: 0.07

C: 0.08

D: 0.1

答案: D

24. 开发药品计算机管理系统，自动检测药品剂量、过敏证、禁忌证和药物相互作用等方面信息，归属

A: 知识培训

B: 管理规范到位

C: 科学发展

D: 环境与流程的优化与持续改进

答案: D

25. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

A: 乙酰胺

B: 维生素 B

C: 维生素 K

D: 阿托品

答案: C

26. 影响伊曲康唑药效的 PK / PD 参数是

A: $AUC_{0\sim 24} / MIC$

B: $\%T > MI$

C: C_{max}

D: C_{max} / MIC

答案: A

27. 格列齐特片的适宜服药时间是

A: 餐中

B: 清晨

C: 餐后

D: 餐前

答案: D

28. 抑制细菌叶酸合成的药物是

A: 磺胺嘧啶

B: 利福喷汀

C: 头孢哌酮

D: 头孢米诺

答案: A

29. 不易产生耐受性，对 CYP2C19 快代谢的胃食管反流病人群，推荐长期维持治疗的抑酸剂是

A: 伊托必利

B: 奥美拉唑

C: 泮托拉唑

D: 法莫替丁

答案: C

30. 患者，女，45 岁，1 年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgqd，甲硝唑片 0.4gtid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 220mg tid。患者溃疡治愈后，因膝关节疼痛需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡复发风险，首选的预防药物是

A: 多潘立酮

B: 奥美拉唑

C: 枸橼酸铋钾

D: 替普瑞酮

答案: B

31. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}中华医学会的网址是

A: org. cn

B: www. cm

C: www. cp

D: org. cn

答案: B

32. 患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下:

A: 质子泵抑制剂餐后服用

B: 铋剂餐后服用

C: 甲硝唑餐后服用

D: 甲硝唑餐前服用

答案: C

33. 苯巴比妥中毒较深，血药浓度达到一定水平后，需采用血液净化进行解救，一般要求

A: 浓度超过 80mg / L 时给予血液净化

B: 浓度超过 40mg / L 时给予血液净化

C: 浓度超过 20mg / L 时给予血液净化

D: 浓度超过 60mg / L 时给予血液净化

答案: A

34. (常用抗高血压药物的分类)，氨苯蝶啶属于

- A: 保钾利尿药
- B: 二氢吡啶类钙通道阻滞药
- C: 非二氢吡啶类钙通道阻滞药
- D: 直接血管扩张剂

答案：A

35. 溃疡性结肠炎患者应限制摄入的食品是

- A: 流质饮食
- B: 低渣食品
- C: 维生素类食品
- D: 乳制品

答案：D

36. 提示：用药期间不饮酒（或含酒精的饮料），是针对

- A: 卡托普利
- B: 氟西汀
- C: 铋制剂
- D: 氯苯那敏

答案：B

37. 具有多种作用，可用于角膜软化、夜盲症的是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 C
- D: 维生素 A

答案：D

38. 引起急性细菌性扁桃体炎最常见的致病菌是

- A: 肺炎链球菌
- B: 大肠埃希菌
- C: 金黄色葡萄球菌
- D: A 组 β 溶血性链球菌（化脓性链球菌）

答案：D

39. 与环丙沙星有相互作用合并使用应做血液浓度监测的药物是

- A: 异丙托溴铵气雾剂
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 孟鲁司特钠咀嚼片
- D: 茶碱片

答案：D

40. 干眼症可选用()

- A: 玻璃酸钠滴眼液
- B: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- C: 氧氟沙星滴眼液
- D: 色甘酸钠滴眼液

答案：A

41. 抗菌谱广，属于碳青霉烯类的药物是

- A: 亚胺培南
- B: 克拉维酸
- C: 氨曲南
- D: 头孢哌酮

答案：A

42. S-1 索拉唑在体内代谢的主要肝药酶是

- A: CYP2C8
- B: CYP2C9
- C: CYP2C19
- D: CYP1A2

答案：C

43. 患者，男性，45 岁，无痛性肉眼血尿 6 个月来诊，患者于 6 个月前无意中发现排尿全程尿色发深，呈酱油色，无腰痛，尿频，排尿困难，排尿后尿不尽，结合尿常规检查，诊断为良性前列腺增生。

- A: 非那雄胺
- B: 特拉唑嗪
- C: 坦索罗辛
- D: 奥昔布宁

答案：A

44. (2015 年真题) 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L (参考范围 <7.8mmol/L)，甘油三酯 1.52mmol/L (参考范围 0.56~1.70mmol/L)，总胆固醇 6.26mmol/L (参考范围 <5.2mmol/L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L (参考范围 2.1~3.1mmol/L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/L (参考范围 1.2~1.65mmol/L)，肌酐 60 μmol/L (参考范围 45~84 μmol/L)，蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 控制体重
- B: 不必限盐
- C: 适当运动
- D: 减少脂肪摄入

答案：B

45. “嗜酸性粒细胞增多”可能提示的疾病是

- A: 铅、铋中毒
- B: 感染性疾病如肺结核
- C: 过敏性疾病如荨麻疹
- D: 病毒感染性腹泻

答案：C

46. 肠外营养 1g 葡萄糖能提供的热量是

- A: 9kcal
- B: 3kcal
- C: 4kcal
- D: 7kcal

答案：C

47. 下列药物中，可逆性、选择性单胺氧化酶 A 抑制剂

- A: 氯米帕明
- B: 氟伏沙明
- C: 阿米替林
- D: 吗氯贝胺

答案：D

48. 药物警戒对用药安全具有重要作用。下列确认的用药不良事件中，属于发现药品使用环节问题的是

- A: “万络(罗非昔布)事件”
- B: “拜斯亭(西立伐他汀)事件”
- C: “阿糖胞苷儿科事件”

D: “亮菌甲素事件”

答案: C

49. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 快速性房性心律失常伴传导阻滞

B: 心动过缓

C: 直立性低血压

D: 高钾血症

答案: A

50. 早餐前半小时服用的药物是（）

A: 瑞巴派特

B: 吉法酯

C: 雷贝拉唑

D: 枸橼酸铋钾

答案: C

51. 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是

A: 头孢哌酮舒巴坦

B: 亚胺培南西司他汀

C: 阿米卡星

D: 头孢拉定

答案: D

52. 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L(正常值:3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L(正常值:<7.8mmol/L)，血尿酸 580 μ mol/L(正常值:男性 180~440 μ mol/L)，血 LDL-C 3.7mmol/L(正常值:2.1~3.1mmol/L)肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 格列齐特
- B: 甘精胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案: D

53. 可提示肝细胞性黄疸的是

- A: 34.2 μ mol/L~171 μ mol/L
- B: 17.1 μ mol/L~34.2 μ mol/L
- C: >342 μ mol/L
- D: 17.1 μ mol/L~171 μ mol/L

答案: D

54. 属于癌痛治疗第二阶梯的止痛药物为

- A: 羟考酮
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 哌替啶
- D: 二氢可待因

答案: D

55. 用于治疗苯二氮类药物中毒的特殊解毒剂是 ()

- A: 二巯丁二钠
- B: 纳洛酮
- C: 氟马西尼
- D: 乙酰胺

答案：C

56. 与头孢曲松钠注射液混合可产生肉眼难以观测到的白色细微沉淀的注射液是

- A: 葡萄糖注射液
- B: 葡萄糖氯化钠注射液
- C: 氯化钠注射液
- D: 乳酸钠林格注射液

答案：D

57. 患者女性，40 岁，既往有风湿性心脏病史，近 2 年来出现劳力性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

- A: 急性左心衰竭
- B: 急性心肌炎
- C: 支气管哮喘
- D: 大叶性肺炎

答案：A

58. 烫伤后药物选择不宜选用

- A: 润湿烧伤膏
- B: 甲紫
- C: 破伤风

D: 京万红软膏

答案: B

59. 影响人类寿命的因素中，医疗占

A: 0.08

B: 0.07

C: 0.1

D: 0.15

答案: A

60. 尿毒症患者维生素 D

A: 血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积

B: 经肾排泄的药物消除减慢

C: 药物生物转化障碍

D: 组织吸收有自限性

答案: C

61. 以下肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断心肌梗死

B: 诊断急、慢性白血病

C: 诊断痛风

D: 诊断恶性贫血

答案: A

62. 三环类抗抑郁药的致死量通常高于

A: 2g

B: 2.5g

C: 1g

D: 1.5g

答案：A

63. 喝茶可降低多价金属离子、生物碱、苷类、胃蛋白酶、四环素类等药物的疗效，其机制主要是它们结合茶中的

A: 鞣酸

B: 咖啡因

C: 蛋白质

D: 茶碱

答案：A

64. 一般成人血液总量约为

A: 3000~3500ml

B: 2500~3000ml

C: 5000~6000ml

D: 1500~2000ml

答案：C

65. 以下注射给药途径中，最常用于新生儿的是

A: 腹腔注射

B: 动脉注射

C: 肌肉注射

D: 静脉注射

答案：D

66. 下列药物中，患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

A: 可待因

B: 羧甲司坦

C: 苯丙哌林

D: 喷托维林

答案：A

67. 不宜与小活络丹、香连片、贝母枇杷糖浆合用的药品是

A: 氨茶碱

B: 可待因

C: 地高辛

D: 氯苯那敏

答案：A

68. (2019 年真题) 下列通用名与别名的组合中，不是同一种药品的是

A: 利可君与利血生

B: 醋酸氯己定与洗必泰

C: 氨甲苯酸与止血敏

D: 桂利嗪与脑益嗪

答案：C

69. (2017 年真题) 患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是 ()

A: 华法林

B: 对乙酰氨基酚

C: 氯吡格雷

D: 阿司匹林

答案：C

70. 易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 紫杉醇
- C: 阿霉素
- D: 氟尿嘧啶

答案：D

71. (2019 年真题) 艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗，俗称“鸡尾酒疗法”，目前国内免费治疗的一线方案是

- A: 齐多夫定+依非韦伦+利托那韦
- B: 替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦
- C: 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平
- D: 拉米夫定+替诺福韦+齐多夫定

答案：C

72. 导致心脑血管事件的是

- A: 阿托伐他汀
- B: 己烯雌酚
- C: 加替沙星
- D: 罗非昔布

答案：D

73. 患者因阴道瘙痒和阴道分泌物增多 3 天，自行到药店咨询和购买治疗药物。药师询问患者病史，了解患者阴道分泌物多且呈豆腐渣样，既往未出现过类似分泌物，无其他不适。经验治疗方案首选

- A: 甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日
- B: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日
- C: 克霉唑制剂，1 粒（500mg），单次用药
- D: 2% 克林霉素软膏 5g，阴道用药，每晚 1 次，连用 7 日

答案：C

74. 慎用奥美拉唑的原因是

- A: 致使定向力障碍
- B: 引起嗜睡
- C: 引起多尿或多汗
- D: 致使视力模糊

答案：B

75. 用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

- A: 10 天之后
- B: 15 天之后
- C: 20 天之内
- D: 15 天之内

答案：D

76. 运动员在比赛前使用可快速降低体重，但容易导致脱水甚至休克的兴奋剂是

- A: 人促红细胞生成素
- B: 苯丙酸诺龙
- C: 可待因
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

77. 不属于处方前记内容的是()。

- A: 医疗、预防、保健机构名称
- B: 患者姓名、性别、年龄
- C: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

D: 门诊或住院病历号、日期

答案: C

78. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

A: 维生素 K1

B: 乙酰胺

C: 碘解磷定

D: 亚硝酸钠

答案: A

79. (2017 年真题) 患毒, 27 岁, 妊娠 20 周, 出现发热体温最高达 38.5℃, 体格检查: 肾区叩痛, 经相关实验室检查诊断为急性肾盂肾炎, 宜选用的药物是 ()

A: 甲硝唑

B: 头孢噻肟钠

C: 阿奇霉素

D: 阿米卡星

答案: B

80. 向患者发放合理用药宣传材料是

A: 指令方式

B: 教育方式

C: 主动方式

D: 协商方式

答案: C

81. 肠外营养 1g 脂肪能提供的热量是

A: 7kcal

B: 4kcal

C: 3kcal

D: 9kcal

答案：D

82. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系)，正常人对铁剂的吸收率为

A: 15%~20%

B: 10%~20%

C: 20%~40%

D: 20%~60%

答案：B

83. 饭后半小时服用的药物是（）

A: 枸橼酸铋钾

B: 吉法酯

C: 瑞巴派特

D: 雷贝拉唑

答案：B

84. 头孢菌素注射剂作为皮肤过敏试验的浓度是

A: 250 μ g/ml

B: 500 μ g/ml

C: 750 μ /ml

D: 100 μ g / ml

答案：B

85. 用药后可出现非痛风性多关节痛的抗结核药是

A: 利福平

B: 链霉素

C: 吡嗪酰胺

D: 乙胺丁醇

答案: C

86. 某女孩，6 岁，2 个月来反复出现突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视、呼之不应，手中物体掉落。但从不跌倒，持续数秒钟可缓解。

A: 丙戊酸钠

B: 苯妥英钠

C: 卡马西平

D: 地西泮

答案: A

87. 癫痫持续状态的好发年龄段是

A: 1 岁以内及 65 岁以上

B: 65 岁以上

C: 6 岁以内

D: 55 岁以上

答案: A

88. 可导致手、足、脸以及内部器官不正常发育的兴奋剂是

A: 精神刺激剂

B: B 受体阻断剂

C: 人生长激素

D: 蛋白同化激素

答案: C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/288040100044007022>