

鱼类增养殖学-鱼苗和成鱼的饲养

1、肥料为主、精料为辅鱼苗饲养法应施（）。

- A. 粪肥
- B. 化肥
- C. 绿肥
- D. 各种肥均可

2、鲫鱼的性成熟年龄一般为（）龄。

- A. 1
- B. 1-2
- C. 2-3
- D. 4-5

3、拉网锻炼鱼苗的适宜时间为（）。

- A. 6：00
- B. 9：00
- C. 12：00
- D. 15：00

4、鲤鱼水花鱼苗下塘最佳适口饵料是（）。

- A. 底栖动物

B. 浮萍

C. 轮虫及小型枝角类

5、苗种放养时过数要（）。

A. 准确

B. 精确

C. 足

D. 细

6、提高鱼苗育成夏花的成活率和质量的关键，最根本的是（）。

A. 细心操作，防止死亡事故发生

B. 保证鱼苗下塘后就能获得丰富适口的饲料

C. 加大放养密度，进行高密度养殖

7、一般养成 1 万尾夏花需黄豆（）公斤。

A. 2~3

B. 10~12

C. 5~5.5

D. 7~8.5

8、鱼苗池面积一般（）亩为好。

A. 2-3

B. 10-20

C. >1

D. >30

9、鱼苗培育过程中，如大型浮游动物过多可采取（）。

A. 加注新水

B. 用敌百虫杀灭

C. 放养鳙鱼种

10、鱼苗下塘前 7 天施（）为好。

A. 有机肥

B. 磷肥

C. 氮肥

D. 磷肥

11、鱼农综合中草食性鱼类鱼苗培育后期（体长约 2cm 左右）良好的开口青饲料是（）

A. 满江红

B. 紫背萍

C. 芜萍

D. 杂交狼尾草

12、（）鱼浮头属于轻浮头。

- A. 野杂
- B. 鲢、鳙
- C. 草、青
- D. 鲤、鲫

13、（）鱼以颌齿为取食器官。

- A. 鲢、鳙
- B. 草、青
- C. 鳅、鳊
- D. 鳢、鳊

14、（）主要以浮游动物为食。

- A. 草鱼
- B. 鳊鱼
- C. 鲤鱼
- D. 鳙鱼

15、“四大家鱼”是指（）。

- A. 青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼
- B. 青鱼、草鱼、鲤鱼、鲢鱼
- C. 草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鳙鱼

D. 青鱼、草鱼、鲤鱼、鳙鱼

16、按规定硬颗粒饲料在水中稳定性应为（）分钟。

A. 10

B. 30

C. 60

D. 120

17、不属于鲈形目的鱼类为（）。

A. 罗非鱼

B. 鳊

C. 鳊鲂

D. 条纹鲈

18、草鱼出血病主要是（）龄鱼的一种急性传染病。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

19、雌河蟹的蟹脐为（）。

A. 尖脐

- B. 团脐
- C. 狭去的园状
- D. 方形

20、合理密养、混养、放养（）鱼种，以充分发挥生产潜力。

- A. 大规格
- B. 小规格优质
- C. 中等规格
- D. 小、中等规格优质

21、河道养鱼的技术关键是（）。

- A. 防逃
- B. 成活率
- C. 选好地点
- D. A+B

22、河蟹产卵池的盐度为（）‰。

- A. 0.5
- B. 1-5
- C. 5-8
- D. 8-33

23、河蟹的（）在海水环境中生长发育。

- A. 蚤状幼体
- B. 大眼幼体
- C. 蟹满
- D. 幼蟹

24、黄鳝摄食主要依靠（）。

- A. 视觉
- B. 嗅觉
- C. 味觉
- D. 听觉

25、鲫鱼的尿是在（）里形成的。

- A. 肛门
- B. 肾脏
- C. 输尿管
- D. 尿殖孔

26、鲫鱼的游泳运动主要靠（）。

- A. 尾鳍的摆动
- B. 胸鳍、腹鳍的摆动
- C. 臀鳍的摆动

D. 尾部和躯干部的摆动

27、鲫鱼体内鳔的主要作用是（）。

A. 进行气体交换

B. 排泄代谢废物

C. 协助消化吸收

D. 调节身体比重

28、解决养鱼单一效益的途径为（）。

A. 综合养鱼

B. 驯化养鱼

C. 网箱养鱼

29、精养鱼池中磷的来源包括（）。

A. 投饵

B. 施肥

C. 底泥释放和补水带入

D. 以上三种

30、鲮鱼有（）对口须。

B. 1

C. 2

D. 3

31、流水养鱼每次投饲时间为（）分钟左右。

A. 5

B. 15

C. 30

D. 60

32、牛蛙的栖息习性为（）。

A. 胆大好斗

B. 喜静怕扰

C. 喜干怕湿

D. 喜阳怕阴

33、牛蛙的头（）。

A. 呈三角形，头长小于头宽

B. 呈三角形，头长大于头宽

C. 呈方形，头长大于头宽

D. 呈方形，头长小于头宽

34、水库控制一定数量的凶猛鱼类可以清除（）。

A. 无经济价值鱼类

- B. 经济价值小的鱼类
- C. 无经济价值或经济价值小的鱼类
- D. 瘦弱鱼种

35、水库养鱼的关键因素是（）。

- A. 水温
- B. 面积
- C. 品种
- D. 鱼的生长速度

36、随着水生动物的生长，相对投饲量（）。

- A. 不变
- B. 增加
- C. 减少
- D. 为零

37、投饲要领中“合理”是指（）。

- A. 营养合理
- B. 投喂合理
- C. 饲料按季节合理投喂
- D. A+B+C

38、网箱养鱼尾重 20-50 克鱼种放养密度为（）公斤/平方米。

- A. 5-15
- B. 30-50
- C. 2-3
- D. 50-100

39、我国四大家鱼对 PH 值的适应范围最大为（）。

- A. 3.6-7.2
- B. 4.6-10.2
- C. 5.5-8.3
- D. 6.0-8.0

40、虾的一生可分为胚胎期、（）期、仔虾期、成虾期。

- A. 稚虾
- B. 蚤状幼体
- C. 大眼幼体
- D. 黄虾

41、下列关于动脉血的叙述中，正确的是（）。

- A. 含氧气多，颜色鲜红的血
- B. 含氧气多，颜色暗红的血
- C. 含氧气少，颜色暗红的血

D. 含氧气少，颜色鲜红的血

42、下面判断鱼浮头的方法正确的是（）。

A. 鱼类开始浮头总在上风处，夜间可用手电筒照射鱼池，观察鱼是否有受惊吓的响动

B. 鱼类开始浮头总在下风处，夜间可用手电筒照射鱼池，观察鱼是否有受惊吓的响动

C. 夜晚鱼类活动较弱，需氧较少，固夜晚或黎明不会浮头，白天中午观察比较好

D. 以上说法均不正确

43、驯化养殖应选择（）投喂。

A. 配合饲料

B. 混合饲料

C. 单一饲料

D. 鱼粉

44、驯养的鲤成鱼吃浮萍，说明（）。

A. 饲料不适口

B. 配料不新鲜

C. 饲料败坏

D. 饲料缺乏

45、养鱼池每年轮捕（）次为宜。

A. 1-3

B. 3-5

C. 5-7

D. 7-9

46、养殖动物浮头早期为（）。

A. 暗浮头

B. 轻浮头

C. 重浮头

D. 泛池

47、摇蚊幼虫在砂土和沙质粘土上较多，大多集中底泥表面（）厘米处。

A. 0-5

B. 10-15

C. 15-30

D. 40

48、一般单养罗非鱼的高产塘，每亩投放 3.3Cm 以上的鱼种数量为（）。

A. 1000-3000 尾

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288136023043006135>