

2024 年执业药师之西药学综合知识与技能综合检测 试卷 B 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、属于 HIV 整合酶链转移抑制剂的是（ ）

- A. 阿巴卡韦
- B. 多替拉韦
- C. 奈韦拉平
- D. 洛匹那韦
- E. 粒细胞集落刺激因子

【答案】 B

2、一些药品吸收二氧化碳发生碳酸化，归属于

- A. 日光
- B. 空气
- C. 湿度
- D. 温度
- E. 时间

【答案】 B

3、氟哌啶醇的禁用范围是

- A. 新生儿
- B. 婴幼儿
- C. 1 岁以下婴儿
- D. 3 岁以下幼儿

E.8 岁以下儿童

【答案】 B

4、饮食对粪外观的影响,食西红柿、西瓜

A.黑褐色

B.暗绿色

C.酱色

D.红色

E.无光泽黑色

【答案】 D

5、不能受潮的药品是

A.硝酸甘油

B.阿卡波糖片

C.头孢曲松钠

D.复方甘草合剂

E.亚硝酸异戊酯吸入剂

【答案】 B

6、药物临床评价是指

A.对药物临床前研究的一切新药申报资料的真实性和科学性进行的评估

B.新药上市以后对药品的理化性质、质量和价格的评估

C.对药品治疗效果、不良反应、用药方案、贮存稳定性及药品经济学的评估

D.新药临床研究在未上市以前进行的利益与风险关系的评估

E. 药物的临床药理学及人体安全性评价以便为临床使用打基础的评估

【答案】 C

7、发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。高热是指体温范围

A.37.0°C□38.3°C

B.37.4°C□38.0°C

C.38.1°C□39.0°C

D.39.1°C□41.0°C

E.41.0°C□□

【答案】 D

8、焦虑症最常见的表现形式为（ ）

A.急性焦虑

B.惊恐发作

C.广泛性焦虑

D.社交焦虑障碍

E.精神运动性激越

【答案】 C

9、敏感化作用的配伍用药是

A.阿托品联用吗啡镇痛

B.应用地高辛与氢氯噻嗪

C.纳洛酮用于解救吗啡中毒

- D.青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性
- E.普萘洛尔与美西律联用治疗室性早搏和心动过速

【答案】 B

10、眼膏剂每次用量一般是

- A.1mg
- B.10mg
- C.1cm
- D.1mm
- E.3~4cm

【答案】 C

11、一医师为食管癌患者开方，给予顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星、依托泊苷治疗。此处方应评定为

- A.有禁忌证用药
- B.无适应证用药
- C.过度治疗用药
- D.不合理联合用药
- E.无正当理由超说明书用药

【答案】 C

12、下列哪种属于配伍相容中化学稳定性的变化

- A.浓度的变化
- B.颜色的变化

- C. 沉淀的变化
- D. 渗透压的变化
- E. 相分离的变化

【答案】 A

13、属于容积性泻药的药物是

- A. 比沙可啶
- B. 甘油栓
- C. 硫酸镁
- D. 乳果糖
- E. 聚乙二醇

【答案】 C

14、患者，男，50岁。患梗阻性黄疸，其粪外观可呈现

- A. 鲜血便
- B. 细条便
- C. 乳凝块便
- D. 白陶土样便
- E. 水样便

【答案】 D

15、属于 X 级的药物是

- A. 阿莫西林
- B. 葡萄糖

C. 万古霉素

D. 沙利度胺

E. 卡马西平

【答案】 D

16、属于肾上腺素能 α 受体阻断剂，可改善尿道梗阻症状的药品

A. 黄酮哌酯

B. 氟他胺

C. 阿夫唑嗪

D. 非那雄胺

E. 尼尔雌醇

【答案】 C

17、服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

A. 酒

B. 烟

C. 浓茶

D. 食醋

E. 牛奶

【答案】 A

18、自我药疗时，初治滴虫性阴道炎，每日口服甲硝唑 800mg 连续用药时间为

A. 1 天

B. 3 天

C.5 天

D.7 天

E.10 天

【答案】 D

19、女性红细胞沉降率的正常范围值

A.0~5mm/h

B.0~10mm/h

C.0~15mm/h

D.0~20mm/h

E.0~25mm/h

【答案】 D

20、患者到药店要求购买痢特灵，药师应该给予

A.喷托维林

B.双嘧达莫

C.呋喃唑酮

D.诺氟沙星

E.利巴韦林

【答案】 C

21、使尿液呈碱性，可增加抗菌活性、减轻肾毒性，食醋则会加重其毒性作用的是

A.林可霉素类

- B. 氨基糖苷类
- C. 头孢菌素类
- D. 大环内酯类
- E. 碳青霉烯类

【答案】 B

22、患者，男，69岁，BMI 27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A. 吗啡控释片
- B. 双氯芬酸钠缓释片
- C. 颠茄片
- D. 加巴喷丁胶囊
- E. 卡马西平片

【答案】 B

23、患者因阴道瘙痒和阴道分泌物增多3天，自行到药店咨询和购买治疗药物。药师询问患者病史，了解患者阴道分泌物多且呈豆腐渣样，既往未出现过类似分泌物，无其他不适。经验治疗方案首选

- A. 甲硝唑阴道栓（片）200mg 阴道用药，每晚1次，连用7日
- B. 2%克林霉素软膏 5g，阴道用药，每晚1次，连用7日
- C. 甲硝唑 400mg 每日2次，连服7日
- D. 克霉唑制剂，1粒（500mg），单次用药
- E. 口服氟康唑 150mg 每周1次，连续6个月

【答案】 D

24、患者，男，65岁，患有骨质疏松症，根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg 药师为其推荐碳酸钙(0.5g/片)，该患者适宜的用法用量是()

A.1 片 tid

B.2 片 tid

C.4 片 qd

D.6 片 qd

E.8 片 tid

【答案】 A

25、药物经济学研究的 4 种方法的主要差别在于

A.用药成本的不同测量上

B.计算不同类型的成本

C.对于用药结果的不同测量

D.所采用的实验研究方法不同

E.研究对象不同

【答案】 C

26、(2019 年真题)患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI 30.1，主诉夜间咳嗽、咽部有异物感，平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛，自用止咳糖浆无效。查体：咽红，听诊双肺未闻及干湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mg qd，血压控制在 140/85mmHg 左右，高脂血症 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mg qd。

A.布地奈德吸入剂

B.单硝酸异山梨酯缓释片

C.奥美拉唑肠溶胶囊

多潘立酮片

E. 东莨菪碱片

【答案】 C

27、患者，女，33岁，因“近期阴道分泌物增多，呈鱼腥臭味，并伴有外阴瘙痒，且性交后症状加重”前来就诊。

A. 输卵管炎

B. 细菌性阴道病

C. 外阴阴道假丝酵母菌病

D. 急性尿道炎

E. 滴虫性阴道炎

【答案】 B

28、脂溶性最低，作用慢而长的是

A. 巴比妥

B. 硫喷妥

C. 苯巴比妥

D. 戊巴比妥

E. 司可巴比妥

【答案】 A

29、治疗抗肿瘤药物引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A. 奥美拉唑

B. 雷尼替丁

昂丹司琼

D. 维生素 B6

E. 茶苯海明

【答案】 C

30、用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是

A. 吡嗪酰胺

B. 利福平

C. 链霉素

D. 乙胺丁醇

E. 左氧氟沙星

【答案】 D

31、患者，女，28岁，近一个月出现阴道分泌物增多，阴道检查时发现大量泡沫样分泌物，经验治疗首选的药物是（ ）

A. 甲硝唑

B. 咪康唑

C. 头孢曲松钠

D. 青霉素钠

E. 克拉霉素

【答案】 A

32、下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

A. CTP评分

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/295202221200011332>