2024年河南省管城回族区《执业药师之西药学专业二》资格考试附参考答案（模拟题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

A：磺胺嘧啶

B：磺胺甲

C：柳氮磺吡啶

D：磺胺米隆

答案：C

2.（2017年真题）导致视神经炎的抗结核药的是（）

A：利福平

B：乙胺丁醇

C：利福喷丁

D：吡嗪酰胺

答案：B

3.属于Ⅱ类抗心律失常药()

A：奎尼丁

B：胺碘酮

C：普萘洛尔

D：利多卡因

答案：C

4.属于促分泌药，通过刺激肠液分泌，促进排便的药物是()

A: 欧车前

B: 番泻叶

C: 多库酯钠

D: 利那洛肽

答案：D

5.患者，女性，62岁，有高血压病史14年，伴变异性心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用

A: 维拉帕米

B: 尼莫地平

C: 硝苯地平

D: 普萘洛尔

答案：A

6.氨茶碱的主要平喘机制为

A: 激活鸟苷酸环化酶

B: 直接舒张支气管

C: 抑制腺苷酸环化酶

D: 松弛气道平滑肌

答案：D

7.患者,女,63岁,因心绞痛急诊就医,诊断为ST段抬高心肌梗死,血压175/95mmHg,心率110次/分,该患者适使用的药物是

A: 美托洛尔

B: 氨氯地平

C: 硝普钠

D: 贝那普利

答案：A

8.氟西汀的作用机制是

A：抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解

B：抑制 5-HT 及去甲肾上腺素的再摄取

C：选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度

D：抑制突触前膜对去甲肾上腺素的再摄取

答案：C

9.存在中度致吐风险的抗肿瘤药物是

A：泼尼松

B：奥沙利铂

C：顺铂

D：吉西他滨

答案：B

10.（2017 年真题）可降低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油,主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是（）

A：依折麦布

B：阿昔莫司

C：瑞舒伐他汀

D：利血平

答案：B

11.两性霉素 B 与()合用具有协同作用。

A：氟胞嘧啶

B：酮康唑

C：利福平

D：伊曲康唑

答案：A

12.长春碱可用于治疗()。

A：急性淋巴细胞白血病

B：晚期睾丸肿瘤

C：晚期前列腺癌

D：绒毛膜上皮癌

答案：B

13.李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是

A：二甲双胍

B：米氮平

C：辛伐他汀

D：阿司匹林

答案：B

14.慢性充血性心力衰竭宜

A：快速洋地黄化

B：停用洋地黄

C：不宜使用洋地黄

D：常规剂量的洋地黄

答案：D

15.属于血管紧张素II受体阻断剂的药品是()。

A：哌唑嗪

B：依那普利

C：替米沙坦

D: 坦洛新(坦索罗辛)

答案：C

16.作用机制是抑制DNA回旋酶和拓扑异构酶IV的药物是

A: 阿莫西林

B: 异烟肼

C: 红霉素

D: 氧氟沙星

答案：D

17.氢氯噻嗪的药理作用是

A: 抑制近曲小管碳酸酐酶活性

B: 抑制远曲小管Na+-Cl-共转运子的功能

C: 与醛固酮受体结合

D: 提高血浆渗透性，产生组织脱水作用

答案：B

18.以下不属于胰岛素的不良反应的是()

A: 高钾血症

B: 脂肪萎缩与肥厚

C: 胰岛素抵抗

D: 低血糖

答案：A

19.儿童使用阿托品最低致死量为

A: 5mg

B: 50mg

C: 10mg

D: 80mg～130mg

答案：C

20.服用 5 型磷酸二酯酶抑制剂可导致

A: 刺激性干咳

B: 视物模糊、复视

C: 肾功能异常

D: 高血压

答案：B

21.布地奈德的作用特点是

A: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿

B: 10μg/ml 为有效治疗浓度，15-20μg/ml 以上会出现毒性毒性反应

C: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效

D: 适用于轻度持续型（2 级以上）哮喘的长期治疗

答案：D

22.对阿司匹林过敏或不耐受的患者可选用

A: 替格雷洛

B: 噻氯匹定

C: 替罗非班

D: 氯吡格雷

答案：D

23.常见体位性低血压的是

A: 舍尼通

B: 非那雄胺

C：多沙唑嗪

D：十一酸睾酮

答案：C

24.糖皮质激素禁用于低血钾患者是因为

A：抑制蛋白质合成

B：水钠潴留

C：促进胃酸分泌

D：抑制免疫功能只抗炎不抗菌

答案：B

25.（2017年真题）属于芳香酶制剂抗肿瘤药是（）

A：炔雌醇

B：氟他胺

C：阿那曲唑

D：他莫昔芬

答案：C

26.下列利尿剂中，属于碳酸酐酶抑制剂的是

A：阿米洛利

B：布美他尼

C：乙酰唑胺

D：氢氯噻嗪

答案：C

27.可诱发和加重哮喘的是

A：硝苯地平

B：普萘洛尔

C：硝酸甘油

D：胍乙啶

答案：B

28.抑制 Na

A：氢氯噻嗪

B：乙酰唑胺

C：呋塞米

D：氨苯蝶啶

答案：A

29.属于第一代喹诺酮类药物的是

A：诺氟沙星

B：莫西沙星

C：萘啶酸

D：吡哌酸

答案：C

30.下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

A：可用于治疗心房扑动和心房颤动

B：具有抗胆碱和仅受体阻断作用

C：可用于强心苷中毒

D：抑制 Na+内流和 K+外流

答案：C

31.（2018 年真题）属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是（）

A：低精蛋白锌胰岛素

B：普通胰岛素

C: 甘精胰岛素

D: 地特胰岛素

答案：B

32.对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是

A: 拉氧头孢

B: 头孢吡肟

C: 氨曲南

D: 头孢西丁

答案：C

33.婴儿和哺乳期妇女禁用()作为泻药。

A: 乳果糖

B: 聚乙二醇4000

C: 硫酸镁

D: 酚酞

答案：D

34.患者，男，56岁，有高血压病史4年，体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

A: 血钠

B: 血氯

C: 血钙

D: 血钾

答案：D

35.属于第三代喹诺酮类药物的是

A: 诺氟沙星

B：吡哌酸

C：萘啶酸

D：莫西沙星

答案：A

36.下述关于甘油的描述，错误的是()

A：属于润滑性泻药

B：属于渗透性泻药

C：孕妇慎用

D：用于便秘的治疗

答案：B

37.糖尿病酮症酸中毒患者宜选用

A：珠蛋白锌胰岛素

B：正规胰岛素

C：二甲双胍

D：格列喹酮

答案：B

38.（2019年真题）支气管哮喘急性发作时，宜使用的药物是（）

A：沙美特罗氟替卡松粉吸入剂

B：孟鲁司特钠咀嚼片

C：吸入用布地奈德混悬液

D：沙丁胺醇气雾剂

答案：D

39.（2016年真题）抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应（）

A：急性肝衰竭

B：肺部纹理加重

C：胰腺坏死

D：急性肾衰竭

答案：D

40.不得与碱性物质或铁器接触的是()

A：林旦霜

B：苯甲酸苄酯

C：克罗米通

D：阿达帕林

答案：A

41.下述药物中用于拮抗肝素过量的是()

A：维生素K

B：维生素

C：氨甲苯酸

D：硫酸鱼精蛋白

答案：D

42.可导致新生儿药物性黄疸的是

A：阿莫西林

B：磺胺嘧啶

C：头孢他啶

D：林可霉素

答案：B

43.葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

A：低钠血症
B：高钾血症
C：低钾血症
D：高钠血症
答案：B

44.大剂量炔诺酮()
A：抑制排卵作用
B：抗着床
C：促进蛋白质合成
D：减少精子数目
答案：B

45.适用心绞痛患者的钙通道阻滞剂药物是
A：硝苯地平
B：哌唑嗪
C：硝酸甘油
D：普萘洛尔
答案：A

46.不属于抗乙型肝炎病毒的药品
A：恩替卡韦
B：拉米夫定
C：干扰素
D：泛昔洛韦
答案：D

47.治疗慢性心力衰竭，ACEI和其联合有协同作用的是()

A: 噻嗪类利尿药

B: 人促红素

C: 留钾利尿药

D: β 受体阻断药

答案：D

48.（2019 年真题）对磺胺类药物有严重过敏史的患者可选择的利尿剂是（）

A: 托拉塞米

B: 呋塞米

C: 依他尼酸

D: 布美他尼

答案：C

49.维生素 B

A: 纤溶亢进所致的出血

B: 拮抗华法林过量导致的出血

C: 拮抗肝素过量导致的出血

D: 恶性贫血和巨幼红细胞性贫血

答案：D

50.（2016 年真题）属于碳青霉烯类

A: 亚胺培南

B: 氨曲南

C: 头孢美唑

D: 头孢吡肟

答案：A

51.对氨基水杨酸的抗结核杆菌作用原理是

A: 抑制 RNA 多聚酶

B: 抑制蛋白质合成

C: 抑制分枝菌酸合成

D: 抑制结核杆菌叶酸的代谢

答案：D

52.大环内酯类抗生素()

A: 万古霉素

B: 红霉素

C: 克林霉素

D: 克拉霉素

答案：A

53.（2017 年真题）主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是（）

A: 阿昔莫司

B: 依折麦布

C: 瑞舒伐他汀

D: 利血平

答案：C

54.治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

A: 阿奇霉素

B: 米诺环素

C: 利奈唑胺

D: 万古霉素

答案：D

55.（2017 年真题）升高高密度脂蛋白胆固醇水平的（）

A: 维生素 B2

B: 叶酸

C: 烟酸

D: 泛酸钙

答案：C

56.抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

A: 多毛、痤疮

B: 肾功能损坏

C: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

D: 子宫不规则出血

答案：D

57.寻常痤疮、鱼鳞病及银屑病可选用()

A: 林旦霜

B: 酮康唑

C: 维 A 酸

D: 阿达帕林

答案：C

58.下列属于二磷酸腺苷 P2Y12 受体阻断药的是()

A: 阿替普酶

B: 阿司匹林

C: 氯吡格雷

D: 双嘧达莫

答案：C

59.可拮抗阿托品所致的心动过速的是

A: 地高辛

B: 普萘洛尔

C: 地尔硫䓬

D: 美西律

答案：C

60.双环醇片作为保护肝细胞药的作用机制是

A: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

B: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

C: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

D: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

答案：D

61.卡托普利的主要降压机制是

A: 促进前列腺素 I2 的合成

B: 抑制醛固酮的释放

C: 抑制缓激肽的水解

D: 抑制血管紧张素转化酶

答案：D

62.维生素 B1 缺乏时引起()

A: 成人佝偻病

B: 脚气病

C: 坏血病

D: 角膜软化症

答案：B

63.下述属于 β 受体阻断剂禁忌证的是

A: 甲状腺功能亢进患者禁用

B: 虹膜睫状体炎患者禁用

C: 心动过缓、房室传导阻滞患者禁用

D: 不适用于先天性青光眼患者

答案：C

64.只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害的是

A: 阿那曲唑

B: 他莫昔芬

C: 氟他胺

D: 曲妥珠单抗

答案：D

65.呋塞米的利尿作用机制主要是

A: 抑制碳酸酐酶

B: 抑制 Na+-K+-2Cl-同向转运子

C: 特异性阻滞 Na+通道

D: 抑制 Na+-H+交换

答案：B

66.关于地芬诺酯的叙述，不正确的是

A: 长期应用可产生依赖性

B: 可吸附肠内细菌及有毒气体

C: 能提高肠张力，减少肠蠕动

D: 用于急、慢功能性腹泻

答案：B

67.奎宁日剂量超过1g/d或连续长时间应用，可见耳鸣、头痛、视力与听力减退等，停药后常可恢复，临床称为

A: 锥体外系反应

B: 吉海反应

C: 金鸡纳反应

D: 双硫仑样反应

答案：C

68.抑制脱氧胸苷酸合成酶

A: 氟尿嘧啶

B: 羟基脲

C: 甲氨蝶呤

D: 阿糖胞苷

答案：A

69.喷托维林与水合氯醛合用会出现

A: 反射亢进，异常发热、昏睡

B: 支气管平滑肌痉挛

C: 中枢神经系统和呼吸系统抑制作用增强

D: 精神症状

答案：C

70.其缓释混悬液制剂应空腹服用的是

A: 红霉素

B: 氨曲南

C：克拉霉素

D：阿奇霉素

答案：D

71.与氧头孢烯类药的抗菌活性相似的第三代头孢菌素是

A：头孢他啶

B：头孢噻肟

C：头孢美唑

D：氨曲南

答案：B

72.属于Ⅰa类抗心律失常药的是

A：普罗帕酮

B：奎尼丁

C：胺碘酮

D：利多卡因

答案：B

73.下述种类的利尿药中，利尿作用最强的是

A：袢利尿剂

B：碳酸酐酶抑制剂

C：噻嗪类利尿剂

D：留钾利尿剂

答案：A

74.需停5周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

A：吡拉西坦

B：氟西汀

C：吗氯贝胺

D：文拉法辛

答案：B

75.铁剂的适应证为()

A：缺铁性贫血

B：巨幼红细胞性贫血

C：恶性贫血

D：再生障碍性贫血

答案：A

76.鱼精蛋白可用于救治()。

A：华法林过量导致的出血

B：异烟肼中毒导致的神经毒性

C：肝素过量导致的出血

D：吗啡过量导致的呼吸抵制

答案：C

77.以下关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是

A：可导致皮肤干燥，脱屑

B：可杀灭痤疮丙酸杆菌

C：为强还原剂，极易分解

D：可分解出新生态氧而发挥作用

答案：C

78.促胃肠动力药是()

A：甲氧氯普胺

B：肾上腺素

C：阿托品

D：熊去氧胆酸

答案：A

79.推荐与吸入性糖皮质激素联合使用,尤其适合于中、重度持续哮喘患者长期治疗的药物是

A：长效B2受体激动剂

B：M胆碱受体阻断剂

C：白三烯受体阻断剂

D：磷酸二酯酶抑制剂

答案：A

80.分泌糖皮质激素的是

A：束状带和网装带

B：球状带

C：束状带

D：网状带

答案：C

81.内脏绞痛可选用()

A：肾上腺素

B：甲氧氯普胺

C：阿托品

D：熊去氧胆酸

答案：C

82.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A：碱化尿液，促进尿酸排泄

B：抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

C：抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，升高尿尿酸量

D：抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成

答案：B

83.甲氨蝶呤抗肿瘤作用机制是抑制

A：二氢叶酸还原酶

B：四氢叶酸合成酶

C：二氢叶酸合成酶

D：四氢叶酸还原酶

答案：A

84.可分解出新生态氧，杀菌除臭()

A：过氧苯甲酰

B：异维A酸

C：阿达帕林

D：维A酸

答案：A

85.解热镇痛药的作用机制是

A：激动M受体

B：抑制前列腺素合成

C：抑制尿酸生成

D：激动中枢阿片受体

答案：B

86.下述不属于质子泵抑制剂的是

A：雷贝拉唑

B：奥美拉唑

C：法莫替丁

D：泮托拉唑

答案：C

87.同用可抵消降钙素对高钙血症疗效的是

A：铁剂

B：维生素D

C：双膦酸盐类骨吸收抑制剂

D：钙剂

答案：B

88.5α-还原酶抑制剂的作用特点不包括

A：可以松弛前列腺平滑肌

B：减小增大的前列腺体积

C：无心血管不良反应

D：降低血清前列腺特异抗原（PSA）水平

答案：A

89.强心苷类中毒的症状不包括

A：心肌强力收缩

B：红-绿、蓝-黄辨认异常

C：心律失常

D: 嗜睡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/296052211100011030