

2024 年贵州省凤冈县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题内部题库附答案 (名师推荐)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. (2016 年真题) 属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是

- A: 度他雄胺
- B: 普适泰
- C: 酚妥拉明
- D: 特拉唑嗪

答案: A

2. 患者，男，66 岁。BMI 24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次/分。临床诊断为：(1) 心绞痛急性发作；(2) 心功能不全、心功能 III 级；(3) 高血压病 3 级；(4) 高脂血症。

- A: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足
- B: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效
- C: 硝酸甘油片已经过期
- D: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服

答案: B

3. 多种抗眼部细菌感染制剂中常加入糖皮质激素，不能随意使用，应该在眼科医生、药师的密切监护下使用。如使用此类制剂，不应当超过

- A: 3 日
- B: 7 日
- C: 5 日
- D: 10 日

答案：D

4. 抗菌谱广，对厌氧菌也有强大抗菌活性，对 β -内酰胺酶高度稳定的药物是()

- A: 美罗培南
- B: 他唑巴坦
- C: 克拉维酸
- D: 氨曲南

答案：A

5. 在体内主要经 CYP3A4 代谢的质子泵抑制剂是

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 铝碳酸镁
- C: 兰索拉唑
- D: 米索前列醇

答案：C

6. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

- A: 可预测抗凝效果，无需监测国际标准化比值(INR)
- B: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶
- C: 治疗剂量下不会引起血小板减少

D: 选择性高

答案：B

7. 乙酰半胱氨酸的祛痰作用机制是

A: 使痰量逐渐减少，产生化痰作用

B: 恶心性祛痰作用

C: 直接分解痰中的黏蛋白，降低痰的黏性，易咳出

D: 增强呼吸道纤毛运动，促使痰液排出

答案：C

8. (2021 年真题) 兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是 ()

A: 羟甲唑啉鼻喷剂

B: 赛洛唑啉滴鼻液

C: 麻黄碱滴鼻液

D: 呋麻滴鼻液

答案：D

9. 临床治疗铜绿假单胞菌感染可选用的抗生素是 ()

A: 阿莫西林

B: 氨苄西林

C: 苯唑西林

D: 哌拉西林

答案：D

10. 磺酰脲类降糖药的药理作用是

A: 提高胰岛 B 细胞功能

B: 抑制胰岛素降解

C: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素

D: 加速胰岛素合成

答案：C

11. 溶栓药的使用禁忌证不包括

A: 既往有出血性脑卒中史

B: 1 年内有缺血性脑卒中或脑血管事件

C: 活动性内脏出血

D: 月经期间

答案：D

12. 每 1mg 硫酸鱼精蛋白可中和肝素约

A: 1000U

B: 1U

C: 10U

D: 100U

答案：D

13. 属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

A: 克罗米通

B: 麻黄碱

C: 酮替芬

D: 过氧化氢

答案：B

14. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

。

A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

- B: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- C: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加
- D: 促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿囊素

答案：A

15. 临床常用的巨幼红细胞性贫血治疗药物是

- A: 维生素 B12
- B: 肝素
- C: 维生素 K
- D: 香豆素类

答案：A

16. 聚乙二醇干扰素 α 2a 可抑制的肝药酶是

- A: CYP2C19
- B: CYP1A2
- C: CYP2C9
- D: CYP2D6

答案：B

17. 应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

- A: 四环素
- B: 氯霉素
- C: 青霉素
- D: 多西环素

答案：D

18. 肥胖性 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是

- A: 格列吡嗪

B: 格列本脲

C: 二甲双胍

D: 格列齐特

答案: C

19. 肝素应用过量可注射

A: 氨甲苯酸

B: 葡萄糖酸钙

C: 维生素 K

D: 鱼精蛋白

答案: D

20. 硫酸亚铁临床应用

A: 失去药效

B: 缺铁性贫血

C: 缺血性脑卒中

D: 急性中性粒细胞减少症

答案: B

21. 巨幼细胞贫血应首选

A: 维生素 B6

B: 亚叶酸钙

C: 叶酸+维生素 B12

D: 维生素 B12

答案: C

22. 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是

A: 华法林

- B: 氨甲环酸
- C: 达比加群酯
- D: 依诺肝素

答案：A

23. 利福平联用伏立康唑使

- A: 疗效减弱
- B: 月经不规则
- C: 吸收减少
- D: 肝毒性增加

答案：A

24. 可与阿司匹林发生相互作用的是

- A: 丙酸睾酮
- B: 呋塞米
- C: 伐地那非
- D: 坎利酮

答案：D

25. 角鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂是

- A: 阿莫罗芬
- B: 环吡酮胺
- C: 制霉菌素
- D: 特比萘芬

答案：D

26. 下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

- A: 非诺贝特

B: 盐酸

C: 瑞舒伐他汀

D: 依折麦布

答案：D

27. 不属于茶碱适应证的是

A: 阻塞性肺气肿

B: 喘息型支气管炎

C: 支气管哮喘

D: 过敏性鼻炎

答案：D

28. 属于 I c 类抗心律失常药的是()

A: 普鲁卡因胺

B: 胺碘酮

C: 普罗帕酮

D: 奎尼丁

答案：C

29. 患者，女，72 岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

A: 奥美拉唑

B: 华法林

C: 氯吡格雷

D: 双氯芬酸

答案：B

30. 糖尿病患者、颅内活动性出血患者禁用()

A: 聚乙二醇 4000

B: 甘油

C: 硫酸镁

D: 乳果糖

答案：B

31. 可引起性欲减退的是

A: 多沙唑嗪

B: 十一酸睾酮

C: 非那雄胺

D: 舍尼通

答案：C

32. 铁剂用于治疗

A: 小细胞低血红蛋白性贫血

B: 再生障碍性贫血

C: 溶血性贫血

D: 巨幼细胞贫血

答案：A

33. (2017 年真题) 眼部病毒感染宜选用 ()

A: 托吡卡胺滴眼剂

B: 氯霉素滴眼剂

C: 拉坦前列素滴眼剂

D: 碘苷滴眼剂

答案：D

34. 使用二磷酸果糖时需要监测血磷水平的是 ()

- A: 肌酐清除率低于 40%的患者
- B: 肌酐清除率低于 50%的患者
- C: 肌酐清除率低于 60%的患者
- D: 肌酐清除率低于 30%的患者

答案：B

35. 可以与青霉素 G 混合的是

- A: 葡萄糖注射液
- B: 维生素 C
- C: 维生素 B 族
- D: 生理盐水

答案：D

36. 喹诺酮类药物作用机制

- A: 抑制细菌细胞壁合成
- B: 干扰细菌核酸代谢
- C: 抑制细菌蛋白质合成
- D: 抑制细菌糖代谢

答案：B

37. (2020 年真题) 曲妥珠单抗的适应证是

- A: 晚期恶性黑色素瘤
- B: 转移性结直肠癌
- C: 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌
- D: 人表皮生长因子受体-2 (HER-2) 过度表达的乳腺癌

答案：D

38. 中毒后可用维生素 B6 来对抗的抗结核药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 异烟肼
- D: 对氨基水杨酸

答案：C

39. (2015 年真题) 易导致血糖异常的药品是 ()。

- A: 多西环素
- B: 头孢哌酮
- C: 庆大霉素
- D: 加替沙星

答案：D

40. 可引起尖端扭转型室性心律失常的药物是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 红霉素
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案：B

41. 可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

- A: 氨甲环酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 甲苯氢醌
- D: 酚磺乙胺

答案：B

42. (2021 年真题) 既有祛痰作用，还有酸化尿液、纠正代谢性碱中毒作用的药物 ()

- A: 氨溴索
- B: 氯化铵
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 右美沙芬

答案: B

43. 氨苯蝶啶的作用部位在

- A: 近曲小管
- B: 髓袢升支粗段
- C: 髓袢升支粗段皮质部
- D: 远曲小管和集合管

答案: D

44. 与双膦酸盐同时使用，有引起肾功能不全的报道，故禁止合用的非甾体类抗炎镇痛药是

- A: 萘普生
- B: 沙利度胺
- C: 抗血管生成药
- D: 高钙食品

答案: A

45. 将乙胺丁醇与链霉素合用治疗结核病的目的是

- A: 延长链霉素作用时间
- B: 延迟肾脏排泄链霉素
- C: 阻止或延迟结核杆菌对链霉素产生耐药性
- D: 有利于药物进入结核感染病灶

答案：C

46. 引起睫状肌麻痹，适用于治疗虹膜睫状体炎、检查眼底前的散瞳、验光配镜屈光度检查的药物是

- A: 20%甘露醇
- B: 奥布卡因
- C: 碘苷
- D: 阿托品

答案：D

47. （2018 年真题）关于钙通道阻滞剂（CCB 类）药物的说法，错误的是（ ）

- A: 红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度
- B: 对既往有脑卒中病史的老年高血压患者，优先选择 CCB 类降压药
- C: CCB 类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效
- D: CCB 类主要扩张小动脉，对小静脉和毛细血管作用较小，可导致下肢或脚踝水肿

答案：C

48. 为预防甲氨蝶呤所致的肾毒性，在化疗期间，除大量水化和利尿外，还应同时给予的尿路保护剂是

- A: 氯喹酮
- B: 呋塞米
- C: 美司钠
- D: 坦洛新

答案：C

49. 防止耐药现象的发生，持续用药须有 12 小时以上间歇期的药物是（）

- A: 硝酸甘油
- B: 氨氯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 依那普利

答案：A

50. （2018 年真题）高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是（）

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦，化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- B: 化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药
- C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

答案：A

51. 多烯磷脂酰胆碱作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用
- B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平
- C: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- D: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

答案：C

52. 抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

- A: 环磷酰胺
- B: 丝裂霉素
- C: 放线菌素 D
- D: 阿霉素

答案：C

53. (2017 年真题) 属于抗雌激素的肿瘤药是 ()

- A: 炔雌醇
- B: 阿那曲唑
- C: 氟他胺
- D: 他莫昔芬

答案：D

54. 我国常用避孕药不包括

- A: 探亲避孕药
- B: 短效避孕药
- C: 紧急避孕药
- D: 超短效避孕药

答案：D

55. 顺铂所致的肾损害会延缓药物的排泄而导致肾毒性增加，该药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 苯海拉明
- C: 丙磺舒
- D: 呋塞米

答案：A

56. 癫痫大发作合并小发作选用

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 乙琥胺
- D: 丙戊酸钠

答案：D

57. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 抗菌谱与青霉素相似但略广
- B: 属繁殖期杀菌剂
- C: 具有肝脏毒性
- D: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

答案：B

58. 治疗支原体肺炎、军团菌病、百日咳和白喉带菌者首选

- A: 氯霉素
- B: 红霉素
- C: 庆大霉素
- D: 链霉素

答案：B

59. （2021 年真题）影响熊去氧胆酸的吸收，不宜同时服用的药物（）

- A: 昂丹司琼
- B: 利那洛肽
- C: 氢氧化铝
- D: 双歧杆菌三联活菌

答案：C

60. (2018 年真题) 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 高检出率的医疗机构, 进行人工瓣膜置换术时, 为预防 MRSA 感染, 可选用 ()

- A: 氨曲南
- B: 青霉素 G
- C: 万古霉素
- D: 头孢唑林

答案: C

61. 可用维生素 B6 防治的异烟肼的不良反应是

- A: 胃肠道反应
- B: 周围神经炎
- C: 肝损伤
- D: 过敏反应

答案: B

62. 应用强心苷期间或停用后 7 日内不宜使用的药物是

- A: 枸橼酸钾
- B: 氯化钾
- C: 氯化钠
- D: 氯化钙

答案: D

63. 利奈唑胺的不良反应不包括

- A: 骨髓抑制
- B: 癫痫
- C: 头痛
- D: 血小板减少

答案: B

64. 长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是（）

- A: 维生素
- B: 维生素 A
- C: 维生素 B6
- D: 维生素 B2

答案：A

65. 服用磺胺多辛的方式不正确的是

- A: 餐前 1 小时服用
- B: 每次服药时饮水约 240ml
- C: 餐中服用
- D: 餐后 2 小时服用

答案：C

66. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 阿昔洛韦
- B: 阿糖腺苷
- C: 干扰素
- D: 奥司他韦

答案：A

67. 属于硝基呋喃类的是（）

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 夫西地酸
- C: 甲硝唑
- D: 呋喃妥因

答案：D

68. 四环素类抗菌药物抗菌谱广，但无抗菌作用的是

- A: 立克次体
- B: 衣原体
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 支原体

答案：C

69. 属于事后避孕药的是

- A: 壬苯醇醚
- B: 米非司酮
- C: 氯地孕酮
- D: 左炔诺孕酮

答案：B

70. （2015 年真题）静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是（）。

- A: 磷霉素
- B: 莫西沙星
- C: 夫西地酸
- D: 万古霉素

答案：D

71. 关于外用糖皮质激素类药物的说法错误的是

- A: 外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏等作用
- B: 治疗全身性或严重过敏疾病时，不宜合用口服抗过敏药
- C: 外用糖皮质激素不应长期、大面积应用

D: 外用糖皮质激素可增加感染风险

答案：B

72. 抑制细菌依赖性 DNA 的 RNA 聚合酶，阻碍 mRNA 合成的药物是

A: 两性霉素

B: 磺胺嘧啶

C: 氧氟沙星

D: 利福平

答案：D

73. 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是()

A: 地匹福林

B: 毛果芸香碱

C: 噻吗洛尔

D: 拉坦前列素

答案：A

74. 四环素联用红霉素使

A: 肝毒性增加

B: 调整抗凝血药的剂量

C: 增加麦角中毒的风险

D: 口服吸收减少

答案：A

75. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

A: 克霉唑

B: 咪康唑

C: 环丙沙星

D: 灰黄霉素

答案: C

76. 用维生素 B

A: 锂

B: 钠

C: 钙

D: 钾

答案: D

77. 接受多西他赛治疗的患者为减少多西他赛导致的水钠潴留和超敏反应所采取的下列预处理方案中确的是 ()

A: 输注多西他赛前先肌注苯海拉明, 25mgq8h, 持续 3 天

B: 使用多西他赛前先口服叶酸片, 5mg, BiD 持续 3 天

C: 输注多西他赛前 30 分钟肌注维生素 B₁₂ 100mg

D: 在使用多西他赛前先口服地塞米松 8mg, BiD, 持续 3 天

答案: D

78. 属于抗雄激素类, 可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

A: 己烯雌酚

B: 氟他胺

C: 托瑞米芬

D: 他莫昔芬

答案: B

79. 不作为高血压治疗的首选药, 临床适用于伴前列腺增生症的高血压患者或与其他药物联合用于顽固性高血压治疗的药物是 ()

A: 特拉唑嗪

- B: 可乐定
- C: 肾素抑制剂
- D: 甲基多巴

答案：A

80. 疗效高，生效快，主要用于

- A: 乙胺嘧啶
- B: 氯喹
- C: 甲氟喹
- D: 伯氨喹

答案：B

81. 主要不良反应为踝部关节水肿，晨轻午重的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 地高辛
- C: 硝酸甘油
- D: 卡托普利

答案：A

82. 属于胆固醇吸收抑制剂的是()。

- A: 非诺贝特
- B: 依折麦布
- C: 阿昔莫司
- D: 阿托伐他汀

答案：B

83. 患者，女，12 岁，身高 140cm，体重 32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

- A: 替考拉宁
- B: 左氧氟沙星
- C: 万古霉素
- D: 克林霉素

答案：C

84. （2021 年真题）痰培养结果为铜绿假单胞菌，宜选用的抗菌药物是（）

- A: 青霉素 G
- B: 苯唑西林
- C: 苄星青霉素
- D: 哌拉西林他唑巴坦

答案：D

85. 兰索拉唑用于治疗胃及十二指肠溃疡的机制是

- A: 阻断 H₂ 受体
- B: 中和胃酸，升高胃内 pH
- C: 保护胃黏膜
- D: 抑制 H⁺，K⁺-ATP 酶

答案：D

86. 可用于防治夜盲症的维生素是（）

- A: 叶酸
- B: 维生素 K

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 维生素 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/297065116050010024>