专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024湖南省冷水滩区《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题内部题库及答案（历年真题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.噻嗪类利尿药可用于治疗肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症，是因为其可以抑制

A：远曲小管近端

B：Na+-Cl-共转运子

C：磷酸二酯酶

D：Na+-K+-2Cl-同向转运子

答案：C

2.使用羟甲唑啉滴鼻液期间，可能发生的不良反应是

A：心率加快

B：鼻黏膜充血

C：流泪

D：一过性针刺感

答案：A

3.在血液中几乎不与血浆蛋白结合的口服降糖药是

A：二甲双胍

B：吡格列酮

C：达格列净

D：罗格列酮

答案：A

4.高血压合并脑血管功能不全不宜选用

A: 普萘洛尔

B: 氢氯噻嗪

C: 肼屈嗪

D: 胍乙啶

答案：D

5.肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵

A: 可增加血氨浓度，诱发肝性脑病

B: 可升高门脉压力，诱发出血

C: 可降低血氨浓度，诱发肝性脑病

D: 可降低门脉压力，诱发出血

答案：A

6.利多卡因的电生理作用错误的是

A: 使传导减慢

B: 缩短复极时间

C: 提高心室颤动阈值

D: 明显影响动作电位0相

答案：D

7.哺乳期妇女应用沙丁胺醇时，早产儿会出现

A: 暂时性低血糖

B: 耐药性

C: 头痛

D: 支气管痉挛

答案：A

8.下列药物不属于大环内酯类的是

A：大观霉素

B：罗红霉素

C：泰利霉素

D：阿奇霉素

答案：A

9.治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

A：胺碘酮

B：阿利吉仑

C：沙库巴曲缬沙坦

D：阿托品

答案：D

10.顺铂

A：干扰核酸生物合成

B：直接破坏DNA结构和功能

C：干扰RNA转录

D：影响蛋白质合成和功能

答案：B

11.氨苄西林()

A：抗菌作用强，对厌氧菌有效

B：特别对铜绿假单胞菌有效

C：对G

D：对G

答案：D

12.关于噻嗪类利尿药的描述，错误的是

A: 糖尿病患者慎用

B: 可引起低钙血症

C: 痛风患者慎用

D: 肾功能不良者禁用

答案：B

13.华法林过量导致的出血可选用的拮抗剂是

A: 氨甲苯酸

B: 维生素B12

C: 维生素K1

D: 硫酸鱼精蛋白

答案：C

14.预防和治疗各种原因引起的肝性脑病使用

A: 复方氨基酸（18AA-Ⅰ）

B: 苯丙氨酸

C: 复方氨基酸注射液（3AA）

D: 复方氨基酸注射液（9AA）

答案：C

15.滴眼后可出现口腔苦昧的药物是

A: 氯霉素

B: 四环素可的松

C: 更昔洛韦

D: 利巴韦林

答案：A

16.可单独用于轻度、早期高血压的是

A：阿米洛利

B：乙酰唑胺

C：氢氯噻嗪

D：呋塞米

答案：C

17.长春新碱

A：干扰RNA转录

B：影响蛋白质合成和功能

C：直接破坏DNA结构和功能

D：干扰核酸生物合成

答案：B

18.属于高致吐风险的抗肿瘤药物是（）

A：顺铂

B：奥沙利铂

C：氟尿嘧啶

D：吉非替尼

答案：A

19.糖皮质激素禁用于低血钾患者是因为

A：抑制免疫功能只抗炎不抗菌

B：抑制蛋白质合成

C：促进胃酸分泌

D：水钠潴留

答案：D

20.体内、外均有抗凝血作用的药物是

A: 维生素B12

B: 肝素

C: 香豆素类

D: 维生素K

答案：B

21.别嘌醇抗痛风的作用机制是

A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化

B: 可促进尿酸分解，将尿酸转化为一种溶解性更好的尿囊素

C: 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

D: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸

答案：D

22.林可霉素可以作为首选药的是

A: 金葡菌致骨髓炎

B: 呼吸道感染

C: 胆道感染

D: 皮肤感染

答案：A

23.可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是()

A: 利福平

B: 对氨基水杨酸

C: 乙胺丁醇

D: 吡嗪酰胺

答案：C

24.口服可用于肠道感染的药物是

A: 庆大霉素

B: 链霉素

C: 奈替米星

D: 妥布霉素

答案：A

25.临床治疗铜绿假单胞菌感染可选用的抗生素是()

A: 阿莫西林

B: 苯唑西林

C: 哌拉西林

D: 氨苄西林

答案：C

26.可能引起持续性干咳的抗高血压药是

A: 阿利克仑（阿利吉仑）

B: 氨氯地平

C: 阿托普利

D: 硝普钠

答案：C

27.可能导致牙齿黄染的抗菌药物是

A: 多西环素

B: 加替沙星

C: 庆大霉素

D: 甲砜霉素

答案：A

28.患者女，55岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138／90mmHg，心率120次／分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 3周

B: 1周

C: 2周

D: 4周

答案：C

29.通过促进组织对葡萄糖的摄取和利用发挥作用()

A: 格列本脲

B: 艾塞那肽

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案：D

30.噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

A: 血钾

B: 血氯

C: 血钠

D: 血氨

答案：D

31.轻症糖尿病患者宜选用

A: 正规胰岛素

B: 格列喹酮

C: 二甲双胍

D: 珠蛋白锌胰岛素

答案：C

32.以下选项中，不属于沙美特罗的适应证的是()

A: 肺气肿伴气道痉挛的治疗

B: 慢性支气管炎伴气道痉挛的治疗

C: 缓解支气管痉挛的急性症状

D: 夜间哮喘的预防和维持治疗

答案：C

33.治疗钙缺乏症()

A: 葡萄糖酸钙

B: 依降钙素

C: 阿仑膦酸钠

D: 阿法骨化醇

答案：A

34.下列描述中，哪一项是胰岛素的禁忌证

A: 用于细胞内缺钾

B: 酮症酸中毒

C: 对胰岛素过敏和低血糖者

D: 胰岛素抵抗

答案：C

35.合用伊立替康可减弱作用效果的是

A: 依托泊苷

B: 琥珀胆碱

C: 顺铂

D: 米库氯铵

答案：D

36.患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片20mg/d治疗。若采用强化治疗，辛伐他汀片的最大日剂量是()。

A: 40mg

B: 80mg

C: 100mg

D: 20mg

答案：B

37.抑制排卵避孕药的较常见不良反应是

A: 肾功能损坏

B: 子宫不规则出血

C: 多毛、痤疮

D: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

答案：B

38.患者，男，15岁，因咳嗽、咳痰，发热3天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠10分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是（）

A: 肾上腺素

B: 去甲肾上腺素

C: 地塞米松

D: 多巴胺

答案：A

39.氢氯噻嗪的药理作用是()

A：提高血浆渗透性，产生组织脱水作用

B：抑制远曲小管Na

C：抑制近曲小管的碳酸酐酶活性

D：与醛固酮受体结合

答案：B

40.影响微管的装配，阻碍纺锤体的形成

A：紫杉醇

B：羟喜树碱

C：他莫昔芬

D：长春碱

答案：D

41.利奈唑胺的不良反应不包括

A：癫痫

B：血小板减少

C：头痛

D：骨髓抑制

答案：A

42.唯一被批准用于临床的选择性肝固醇吸收抑制剂是()

A：小剂量阿托伐他汀

B：小剂量氟伐他汀

C：依折麦布

D：大剂量阿托伐他汀

答案：C

43.功能性子宫出血可选用的药物是

A：雌二醇

B：他莫昔芬

C：垂体后叶素

D：缩宫素

答案：A

44.属于第三代头孢菌素的药物是()。

A：头孢氨苄

B：头孢拉定

C：头孢吡肟

D：头孢哌酮

答案：D

45.选择性直接作用于M胆碱受体，引起缩瞳，眼压下降，并有调节痉挛等作用的是

A：碳酸酐酶抑制剂

B：前列腺素衍生物

C：拟胆碱药

D：α2受体激动剂

答案：C

46.急性化脓性中耳炎患者，鼓膜穿孔后停用2%酚甘油滴耳，是因为酚甘油

A：油剂不易经穿孔进入中耳

B：对鼓室黏膜及鼓膜有腐蚀作用

C：仅有止痛作用

D: 没有抗生素水溶液效果佳

答案：B

47.长期、大剂量服用维生素D，可能引起的不良反应是

A: 血栓性静脉炎

B: 颅内压升高

C: 高胆红素血症

D: 高钙血症

答案：D

48.对痉挛性和功能性便秘者，可选用

A: 双歧杆菌

B: 双歧三联活菌胶囊

C: 酪酸菌

D: 地芬诺酯

答案：A

49.可出现酮尿或乳酸性血症的药物是

A: 胰岛素皮下注射

B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

C: 二甲双胍

D: 艾塞那肽

答案：C

50.（2017年真题）不属于糖皮质激素的适应症是（）

A: 活动性肺结核

B: 风湿

C: 系统性红斑狼疮

D: 再障

答案：A

51.可用于预防风湿热复发的药物是（）

A: 甲硝唑

B: 呋喃妥因

C: 庆大霉素

D: 苄星青霉素

答案：D

52.关于帕罗西汀的描述，错误的是

A: 用于治疗抑郁症、强迫症、惊恐障碍及社交恐怖障碍等

B: 停药时应缓慢减量至停药

C: 本品为选择性5-HT再摄取抑制剂

D: 停药时直接停服

答案：D

53.无抗结核作用的是

A: 吡嗪酰胺

B: 红霉素

C: 异烟肼

D: 乙胺丁醇

答案：B

54.下述保肝药中属于解毒类的是()

A: 甘草酸二铵

B: 多烯磷脂酰胆碱

C: 硫普罗宁

D: 复方甘草酸苷

答案：C

55.患者，女，26岁，妊娠3个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是()。

A: 青霉素G

B: 头孢氨苄

C: 阿莫西林

D: 左氧氟沙星

答案：D

56.尼尔雌醇属于

A: 孕激素

B: 雌激素

C: 雄激素

D: 糖皮质激素

答案：B

57.消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

A: 塞来昔布

B: 吲哚美辛

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿司匹林

答案：A

58.属于金属配合物类的抗肿瘤药是

A: 氮芥

B：顺铂

C：阿糖胞苷

D：长春碱

答案：B

59.宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A：痛风

B：肾绞痛

C：骨关节炎

D：胃溃疡

答案：C

60.用于治疗对阿司匹林敏感的哮喘以及预防运动性哮喘，也用于减轻季节性过敏性鼻炎引起的症状的是

A：孟鲁司特

B：沙丁胺醇

C：沙美特罗

D：茶碱

答案：A

61.重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A：每日化疗前，应用5-HT

B：5-HT

C：5-HT

D：奥美拉唑+口服地塞米松

答案：C

62.利多卡因

A：可治疗阵发性室上性心动过速

B：可治疗房性期前收缩

C：可用于房颤的复律治疗和复律后的维持

D：为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常

答案：D

63.下列哪类药物属于快速杀菌药()

A：红霉素

B：氨基糖苷类

C：多黏菌素B

D：氯霉素类

答案：B

64.属于胆固醇吸收抑制剂的是()。

A：非诺贝特

B：阿昔莫司

C：依折麦布

D：阿托伐他汀

答案：C

65.控制癫痫持续状态，可静脉注射

A：氯丙嗪

B：地西泮

C：硫喷妥钠

D：阿司匹林

答案：B

66.患儿。女，14岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状2天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（）。

A: 阿奇霉素

B: 呋喃妥因

C: 环丙沙星

D: 青霉素G

答案：B

67.他汀类所引起的肝损害特点不包括

A: 肝毒性与剂量无关

B: 所有他汀类药物都产生肝毒性

C: 使用辛伐他汀当转氨酶升高至正常值上限的3倍需停药

D: 当转氨酶升高至正常值上限的3倍以上，需要减量或停药

答案：A

68.吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是氢化可的松的

A: 25倍

B: 100倍

C: 15倍

D: 40倍

答案：B

69.（2020年真题）关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

A: 易引起直立性低血压

B: 能降低血清前列腺特异性抗原（PSA）水平

C: 小剂量可促进头发生长，用于治疗素源性脱发

D: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

答案：A

70.可致色觉异常的药物是

A：硝酸甘油

B：氨氯地平

C：地高辛

D：卡托普利

答案：C

71.硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A：释放一氧化氮

B：直接作用于血管平滑肌

C：促进前列环素的生成

D：阻断 β 受体

答案：A

72.局部抗炎作用较弱的长效糖皮质激素是

A：倍他米松

B：地塞米松

C：氢化可的松

D：泼尼松

答案：B

73.以下避孕药不受月经周期限制的是

A：孕二烯酮

B：双炔失碳酯

C：左炔诺孕酮

D：去氧孕烯

答案：B

74.（2020年真题）口服后在肝脏水解为阿昔洛韦而发挥抗疱疹病毒作用的药物是

A：泛昔洛韦

B：昔多福韦

C：喷昔洛韦

D：伐昔洛韦

答案：D

75.关于他汀类药物降脂特点的描述，错误的是

A：降低高密度脂蛋白固醇(HDL-ch)

B：降低血总胆固醇(TC)

C：较弱的降低三酰甘油(TG)的作用

D：降低血低密度脂蛋白固醇(LDL-ch)

答案：A

76.四环素联用抗凝药需要

A：肝毒性增加

B：增加麦角中毒的风险

C：口服吸收减少

D：调整抗凝血药的剂量

答案：D

77.属于硝基呋喃类的是

A：夫西地酸

B：甲硝唑

C：磺胺甲

D：呋喃妥因

答案：D

78.（2015年真题）属于糖皮质激素禁忌症的是（）。

A: 过敏性皮炎

B: 类风湿性关节炎

C: 再生障碍性贫血

D: 严重高血压

答案：D

79.属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的调节血脂药是()

A: 依折麦布

B: 辛伐他汀

C: 非诺贝特

D: 烟酸

答案：B

80.（2020年真题）主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

A: 制霉菌素

B: 特比萘芬

C: 阿莫罗芬

D: 联苯苄唑

答案：B

81.属于β2受体激动剂的平喘药是()

A: 沙美特罗

B: 孟鲁司特

C: 茶碱

D：噻托溴铵

答案：A

82.甲状腺危象选用()

A：格列本脲

B：丙硫氧嘧啶

C：胰岛素

D：二甲双胍

答案：B

83.蛔虫病和鞭虫病治疗首选

A：噻嘧啶

B：三苯双脒

C：吡喹酮

D：甲苯咪唑

答案：D

84.（2020年真题）为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

A：羧甲司坦口服液

B：布地奈德福莫特罗吸入剂

C：沙丁胺醇气雾剂

D：孟鲁司特片

答案：B

85.减少胃肠道对氢氯噻嗪的吸收，应在口服该药1小时前或4小时后服用氢氯噻嗪，该药是

A：胺碘酮

B：拟交感药

C：考来烯胺

D：多巴胺

答案：C

86.患者，男性，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T38．9℃，P90次／分，R21次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞16．9×109／L，中性粒细胞百分比84．6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A：老年人

B：推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在15~20μg/ml并且长疗程的患者

C：肝功能不全者

D：肾功能不全者

答案：C

87.伏格列波糖的降糖作用机制是

A：竞争性抑制a葡萄糖苷酶

B：直接补充胰岛素

C：提高靶组织对胰岛素的敏感性

D：刺激胰岛β细胞释放胰岛素

答案：A

88.能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

A：特拉唑嗪

B：坦洛新

C：乙酰唑胺

D: 酚苄明

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/297105024051010024