

2024 年广东省连山壮族瑶族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库（名师系列）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 夜间咳嗽宜选用的药品是

- A: 苯丙哌林
- B: 羧甲司坦
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

答案：C

2. 不宜与葡萄柚汁合用的药物是

- A: 硫酸亚铁
- B: 辛伐他汀
- C: 磺胺类药物
- D: 左旋多巴

答案：B

3. 下列具有肝药酶抑制作用的药物中，所诱导的酶系类型最多的是

- A: 胺碘酮
- B: 异烟肼
- C: 咪康唑
- D: 利福平

答案：A

4. 可提示肝细胞性黄疸的是

- A: $>342 \mu\text{mol/L}$
- B: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

答案：C

5. 以下医学检查项目中，主要用于诊断急性胰腺炎的是

- A: 尿淀粉酶
- B: 血淀粉酶
- C: 肌酸激酶增高
- D: 淀粉酶增高

答案：D

6. 关于胆石症的患者教育，错误的是

- A: 使用抗菌药物
- B: 有消化不良症状应做鉴别诊断
- C: 避免快速减重和不吃早餐
- D: 低胆固醇饮食

答案：A

7. 发病急剧，常累及双眼（或间隔 1~2 天）伴有大量的黏液性分泌物（眼屎），于夜间分泌较多，在晨起时常会被分泌物糊住双眼的是

- A: 流行性结膜炎
- B: 流行性出血性结膜炎
- C: 过敏性结膜炎
- D: 急性卡他性结膜炎

答案：D

8. 可造成儿童呼吸抑制，故 5 岁以下儿童不宜应用的是

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 喷托维林

答案：D

9. 流行性出血性结膜炎宜选用

- A: 双氯芬酸
- B: 酞丁安
- C: 益康唑
- D: 羟苄唑

答案：D

10. 需密闭，控制温度，保存中不能受潮的药品

- A: 胰酶片
- B: 脂肪乳
- C: 利福平片
- D: 低精蛋白胰岛素注射剂

答案：A

11. 可引起性功能障碍的药物是

- A: 维生素 E
- B: 西地那非
- C: 度洛西汀
- D: 沙美特罗

答案：C

12. 铅严重中毒患者出现的最难救治的临床症状是（）

- A: 中毒性肾炎
- B: 铅毒性脑病
- C: 贫血
- D: 中毒性肝炎

答案：B

13. 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是

- A: 联苯苄唑乳膏
- B: 复方苯甲酸软膏
- C: 酮康唑乳膏
- D: 氢化可的松乳膏

答案：D

14. 对蛔虫，蛲虫，鞭虫，钩虫，鞭虫，绦虫感染都有效的药物是

- A: 哌嗪
- B: 甲苯咪唑
- C: 吡喹酮
- D: 噻嘧啶

答案：B

15. 属于整合酶抑制剂(II)进入抑制剂的是

- A: 扎西他滨
- B: 恩夫韦替
- C: 沙奎那韦
- D: 奈韦拉平

答案：B

16. (2018 年真题) 患者, 女, 46 岁, 高血压病史 3 年, 2 年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛, 诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重, 采用了联合用药方案: 患者用药如下:

- A: 羟氯喹片
- B: 双氯芬酸钠缓释片
- C: 氨氯地平片
- D: 甲氨蝶呤片

答案: A

17. 麻醉药品处方印刷用纸的颜色是

- A: 淡橙色
- B: 淡绿色
- C: 淡红色
- D: 淡黄色

答案: C

18. 抗蠕虫药不宜长时间应用, 如果长时间应用将

- A: 影响糖吸收
- B: 影响蛋白代谢
- C: 影响糖代谢
- D: 影响脂肪代谢

答案: C

19. 多黏菌素可能引起

- A: 尿蛋白
- B: 尿液隐血
- C: 尿葡萄糖

D: 尿胆红素

答案：A

20. 医生开具处方，必须使用药品的名称是

A: 药品化学名

B: 药品通用名

C: 药品习用名

D: 药品商标名

答案：B

21. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

A: 阿巴卡韦

B: 雷特格韦

C: 奈韦拉平

D: 洛匹那韦

答案：D

22. 下列关于失眠药物治疗策略的说法, 正确的是()

A: 焦虑症患者存在失眠时以失眠药物为主

B: 失眠继发于或伴发于其他疾病时, 应同时治疗原发或伴发疾病

C: 药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

D: 原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯二氮?类抗失眠药

答案：B

23. 可造成儿童呼吸抑制, 故 5 岁以下的儿童不宜应用的是

A: 苯丙哌林

B: 右美沙芬

C: 喷托维林

D: 可待因

答案: C

24. 治疗真菌性阴道炎的首选非处方药是

A: 益康唑栓

B: 克霉唑栓或片

C: 甲硝唑栓

D: 咪康唑栓

答案: D

25. 丝裂霉素

A: 溶血性尿毒症

B: 出血性膀胱炎

C: 肺纤维化

D: 心脏毒性

答案: A

26. (2017 年真题) 用于评估癌痛患者疼痛程度的是 ()

A: Cochrane 证据分级

B: CTP 评分标准

C: APACHE 评分系统

D: 数字评分法

答案: D

27. 在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

- A: 二级信息源
- B: 三级信息源
- C: 一级信息源
- D: 四级信息源

答案：B

28. 治疗真菌性阴道炎可选用

- A: 复方角菜酸酯栓
- B: 克霉唑栓
- C: 复方苯甲酸酊
- D: 阿达帕林凝胶

答案：B

29. 患者，女，29 岁，孕 25+6 周，近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状。化验结果为 Hb71g / L。诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

- A: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量
- B: 快速静脉注射
- C: 先少量缓慢静注，观察无过敏反应，1 小时后继续静脉注射余下剂量
- D: 口服，每次 5ml，一日 3 次

答案：C

30. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 孟鲁司特
- B: 噻托溴铵
- C: 沙美特罗
- D: 异丙托溴铵

答案：C

31. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 餐后血糖
- B: 糖化血红蛋白（HbA1c）
- C: 空腹血糖
- D: 白细胞计数

答案：B

32. （2017 年真题）治疗水疱型脚癣宜选用（）

- A: 复方苯甲酸酊
- B: 氢化可的松软膏
- C: 维 A 酸乳膏
- D: 阿昔洛韦软膏

答案：A

33. 应贮存在凉暗处的药物是

- A: 托烷司琼注射剂
- B: 硫酸亚铁片
- C: 重组人促红细胞生成素
- D: 头孢拉定

答案：A

34. 患者，女，65 岁，52 岁绝经，自诉腰痛半年，加重 2 月，腰椎影像学检查提示腰 2 和腰 3 椎体压缩性骨折，骨密度检查提示重度骨质疏松，既往有高血压、高脂血症和系统性红斑狼疮，长期口服缬沙坦 80mg qd，阿托伐他汀 20mg qn，阿司匹林 10mg qd 和泼尼松 7.5mg qd。1 个月前因反流性食管炎加用奥美拉唑 20mg qd。否认不良嗜好，否认食物药物过敏史。

- A: 泼尼松
- B: 缬沙坦
- C: 阿司匹林
- D: 阿托伐他汀

答案：A

35. (2019 年真题) 患者，女，29 岁，孕 25+6 周近日出现乏力、困倦食欲不振、恶心等症状，化验结果为 Hb71g/L，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

- A: 口服每次 5ml，一日 3 次
- B: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后，再继续静脉滴注余下剂量
- C: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量
- D: 快速静脉注射

答案：B

36. 治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

- A: 头孢唑林
- B: 莫西沙星
- C: 青霉素
- D: 红霉素

答案：D

37. 可引起驾驶员视力模糊的药物是

- A: 东莨菪碱
- B: 抗过敏药
- C: 阿米洛利
- D: 双嘧达莫

答案：A

38. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ ，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒（正常值 13 秒），骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

- A: 低分子肝素
- B: 维生素 K1
- C: 维生素 C
- D: 鱼精蛋白

答案：D

39. 消化性溃疡的用药注意事项中，服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用 PPI，需补充

- A: 维生素 D3
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 C
- D: 维生素 E

答案：B

40. 使患者可清晰看到咨询药师的是

- A: 环境舒适
- B: 适当隐秘
- C: 位置标志明确
- D: 配备必备设备

答案：C

41. 倍他洛尔所致的主要不良反应是

- A: 支气管痉挛
- B: 血钠升高
- C: 血尿酸升高
- D: 外周血肿

答案：A

42. 心衰导致药物经肾排泄减少

- A: 肾小管重吸收增加
- B: 肾血流量减少
- C: 肾小管分泌减少
- D: 肾小球滤过减少

答案：B

43. 患者,男,65岁,诊断为高血压(2级),同时有哮喘病史,不宜选用的药物是()

- A: 卡托普利
- B: 多沙唑嗪
- C: 非洛地平
- D: 普萘洛尔

答案：D

44. 服药时，应该限制饮水的药品是

- A: 硝酸甘油
- B: 口服补液盐
- C: 苯溴马隆
- D: 阿仑膦酸盐

答案：A

45. 具有沉淀作用，不宜在胃内滞留，可用浓茶代替的洗胃液是

- A: 活性炭混悬液
- B: 1：5000 高锰酸钾
- C: 淀粉溶液
- D: 3%鞣酸溶液

答案：D

46. 能显示药师的文献评价能力和技巧的咨询服务方法步骤是

- A: 对问题进行确定并归类
- B: 对查阅的资料进行评价、分析和整理
- C: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- D: 随访工作效果，并建立档案

答案：B

47. 影响肝药酶活性，药物疗效降低

- A: 地西泮
- B: 呋塞米
- C: 胰岛素
- D: 氨茶碱

答案：A

48. 危重支气管哮喘疾病的临床表现为

- A: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失
- B: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常
- C: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉
- D: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 >30 次 / 分，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常 >120 次 / 分，奇脉， PaO_2

答案：A

49. 1 天给药 1 次；需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍针对

- A: 半衰期小于 30 分钟
- B: 半衰期大于 30 小时
- C: 半衰期 8~24 小时
- D: 半衰期大于 24 小时

答案：D

50. 苯丙胺中毒

- A: 5%碳酸氢钠溶液
- B: 1%氯化钠溶液
- C: 药用炭混悬液
- D: 1%硫酸镁溶液

答案：C

51. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体： $T38^{\circ}\text{C}$ ，肾区叩击痛，血分析见 $WBC15 \times 10^9/L$

- A: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

- B: 首选针对革兰阳性菌的药物
- C: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物
- D: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林

答案：B

52. γ -谷氨酰转移酶正常参考区间是

- A: 男性 11~50U/L
- B: ≤ 30 U/L
- C: < 40 U/L
- D: ≤ 50 U/L

答案：A

53. 患者，男性，72 岁，患有前列腺增生症，常出现尿频、排尿困难，排尿后尿不尽、残余尿增多现象。诊断为充盈性尿失禁，给予阿夫唑嗪治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 鼻咽炎和尿路感染
- B: 直立性低血压
- C: 口干、便秘、尿潴留
- D: 卧位和坐位时高血压

答案：B

54. 呋塞米

- A: 宜餐前服用
- B: 宜睡前服用
- C: 宜清晨服用
- D: 宜餐后服用

答案：C

55. 肠外营养 1g 葡萄糖能提供的热量是

A: 9kcal

B: 3kcal

C: 7kcal

D: 4kcal

答案：D

56. 对某些患者应教会正确量取内服液体制剂，是针对

A: 交代药品贮存条件与方法

B: 交代用药途径及用药方法

C: 交代用药注意事项

D: 交代药物的用量

答案：D

57. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A: 阿奇霉素

B: 克拉霉素

C: 米诺环素

D: 链霉素

答案：D

58. 属于选择性 5-HT 再摄取抑制剂的是 ()

A: 非那雄胺

B: 阿夫唑嗪

C: 氟伏沙明

D: 特拉唑嗪

答案: C

59. 血管紧张素转化酶抑制剂

A: 阿利吉仑

B: 依普利酮

C: 雷米普利

D: 阿米洛利

答案: C

60. 以下患者中，最适宜口服给药的是

A: 慢性病或轻症患者

B: 胃肠反应大的患者

C: 吞咽困难的老人

D: 病情危重的患者

答案: A

61. 患者，男，75 岁，有高血压，长期服用厄贝沙坦氢氯噻嗪片（150mg/12.5mg）1 片 qd，血压控制平稳。因排尿困难、尿频和尿不尽感就诊，诊断为良性前列腺增生。给予非那雄胺片 5mgqd，特拉唑嗪片 5mgqd。患者用药后出现头晕，前来咨询。

A: 头晕可能与患者焦虑有关，继续用药会逐渐缓解

B: 非那雄胺可引起直立性低血压，头晕可能与此相关

C: 非那雄胺可增强降压药的降压效果，建议更换降压药

D: 建议睡前服用特拉唑嗪，有助于缓解头晕症状

答案: D

62. 可能导致血小板 (PLT) 计数减少的药物是

- A: 胰岛素
- B: 阿司匹林
- C: 苯妥英钠
- D: 氯氮平

答案：B

63. 可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

- A: 阿司匹林
- B: 菠萝蛋白酶
- C: 伪麻黄碱
- D: 颠茄浸膏片

答案：C

64. 具有末梢神经炎毒性，必要时需补充 B 族维生素和神经营养剂的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 长春新碱
- C: 甲氨蝶呤
- D: 环磷酰胺

答案：B

65. 下列治疗良性前列腺增生症的药物中，可以引起性功能减退的是

- A: 索利那新
- B: 奥昔布宁
- C: 托特罗定
- D: 非那雄胺

答案：D

66. 病毒神经氨酸酶抑制剂（扎那米韦、奥司他韦）使用的最佳时间是

- A: 在流感症状严重 24 小时内
- B: 在流感症状初始时
- C: 在流感症状初始 48 小时内
- D: 在流感症状严重时

答案：C

67. “发现并确认‘仙牛健骨颗粒’III期临床试验过程中连续发生严重不良事件，即暂停其新药试验”显示药物警戒的作用是

- A: 发现药品质量问题
- B: 发现与规避假、劣药品流入市场
- C: 药品上市前风险评估
- D: 药品上市后风险评估

答案：C

68. 适用于 1-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动患者的是

- A: 苯海索
- B: 左旋多巴
- C: 恩托卡朋
- D: 司来吉兰

答案：C

69. 患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是()

- A: 吡嗪酰胺
- B: 利福平
- C: 异烟肼

D: 乙胺丁醇

答案：C

70. 下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是()

A: 恶性贫血者需要终生维持治疗

B: 可静脉滴注维生素 B₁₂100~500 μg

C: 老年人和酗酒者为高危人群

D: 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗

答案：B

71. 氟乙酰胺中毒最突出的表现是

A: 腐蚀性口腔炎

B: 抽搐

C: 呕吐物有蒜臭味

D: 口内有金属味

答案：B

72. 适用于 L-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

A: 司来吉兰

B: 苯海索

C: 恩托卡朋

D: 左旋多巴

答案：C

73. 患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下:

A: 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理

B: 维生素 C 片用法用量不合理

C: 氨溴索片给药剂量不合理

D: 左氧氟沙星片给药间隔不合理

答案: D

74. 适用于静脉推注的抗肿瘤药为

A: 阿糖胞苷

B: 塞替派

C: 氮芥

D: 甲氨蝶呤

答案: C

75. 与舒筋活络酒不宜联用的药物是

A: 苯巴比妥

B: 阿托品

C: 可待因

D: 氢氧化铝

答案: A

76. 下列药物中，属于抗风湿植物药制剂的是

A: 紫杉醇

B: 青蒿素

C: 银杏叶

D: 青藤碱

答案: D

77. 轻度支气管哮喘疾病的临床表现为

A: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 >30 次 / 分，常有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常 >120 次 / 分，奇脉， PaO_2

B: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉

C: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失

D: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常

答案：D

78. 用于用药错误分级的是（）

A: CoChrAnE 分级

B: CoCkroft-GAult 公式

C: CLHD 公式

D: NCEMERP 标准

答案：D

79. 容易引起脱发的是（）

A: 氟尿嘧啶

B: 阿霉素

C: 吉非替尼

D: 博来霉素

答案：B

80. 药品不良反应 (ADR) 的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价

A: 肯定

B: 很可能

C: 可能无关

D: 可能

答案: B

81. 欲调配 10%葡萄糖注射液 1000ml，应该分取 5%葡萄糖注射液与 50%葡萄糖注射液的用量是（可用十字交叉法计算）

A: 885ml, 115ml

B: 888ml, 112ml

C: 890ml, 110ml

D: 895ml, 105ml

答案: C

82. 可用于了解肾小球滤过功能的是

A: 胆固醇

B: 肌酐

C: 淀粉酶

D: 尿素氮

答案: D

83. 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是()

A: 10—80mg

B: 5—20mg

C: 40—200mg

D: 10—20mg

答案: D

84. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 氨氯地平
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 氯吡格雷

答案：A

85. 肝功能不全者服用由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物时

- A: 避免使用
- B: 一般无需调整剂量
- C: 须谨慎使用，必要时减量给药
- D: 必须减量应用

答案：C

86. 患者，女，51 岁，临床诊断为“胃食管反流病”，CrCl: 45ml / min，以下哪种药物需要调整给药剂量

- A: 硫糖铝
- B: 法莫替丁
- C: 兰索拉唑
- D: 多潘立酮

答案：B

87. 患者，男，60 岁，诊断为高血压伴蛋白尿，首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 螺内酯
- D: 氯沙坦

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/298112100045007022>