2024年甘肃省玉门市《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试真题题库及答案【必刷】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

A：根据儿童特点选择适宜的给药方案

B：避免食物的影响

C：密切监护

D：严格掌握用药剂量

答案：A

2.主要检查性状一致、色泽均匀、片面光滑、无毛糙起孔现象的是

A：片剂

B：软膏剂

C：胶囊剂

D：糖浆剂

答案：A

3.用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药物是

A：吡嗪酰胺

B：利福平

C：乙胺丁醇

D：链霉素

答案：B

4.脑梗死的治疗药物，抗凝治疗

A：阿替普酶

B：阿司匹林

C：甘露醇

D：普通肝素

答案：D

5.乳果糖治疗功能性便秘的主要机制是

A：刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排便

B：润滑并刺激肠壁，软化大便

C：在肠道分解，分解产物使水和电解质保留，致容积性排便

D：增强胃肠道中的蠕动反射和推进运动模式

答案：C

6.高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐，宜选用的止吐治疗方案是

A：化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松瑞和阿瑞吡坦，化疗结束后给予阿瑞吡坦和地塞米松

B：化疗联合使用昂丹司琼和地塞米松，化疗结束后给予地塞米松或昂丹司琼

C：化疗前使用昂丹司琼，化疗后不需要继续使用止吐药

D：化疗前使用阿瑞吡坦，化疗后需要继续使用止吐药

答案：A

7.用药剂量相同，妊娠期的血药浓度低于非妊娠期，是由于

A：妊娠晚期血流动力学发生改变较多

B：妊娠期药物分布容积明显增加

C：胃肠活动程度减弱，使吸收减慢

D: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低

答案：B

8.（2017年真题）患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L（正常值:3.9～6.1mmol/L），餐后血糖148mmo/L（正常值:＜7.8mmol/L），血尿酸580μmol/L（正常值:男性180～440μmol/L），LDL-c3.7mmo/L（正常值:2.1~3.1mmo/L）肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A: 心律失常

B: 腹胀

C: ALT升高

D: 低血糖

答案：B

9.某患者，女，45岁，身高160cm，体重75kg，临床诊断为2型糖尿病。实验室检查：空腹血糖8.7mmol/L，餐后2小时血糖13.1mmol/L，糖化血红蛋白7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

A: 格列齐特

B: 胰岛素+二甲双胍

C: 胰岛素

D: 二甲双胍

答案：D

10.患者，男，66岁，帕金森病史3年，服用复方左旋多巴控制病情，药师对患者及其家属进行的用药指导错误的是

A: 早.中餐应高蛋白饮食，减少碳水化合物的摄入
B: 为达到治疗效果，应小剂量滴定增量
C: 不能自行停药或随意改变剂量
D: 应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开2～3h
答案：A

11.患者，女，58岁，有2型糖尿病病史，因头疼、头晕就诊。体征和实验室检查：餐前血糖7.8mmol/L，餐后血糖11.2mmoL/L，糖化血红蛋白8.8%，血压166/96mmHg，蛋白尿>1g/24h。推荐在降糖的基础上合并选用
A: 氢氯塞嗪
B: 二甲双胍
C: 特拉唑嗪
D: 赖诺普利
答案：D

12.可致齿龈增生的抗癫痫药为（）
A: 卡马西平
B: 丙戊酸钠
C: 苯巴比妥
D: 苯妥英钠
答案：D

13.易受光线影响而变质的药品是
A: 阿卡波糖片
B: 头孢曲松钠
C: 硝酸甘油
D: 复方甘草合剂

答案：C

14.第二类精神药品处方印刷用纸为

A：淡绿色

B：白色

C：淡黄色

D：淡红色

答案：B

15.关于粪胆原和粪隐血叙述正确的是

A：正常情况下，粪便中的粪胆原检查呈阳性反应

B：粪胆原大部分以原形的形式经直肠被排出体外

C：只有在消化道出现溃疡的情况下，才会粪隐血呈阳性

D：一般情况下，粪便中可见红细胞，但检测结果通常为阴性

答案：A

16.可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

A：菠萝蛋白酶

B：伪麻黄碱

C：颠茄浸膏片

D：阿司匹林

答案：B

17.起效快，可迅速缓解急性哮喘发作和支气管平滑肌痉挛的药品是

A：扎鲁司特

B：布地奈德

C：沙丁胺醇

D: 羧甲司坦

答案：C

18.吸附力强、可阻止毒物吸收的是

A: 药用炭混悬液

B: 1%氯化钠溶液

C: 淀粉溶液

D: 1%硫酸镁溶液

答案：A

19.是否增加房颤患者死亡率尚无定论，可谨慎地用于房颤的心室率控制的是()

A: 美托洛尔

B: 地尔硫

C: 地高辛

D: 普罗帕酮

答案：C

20.冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

A: 25～75mg/d

B: 75～150mg/d

C: 25～50mg/d

D: 150～300mg/d

答案：B

21.在消化性溃疡形成中起到关键作用的因素为（）

A: 胃酸

B: 胃黏膜屏障的完整性

C: H.pylori 感染

D: 胃黏膜血流减少

答案：A

22.下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是：B

A: 血小板计数<100×10

B: 急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是48小时

C: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

D: 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快

答案：A

23.以下有关肝功能不全病人用药原则的叙述中，不正确的是

A: 特别应避免与肝毒性的药物合用

B: 避免或减少使用对肝脏毒性大的药物

C: 选用从肝脏排泄的药物

D: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案

答案：C

24.从事药学服务的药师应具备沟通能力。此项要求的重要性不是

A: 可杜绝投诉事件

B: 可使患者获得有关用药指导

C: 可提高公众对药师的认知度

D: 是药师实施药学服务的基础

答案：A

25.嗜酸性粒细胞正常参考区间是

A: 0～0.01

B: 0.01～0.05

C: 0.20～0.40

D: 0.03～0.08

答案：B

26.支气管扩张的临床表现是

A: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

B: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达2～3个月

C: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

D: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

答案：D

27.用药错误A级（1级）的标准

A: 患者已使用，但未造成伤害

B: 发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用

C: 差错造成患者暂时性伤害，需要采取预防措施

D: 客观环境或条件可能引发差错

答案：D

28.二甲双胍用于非糖尿病患者的减肥

A: 超适应证用药

B: 盲目联合用药

C: 非适应证用药

D: 过度治疗用药

答案：A

29.（2016年真题）治疗口腔溃疡时，贴敷于溃疡处，每处1片，一日不得超过3片的药物是（）。

A：冰硼咽喉散

B：甲硝唑口腔粘贴片

C：地塞米松粘贴片

D：西地碘含片

答案：C

30.抗高血压药物中，噻嗪类利尿药的主要不良反应为()。

A：血钾增高

B：直立性低血压

C：血钾减低、血钠减低、血尿酸升高

D：房屋传导阻滞，心功能抑制

答案：C

31.为血液中的主要吞噬细胞，在白细胞中所占比例最高，且在急性感染中起重要作用的细胞为

A：嗜酸性粒细胞

B：嗜碱性粒细胞

C：中性粒细胞

D：淋巴细胞

答案：C

32.可告知患者采取如穿戴宽松的鞋袜和手套，避免反复揉搓手脚，避免长时间阳光直射等措施预防药物不良反应的是

A：顺铂

B：奥沙利铂

C：卡铂

D：卡培他滨

答案：D

33.患者，男，50岁，临床诊断为“焦虑障碍”，给予氟西汀20mgqd治疗。对该患者的用药指导，错误的是

A：氟西汀应于睡前服用

B：不得随意自行调整氟西汀剂量

C：服用氟西汀期间不能饮酒

D：不能突然停止服用氟西汀

答案：A

34.影响伊曲康唑药效的PK/PD参数是

A：Cmax/MIC

B：%T>MI

C：AUC0～24/MIC

D：Cmax

答案：C

35.药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

A：成本-效果分析

B：最小成本法

C：成本-效益分析

D：最大成本法

答案：A

36.以下药物中，肝病患者应该慎用的是

A：泛酸钙

B: 氯丙嗪
C: 谷氨酸
D: 甘草酸二铵
答案：B

37.说明书中没有儿童用药剂量时,可以根据儿科用药换算方法进行计算。下列计算方法错误的是()
A: 小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/小儿体表面积(m2)
B: 儿童剂量=成人剂量×小儿体重(kg)/70
C: Fried公式,婴儿药物剂量=月龄×成人剂量/150
D: 儿童剂量=成人剂量×儿童体表面积(m2)/1.73(m2)
答案：A

38.患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高160cm，体重70kg;白细胞8.0×10
A: 格列齐特
B: 辛伐他汀
C: 非诺贝特
D: 二甲双胍
答案：D

39.与二、三级信息源相比一级信息源的特点是
A: 内容更新
B: 对于查询的药物信息可以提供丰富的内容供读者参考
C: 对一个具体的问题提供的信息全面详实（简明扼要）
D: 内容广泛，使用方便
答案：A

40.目前推荐的绝经激素治疗窗口期是

A：绝经后15年之内或60岁以后

B：绝经后10年之内或60岁以前

C：60岁以后

D：绝经后5年之内

答案：B

41.噻嗪类利尿剂的主要不良反应是

A：足踝部水肿

B：直立性低血压

C：血尿酸升高

D：支气管痉挛

答案：C

42.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约2~5次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC：5×10

A：分泌性腹泻

B：感染性腹泻

C：动力性腹泻

D：消化不良性腹泻

答案：B

43.临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

A：病例数目少

B：考察不全面

C：管理漏洞

D：观察时间短

答案：B

44.（2015年真题）处方中“餐前给药”的外文缩写是（）。

A：po

B：pc

C：Ac

D：qn

答案：C

45.应用 α-葡萄糖苷酶抑制药时注意事项错误的是

A：餐后服用可减少胃肠道刺激

B：服用后常致胀气，可缓慢增加剂量和控制饮食减轻

C：与胰岛素或磺脲类药联合应用，可增加发生低血糖的危险

D：非磺酰脲类胰岛素促泌剂与 α-葡萄糖苷酶抑制药合用易出现低血糖现象

答案：A

46.患者，女，16岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为37．4℃，确诊为尿路感染。

A：铜绿假单胞菌

B：大肠埃希菌

C：白色念珠菌

D：金黄色葡萄球菌

答案：B

47.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 紫菜

B: 海带

C: 不含碘的食用盐

D: 虾皮

答案：C

48.患者，男，50岁，血压170/90mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是

A: 利尿剂+ARB

B: α 受体阻滞剂+ACEI

C: β 受体阻滞剂+ARB

D: 利尿剂+CCB

答案：D

49.癌症患者采用伊立替康化疗后出现水样腹泻时，应立即给予

A: 洛哌丁胺

B: 双歧杆菌

C: 昂丹司琼

D: 小檗碱

答案：A

50.患者，男性，36岁，主因“反复上腹部疼痛3年，加重伴黑便2天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院3年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前2天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排3次，每次约2509左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36．2℃、P84次／分、R20次／分、BP110／70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音3～5次／分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有-1．5cm×2cm椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 阿莫西林1000mgbid+克拉霉素500mgbid+艾司奥美拉唑20mgbid+枸橼酸铋钾220mgbid；疗程2周

B: 左氧氟沙星500mgqd+呋喃唑酮100mgbid+四环素500mgqid+枸橼酸铋钾220mgbid，疗程2周

C: 四环素500mgtid+甲硝唑400mgtid+艾司奥美拉唑20mgbid+枸橼酸铋钾220mgbid。疗程2周

D: 克拉霉素500ragbid+左氧氟沙星200mgbid+甲硝唑400mgqid+艾司奥美拉唑20mgbid，疗程2周

答案：C

51.患者，男，54岁，2周前痛风急性发作，经治疗后病情缓解，后期针对其痛风的治疗不宜选用的药物是()

A: 非布索坦

B: 苯溴马隆

C：秋水仙碱

D：别嘌醇

答案：C

52.（2015年真题）患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 曲美他嗪片

B: 氨氯地平片

C: 特拉唑嗪片

D: 阿司匹林肠溶片

答案：C

53.可帮助人短时间内急速降低体重的是

A: 利尿剂

B: 肽类激素

C: 麻醉药品

D: 蛋白同化激素

答案：A

54.患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温39．1℃，血压138／80mmHg，心率102次／分，呼吸32次／分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数11．2×109／L，中性粒细胞百分比85％。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 阿奇霉素

B: 左氧氟沙星+阿奇霉素

C: 阿莫西林一克拉维酸钾+阿奇霉素

D: 多西环素

答案：C

55.(常用的特殊解毒剂的适应证)，急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

A：纳洛酮

B：乙酰半胱氨酸

C：二巯丁二钠

D：谷胱甘肽

答案：A

56.患者，男，72岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂200μgbid吸入，沙丁胺醇气雾剂100pgpm吸入，氨氯地平片5mgqd口服及硝酸甘油片0.5mgpm舌下含服。

A：呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10秒→漱口

B：呼气→摇匀→揿压阀门并深吸气→屏气约10秒→漱口

C：漱口→摇匀→呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10秒

D：摇匀→呼气→深吸气同时揿压阀门→屏气约10秒→漱口

答案：D

57.咳嗽变异性哮喘可选用的药物是

A：沙丁胺醇

B：倍氯米松

C：沙美特罗+氟替卡松

D：异丙托溴铵

答案：C

58.和含铁或钙离子的药物合用后，在胃肠道可以发生络合反应而导致生物利用度降低的药物是

A：丙磺舒

B：利福平

C：左氧氟沙星

D：多潘立酮

答案：C

59.下列药学服务的对象中，不属于药学服务特殊人群的是

A：特殊体质者

B：住院患者

C：小儿、老年人

D：血液透析者

答案：B

60.哺乳期妇女应用后可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状，男婴则出现乳房增大的药物是

A：卡托普利

B：四环素

C：含雌、孕激素的避孕药

D：喹诺酮类药物

答案：C

61.（2018年真题）患者,男,80岁,临床诊断为前列腺增生，给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是（）

A：每日服用一次,定期监测血糖,防止发生低血糖反应

B：睡前服用,定期监测肝功能

C：睡前服用,起床站立时应缓慢,预防体位性低血压

D: 睡前服用,注意监测肾功能

答案：C

62.用二甘醇替代丙二醇所致的假药事件是

A: 亮菌甲素事件

B: 鱼腥草事件

C: 关木通事件

D: 欣弗事件

答案：A

63.Ⅴ级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于

A: C级

B: D级

C: B级

D: E级

答案：B

64.沿疗滴虫性阴道炎首选的药物是()

A: 伏立康唑片

B: 莫匹罗星软膏

C: 吲哚美辛栓

D: 甲硝唑栓

答案：D

65.李女士，40多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

A：文拉法辛

B：地西泮

C：唑吡坦

D：氯苯那敏

答案：D

66.可待因属于

A：β受体阻断剂

B：麻醉药品

C：利尿剂

D：精神刺激剂

答案：B

67.属于HIV蛋白酶抑制剂的是

A：扎西他滨

B：沙奎那韦

C：奈韦拉平

D：恩夫韦替

答案：B

68.关于HBV，下列说法正确的为

A：乙型肝炎一般为自限性疾病?

B：HBV是一种经肠道传播的RNA病毒?

C：加热100℃一分钟就可使乙肝病毒失去活性？

D：治疗HBV的抗病毒药包括 α-干扰素和核苷酸类似物两大类？

答案：D

69.以快速、准确地获得问题的答案是指

A: 对文献进行评价、分析和整理

B: 确立有效的检索方法、查阅文献

C: 形成答案并以口头形式提供给询问者

D: 对问题进行确定并归类

答案：B

70.药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

A: 患者二?

B: 患者三?

C: 患者一?

D: 患者四?

答案：D

71.（2017年真题）患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L（正常值:3.9～6.1mmol/L）,餐后血糖148mmo/L（正常值:<7.8mmol/L），血尿酸580μmol/L（正常值:男性180～440μmol/L）,LDL-c3.7mmo/L（正常值:2.1~3.1mmo/L）肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A: 阿卡波糖

B: 甘精胰岛素

C: 二甲双胍

D: 格列齐特

答案：A

72.属于高选择性 α4β2 尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

A: 伐尼克兰

B: 尼古丁替代药物

C: 可乐定

D: 安非他酮

答案：A

73.晚发型或伴有智能减退的患者，帕金森病治疗首选药物为（）

A: 金刚烷胺

B: 左旋多巴

C: 苯海索

D: 司来吉兰

答案：B

74.阿托伐他汀钙的日剂量范围是()

A: 10—20mg

B: 5—20mg

C: 10—80mg

D: 40—200mg

答案：C

75.马来酸氯苯那敏（扑尔敏）用于良性前列腺增生症患者，导致尿潴留，属于

A: 有禁忌证用药

B: 超适应证用药

C: 无适应证用药

D: 过度治疗用药

答案：A

76.（抗癫痫药物的选择）癫痫全身强直阵挛性发作的一线用药是（）

A: 乙琥胺

B: 扑米酮

C: 加巴喷丁

D: 卡马西平

答案：D

77.如果 ACEI 引起干咳可

A: 慎用甲基多巴

B: 联用他汀类

C: 给予硫酸亚铁

D: 停用 ACEI 或减量

答案：C

78.根据 TDM 结果调整给药方案的方法不包括

A: 稳态一点法

B: 一点法

C: 计分推算法

D: 重复一点法

答案：C

79.（2019年真题）患者，男，68岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天入院。查体:体温39.1℃，血压138/80mmHg，心率102次/分，呼吸32次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果:白细胞计数11.2×109/L，中性粒细胞百分比85%。胸部X线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断:社区获得性肺炎。

A: 莫西沙星

B: 哌拉西林他唑巴坦

C: 阿奇霉素

D: 头孢哌酮舒巴坦

答案：A

80.下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是

A: 地西泮

B: 华法林

C: 头孢呋辛

D: 青霉素G

答案：A

81.剧烈频繁干咳宜选用的药物是

A: 阿司匹林

B: 可待因

C: 吗啡

D: 多奈哌齐

答案：B

82.（2018年真题）下列药物中,可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是（）

A: 阿司匹林

B：银杏叶片

C：叶酸

D: 口服避孕药

答案：D

83.用药方法

A: 这种药能报销吗

B: 这药能治我这种病吗

C: 这次拿的“×××”（商品名）是我以前一直服用的“格列齐特”吗

D: 中午忘吃药了怎么办

答案：D

84.镇咳作用强度为可待因的1/3,咳嗽较弱者宜选用，同时可使痉挛的支气管平滑肌松弛，降低气道阻力的是

A: 喷托维林

B: 羧甲司坦

C: 可待因

D: 苯丙哌林

答案：A

85.营养性巨幼细胞性贫血主要因为缺乏

A: 叶酸和(或)维生素B

B: 白细胞

C: 维生素C

D: 鞣酸

答案：A

86.下列关于乙型肝炎病毒“大三阳”的表述，正确的是

A：如果肝功能正常，可定期监测，不需要抗病毒治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/298143066043007022