

2023 年-2024 年护师类之主管护师能力检测试卷 B

卷附答案

单选题（共 45 题）

1、在社区居民的健康管理中，应实施二级预防干预的对象是（ ）。

- A. 老年痴呆居民
- B. 乳腺癌早期的居民
- C. 患淋病的居民
- D. 有糖尿病家族史的中、老年居民
- E. 股骨颈骨折恢复期居家修养的居民

【答案】 D

2、小儿，5 岁。体温突然升高达 41℃，剧烈头痛、呕吐，4 小时左右发生惊厥，后反复发作并很快昏迷。急送医院后初步诊断为中毒型细菌性痢疾，收住院治疗。根据患儿情况，最有可能是本病的（ ）

- A. 休克型
- B. 脑型
- C. 肺型
- D. 肠型
- E. 混合型

【答案】 B

3、患者女性，38 岁。葡萄胎病史 10 年，2 个月前开始出现无诱因持续阴道流血，量时多时少。诊刮病理报告结果：见滋养细胞增生活跃，未见绒毛结构。最可能诊断

- A. 绒癌

- B. 子宫内膜癌
- C. 侵蚀性葡萄胎
- D. 功血
- E. 子宫肌瘤

【答案】 A

4、诊断急性胰腺炎时，血清淀粉酶至少应超过

- A. 500u / dl
- B. 600u / dl
- C. 150u / dl
- D. 200u / dl
- E. 300u / dl

【答案】 A

5、患儿，5岁，体重25kg，在家玩耍时不慎打翻开水瓶，双下肢被开水烫伤后皮肤出现大水疱、皮薄，疼痛明显，水疱破裂后创面为红色。

- A. 迅速脱离热源
- B. 创面涂抹甲紫
- C. 用自来水大量冲洗双下肢
- D. 大量补液
- E. 迅速送往医院

【答案】 B

6、女，42 岁。因在高热环境下持续工作而产生头痛、头晕、全身乏力、多汗等症状，不久体温迅速升高到 41℃，并出现颜面潮红、昏迷、休克。下列哪项降温措施最宜采用

- A. 乙醇擦拭
- B. 应用赖氨酸阿司匹林（来比林）静推
- C. 冬眠合剂
- D. 物理降温+药物降温
- E. 冰盐水灌肠

【答案】 D

7、子宫脱垂的临床表现不包括（ ）。

- A. 便秘
- B. 尿潴留
- C. 月经失调
- D. 腰骶部酸痛
- E. 自觉外阴有肿物脱出

【答案】 C

8、某糖尿病患者采用预混 30/70 胰岛素皮下注射，每日早餐及晚餐前各一次。近日来，患者常于午餐前出现出汗、手抖，考虑其原因是

- A. 低血糖
- B. 药物过敏
- C. 精神紧张
- D. 低血压
- E. 甲亢

【答案】 A

9、下列哪一项不是下肢深静脉血栓形成的原因

- A. 血流缓慢
- B. 血液高凝状态
- C. 髂静脉受压
- D. 腹压升高
- E. 静脉内膜损伤

【答案】 D

10、男性，40 岁，左下肢静脉曲张 10 年，内踝上方溃疡反复发作 4 年，下列哪些治疗是错误的

- A. 积极治疗患肢静脉曲张
- B. 休息时抬高患肢，下地前用弹力袜
- C. 温盐水湿敷创面
- D. 溃疡创面使用 5%鱼肝油酸钠
- E. 切除溃疡并植皮

【答案】 D

11、慢性阻塞性肺病 (COPD) 最确切的定义是指

- A. 具有气道阻塞特征的慢支和肺气肿
- B. 支气管哮喘合并阻塞性肺气肿及肺心病
- C. 慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿及肺心病
- D. 单纯性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿

E. 喘息性慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿

【答案】 A

12、患者，女性，35 岁。孕 36 周，以往产前检查无异常，近 1 周出现双下肢水肿至膝部，伴头晕、视物不清，检查 BP160/110mmHg，尿蛋白（++），胎心好。对该患者应该采取的处理措施是

A. 立即剖宫产

B. 积极治疗至足月后终止妊娠

C. 积极治疗 24～48 小时，如上述症状不缓解，考虑终止妊娠

D. 行人工破膜后缩宫素静脉滴注引产

E. 积极治疗，等待自然分娩

【答案】 C

13、艾滋病病人最常见的机会性感染是（ ）。

A. 巨细胞病毒脑炎

B. 隐球菌脑膜炎

C. 肺孢子菌肺炎

D. 肺结核

E. 脑弓形虫病

【答案】 C

14、被 HIV 污染的针刺伤后，错误的处理方法是

A. 挤压

B. 消毒

C. 冲洗

- D. 包扎
- E. 注射相应药物

【答案】 D

15、主要通过飞沫传播的传染病是（ ）。

- A. 甲型肝炎
- B. 艾滋病
- C. 肺结核
- D. 尖锐湿疣
- E. SARS

【答案】 C

16、为确保安全治疗，护士入户为病人静脉输液时应（ ）。

- A. 征得家属同意
- B. 要求家属在场
- C. 备齐所需物品
- D. 核对医嘱及病人
- E. 告知家属准备环境

【答案】 D

17、计划生育中，对晚婚晚育的规定是，按国家法定晚婚年龄向后推迟几年？（ ）

- A. 1 年
- B. 2 年

C. 3 年

D. 4 年

E. 5 年

【答案】 B

18、新生儿败血症的常见致病菌为

A. 葡萄球菌

B. 铜绿假单胞菌

C. 大肠埃希菌

D. 破伤风杆菌

E. B 族链球菌

【答案】 A

19、急性胰腺炎患者急性期后，腹痛和呕吐基本消失后的饮食要求是

A. 高热量、高蛋白、高维生素、易消化饮食

B. 无渣、温热流食

C. 少量低脂、低糖流质饮食

D. 适当热量，每日蛋白质 0.8~1.0g/kg，植物蛋白为主

E. 逐步恢复正常饮食，忌高脂肪、高蛋白饮食

【答案】 C

20、患者男，66 岁。高血压病 10 年。4 天前，患者清晨出现昏迷，右侧肢体不能动。查体：血压 180/90mmHg，中度昏迷，瞳孔正常，右侧鼻唇沟浅，压眶右侧上下肢未见运动，四肢腱反射未引出，双侧病理征阳性。病后 7 小时，脑 CT

检查未见异常，3 天后复查 CT，见左侧额颞顶区大片低密度影。目前的诊断是（ ）。

- A. 脑栓塞
- B. 脑血栓形成
- C. 脑叶出血
- D. 基底节出血
- E. 蛛网膜下腔出血

【答案】 B

21、下列药物中，治疗出血坏死性急性胰腺炎效果最佳的是

- A. 阿托品
- B. 卡托普利
- C. 酚磺乙胺（止血敏）
- D. 施他宁
- E. 泼尼松

【答案】 D

22、Ⅱ型呼吸衰竭采用（ ）。

- A. 低流量持续给氧
- B. 低流量间歇给氧
- C. 中流量间歇给氧
- D. 较高浓度给氧
- E. 面罩加压给氧

【答案】 A

23、男性，45 岁。因急性广泛前壁心肌梗死收住 CCU，在心电监护示波器上观察到心电波形突然变成形态、振幅频率极不规则的波动，QRS-T 波群不可辨认， 血压读数为 56/22 mmHg，应该立即采取的措施是

- A. 非同步电复律
- B. 同步电复律
- C. 静推利多卡因
- D. 静推肾上腺素
- E. 静推心三联

【答案】 A

24、在下列甲状腺癌中，最常见的是

- A. 乳头状腺癌
- B. 髓样癌
- C. 未分化癌
- D. 滤泡性腺癌
- E. 小细胞癌

【答案】 A

25、佝偻病活动期维生素 D 口服用量为（ ）。

- A. 400～800IU/天
- B. 1000～2000IU/天
- C. 2000～4000IU/天
- D. 10000～20000IU/天
- E. 20000～30000IU/天

【答案】 C

26、昏迷病人对强烈痛性刺激有反应，瞳孔对光反射存在，可判断其昏迷程度为（ ）。

- A. I 度
- B. 浅II度
- C. 轻度
- D. 中度
- E. 深度

【答案】 C

27、甲肝的主要传播途径

- A. 粪口途径
- B. 空气传播
- C. 虫媒传播
- D. 接触传播
- E. 性传播

【答案】 A

28、关于静脉补钾的浓度叙述正确的是

- A. 静脉推注 0.3%氯化钾
- B. 静脉滴注 0.3%氯化钾
- C. 静脉滴注 0.3%氯化钾
- D. 静脉推注 0.03%氯化钾

E. 静脉滴注 0.03%氯化钾

【答案】 B

29、适用于哺乳期妇女的是

A. 宫内节育器

B. 短效口服避孕药

C. 输卵管结扎术

D. 探亲避孕片

E. 长效口服避孕药

【答案】 A

30、患者男，69 岁。有动脉粥样硬化病史 20 年，近期多次出现突发的右侧肢体无力+麻木，数分钟后可自行缓解，发作时意识清楚。考虑该患者发生了（ ）。

A. 颅内肿瘤

B. 可逆性缺血性神经功能障碍

C. 短暂性脑缺血发作

D. 完全性脑卒中

E. 脑出血

【答案】 C

31、类风湿关节炎患者晨僵的护理措施不妥的是（ ）。

A. 睡眠时使用弹力手套保暖

B. 晨起时进行温水浴浸泡僵硬关节

C. 限制患者进行日常活动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/305030234033012013>