

2024 年甘肃省两当县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库附答案【预热题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物的药动学的机制是

- A: 抑制 CYP3A4
- B: 诱导 CYP3A4
- C: 抑制 CYP1A2
- D: 抑制 CYP2C9

答案：A

2. 服药时饮茶可降低疗效的是

- A: 西咪替丁
- B: 维生素 A
- C: 格列本脲
- D: 硫酸亚铁

答案：D

3. 与地西洋合用会影响其代谢导致镇静催眠作用增强的药物是()

- A: 铝碳酸镁
- B: 阿司匹林
- C: 维生素 B
- D: 伏立康唑

答案：D

4. 防心绞痛药物

- A: 甘草合剂
- B: 去氨加压素
- C: 胃黏膜保护剂
- D: 硝酸甘油

答案：D

5. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体：体温 38℃，中上及左上腹有压痛。化验结果：白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶 1993U/L，血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是

- A: 急性胃炎
- B: 急性阑尾炎
- C: 急性胰腺炎
- D: 急性胆囊炎

答案：C

6. 对半衰期短的药物，为了减少血药浓度波动可采取的方法是()

- A: 减少给药剂量
- B: 增加给药剂量
- C: 缩短给药间隔的同时减少单剂量
- D: 延长给药间隔

答案：C

7. 在"应用软膏剂和乳膏剂的注意事项"中，不正确的是

- A: 涂敷前将皮肤清洗干净
- B: 涂敷后封包以增加药物的吸收、提高疗效
- C: 不宜涂敷于口腔、眼结膜

D: 一般不要涂敷破损、溃烂、渗出的部位

答案: B

8. 新婚期避孕首选

A: 长效避孕药

B: 皮下埋植剂

C: 复方短效口服避孕药

D: 宫内节育器

答案: C

9. 尿失禁治疗的首要处理原则是

A: 进行行为治疗

B: 药物治疗

C: 除去诱因和针对原发病进行治疗

D: 调整生活方式

答案: C

10. 有关胰岛素的使用注意事项，错误的是

A: 未开封时需冷处贮存，开封后室温贮存

B: 经常变换注射部位，两次注射点要间隔 2cm

C: 冷冻后的胰岛素经室温放置融化后，可继续使用

D: 使用中的胰岛素笔芯不宜冷藏，在室温下最长可保存 4~6 周

答案: C

11. 处方外文缩写 OU 代表()

A: 左眼

B: 左耳

C: 右耳

D: 双眼

答案：D

12. (2016 年真题) 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是 ()。

A: 多索茶碱注射液

B: 布地奈德混悬液

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 孟鲁斯特纳咀嚼片

答案：B

13. 下列哪种药对强心苷类中毒引起的快速型心律失常疗效最佳

A: 普萘洛尔

B: 普鲁卡因胺

C: 阿托品

D: 苯妥英钠

答案：D

14. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，显示儿童用药原则是

A: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

B: 避免食物的影响

C: 严格掌握用药剂量

D: 密切监护

答案：A

15. 稳定型心绞痛缓解期的治疗选用

A: 低分子肝素

B: 阿司匹林

C: 氯贝丁酯

D: 硝酸甘油

答案：B

16. 甲状腺功能亢进症患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是

A: 慢性肾衰竭

B: 溶血性贫血

C: 消化性溃疡

D: 粒细胞减少症

答案：D

17. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛患者的首选处方药是

A: 卡马西平

B: 山莨菪碱

C: 苯噻啶

D: 地西洋

答案：A

18. 治疗痔疮的常用内服药是

A: 地奥司明

B: 聚甲酚磺醛栓

C: 联苯苄唑乳膏

D: 九华膏

答案：A

19. 处方是医院药品消耗及药品经济收入结账的凭证和原始依据，体现其

- A: 有效性
- B: 经济性
- C: 技术性
- D: 法律性

答案：B

20. 不作为根除幽门螺杆菌初次治疗方案的抗菌药是

- A: 呋喃唑酮
- B: 四环素
- C: 阿莫西林
- D: 左氧氟沙星

答案：D

21. 属于药物信息服务的最重要的部分的是

- A: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- B: 对问题进行确定并归类
- C: 对文献进行评价、分析和整理
- D: 确立有效的检索方法、查阅文献

答案：A

22. 退热或缓解疼痛都“不宜同时应用两种以上解热镇痛药”的主要依据是

- A: 可能引起哮喘发作
- B: 可能导致血管性水肿
- C: 可能导致酸中毒
- D: 可能引起肝、肾、胃肠道的损伤

答案：D

23. (2018 年真题) 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是 ()

- A: 乙胺丁醇
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 对氨基水杨酸钠

答案：A

24. 缺铁性贫血患者应服用

- A: 叶酸片
- B: 硫酸亚铁片
- C: 维生素 B12
- D: 苯妥英钠注射液

答案：B

25. 长期大量应用容易导致体重明显增加的是

- A: 酮替芬
- B: 氯雷他定
- C: 色甘酸钠
- D: 盐酸异丙嗪

答案：A

26. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 如原方案中已应用克拉霉素，应避免再次使用

B: 如原方案中已应用左氧氟沙星，重复应用时剂量加倍

C: 如原方案中已应用甲硝唑，且日剂量达到 1600mg/d，重复应用时剂量加倍

D: 应重复原方案治疗 2 周

答案：A

27. 肾衰竭者不能

A: 洗胃

B: 强利尿

C: 实施血液净化

D: 催吐

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

28. 阿司匹林、胺碘酮、他汀类药物、抗抑郁药、广谱抗生素、银杏等能增强效果的是

A: β 受体阻滞剂普萘洛尔等减慢心率的作用亦钝化

B: 心血管系统与维持水电解质平衡的内环境稳定功能减弱，易发生体位性低血压

- C: 肝脏合成凝血因子能力下降，对肝素及华法林非常敏感
D: 对异丙肾上腺素的敏感性降低

答案：C

29. 治疗滴虫性阴道炎可应用的处方药是

- A: 克霉唑栓
B: 甲硝唑栓
C: 聚甲酚磺醛栓
D: 硝酸咪康唑栓

答案：C

30. 淡黄色处方作为

- A: 麻醉药品和第一类精神药品处方
B: 急诊处方
C: 儿科处方
D: 普通处方

答案：B

31. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 药用炭吸附中毒物质
B: 弱碱中和强酸
C: 毛果芸香碱拮抗颠茄碱类中毒
D: 二巯丙醇“驱汞”治疗

答案：A

32. 下列药物中，可用于房颤时转复并维持窦性心律的药物为

- A: 去乙酰毛花苷
- B: 胺碘酮
- C: 利伐沙班
- D: 硝苯地平

答案：B

33. 某男孩，12 岁，近来反复突发意识丧失、颤动持续数秒钟缓解。

- A: 苯妥英钠
- B: 氯丙嗪
- C: 丙戊酸
- D: 地西洋

答案：C

34. 三环类抗抑郁药的致死量通常高于

- A: 1.5g
- B: 2g
- C: 2.5g
- D: 1g

答案：B

35. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

- A: 换用胰岛素治疗
- B: 换用其他作用机制的口服降糖药
- C: 增加现用降糖药的剂量
- D: 增加一种口服降糖药

答案：A

36. 下列不良事件中，属于假劣药事件是()

- A: 亮菌甲素事件
- B: 康泰克 PPA 事件
- C: 万洛(罗非昔布)事件
- D: 拜斯亭(西立伐他汀)事件

答案：A

37. 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管的药物是

- A: 聚乙二醇粉剂
- B: 吲哚美辛胶囊
- C: 非洛地平缓释片
- D: 磷酸可待因糖浆

答案：A

38. 关于三酰甘油的临床意义说法不正确的是

- A: 大量饮酒可使三酰甘油出现假性升高
- B: 应用雌激素、避孕药可出现三酰甘油减少
- C: 血清三酰甘油增高可提示动脉硬化及高脂血症
- D: 长期饥饿或食用高脂肪食品可导致三酰甘油升高

答案：B

39. (2019 年真题) 患者，女，29 岁，孕 25+6 周近日出现乏力、困倦食欲不振、恶心等症状，化验结果为 Hb71g/L，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是

- A: 先静脉注射负荷剂量，再静脉滴注余下剂量
- B: 口服每次 5ml，一日 3 次
- C: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后，再继续静脉滴注余下剂量

D: 快速静脉注射

答案: C

40. 使患者可放心、不掩饰地提出问题的是

A: 配备必备设备

B: 环境舒适

C: 位置标志明确

D: 适当隐秘

答案: D

41. 药物相互作用有发生在体内的药动学、药效学方面的作用；亦有发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A: 异烟肼

B: 红霉素

C: 伊曲康唑

D: 利福平

答案: D

42. 对反复发作的短暂性脑缺血发作患者首选 ()

A: 巴曲酶

B: 辛伐他汀

C: 阿司匹林

D: 华法林

答案: C

43. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 双氯芬酸钠缓释片
- B: 吗啡控释片
- C: 加巴喷丁胶囊
- D: 颠茄片

答案：A

44. (2018 年真题) 患者，女，47 岁，出现一侧颜面部骤然发作性闪痛，诊断为三叉神经痛，应选用的药物是 ()

- A: 布洛芬
- B: 山莨菪碱
- C: 卡马西平
- D: 麦角胺咖啡因

答案：C

45. (2015 年真题) 用于紧急避孕药的药物是 ()。

- A: 黄体酮
- B: 左炔诺孕酮
- C: 甲睾酮
- D: 罗格列酮

答案：B

46. 多数抗过敏药物慎用于 ()

- A: 慢性鼻炎患者
- B: 前列腺增生老年患者
- C: 胃溃疡患者

D: 高脂血症患者

答案：B

47. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}中华医学会的网址是

A: www. cp

B: www. cm

C: org. cn

D: org. cn

答案：B

48. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

A: 贝特类

B: 他汀类

C: 烟酸类

D: ω -3 脂肪酸制剂

答案：B

49. 使用前应用青霉素进行皮试的药物是

A: 左氧氟沙星片

B: 阿莫西林胶囊

C: 阿奇霉素片

D: 注射用头孢曲松钠

答案：B

50. 患者，女，31 岁，因丙型病毒性肝炎使用 α 干扰素联合利巴韦林治疗。下列关于用药期间避孕和备孕措施的说法，正确的是()

A: 干扰素、利巴韦林较为安全，不必停药，即可备孕

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 干扰素、利巴韦林较为安全,停药后即可备孕

C: 干扰素、利巴韦林易引起畸胎或者胚胎致死效应,治疗期间和治疗后 6 个月内,必须采取避孕措施

D: 干扰素、利巴韦林较为安全,停药 3 个月后可备孕

答案: C

51. 下列药物信息源中, 归属一级文献资料的是

A: 中国药学杂志

B: 中国药学年鉴

C: 新编药理学

D: 中国药学文摘

答案: A

52. 属于质子泵抑制剂的是 ()

A: 法莫替丁

B: 铝碳酸镁

C: 多潘立酮

D: 埃索美拉唑

答案: D

53. 可引起泌尿生殖系统异常, 指趾畸形的是

A: 沙立度胺

B: 氮芥类

C: 雌孕激素

D: 甲巯咪唑

答案: B

54. 用 10%氯化钠注射液 9ml 加适量注射用水稀释成 90ml 的溶液，其氯化钠浓度是（）

- A: 0.1
- B: 0.1
- C: 0.01
- D: 0.009

答案：C

55. 患者，女，58 岁，因慢性阻塞性肺疾病住院 1 个月，近 5 天来出现高热、咳痰，伴呼吸困难。实验室检查血肌酐及尿素氮值正常，白细胞计数为 $12 \times 10^9/L$

- A: 头孢唑林
- B: 甲氧西林
- C: 克林霉素
- D: 万古霉素

答案：D

56. Hb 量 31~60g/L 可诊断为

- A: 轻度贫血
- B: 中度贫血
- C: 基本正常
- D: 重度贫血

答案：D

57. (2019 年真题) 患者，女，45 岁，常有上腹部饱胀、恶心食欲不振等消化不良症状。宜选用的药物

- A: 奥美拉唑肠溶胶囊
- B: 复方阿嗝米特肠溶片

C: 蒙脱石散

D: 干酵母片

答案: D

58. 患者，男，72 岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打 120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

A: 10~20mg

B: 25~50mg

C: 300~600mg

D: 75~150mg

答案: D

59. 患者女，29 岁孕 29+6 周血压 160/100mmHg，尿蛋白（-），该患者降压药应选用（）

A: 卡托普利

B: 甲基多巴

C: 氨氯地平

D: 厄贝沙坦

答案: B

60. 填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 用药原因

B: 用药起止时间

C: ADR / ADE 过程描述

D: 不良反应 / 事件的结果

答案：A

61. 患者,男,65 岁因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院,诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是 ()

- A: 氨溴索
- B: 右美沙芬
- C: 羧甲司坦
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：B

62. 患者,女,50 岁,50kg,157cm,患复发转移性乳腺癌,术后使用曲妥珠单抗进行靶向治疗。药师应告知的用药注意事项和患者教育,错误的是

- A: 用药前应进行 RAS 基因筛查
- B: 从第 2 周起,每次给药 100mg,静脉滴注 30min
- C: 每周给药 1 次,第 1 周给药剂量 200mg,静脉滴注 90min
- D: 用药期间应每 3 个月监测心脏功能

答案：A

63. 下列药物中,可以增加缺血性脑卒中发作风险的药物是 ()

- A: 阿司匹林
- B: 叶酸
- C: 银杏叶片
- D: 口服避孕药

答案：D

64. 对患者进行用药指导时,应强调不同剂型药物的正确服用方式,否则可导致药效降低或引起不良反应。下列用药指导错误的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 咽炎患者服用含片，待含片全部融化后，短时间内不宜饮水
- B: 胃溃疡患者服用硫糖铝片，最好充分咀嚼后，用少量温水送服
- C: 高血压患者服用硝苯地平控释片，待血压控制稳定后，可适当减少给药剂量，将药品均匀掰开分次服用
- D: 透皮贴剂不宜贴敷在破损、溃烂、渗出部位，定期更换部位贴用

答案：C

65. 6 个月~2 岁儿童 WBC 计数正常参考区间是

- A: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- B: $(100 \sim 300) \times 10$
- C: $(200 \sim 300) \times 10$
- D: $(11.0 \sim 12.0) \times 10$

答案：D

66. 患者，女，65 岁，体检结果示：低密度脂蛋白胆固醇 5.7 mmol/L ，颈动脉粥样硬化斑块，宜选用的药物是（）

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 甲巯咪唑
- C: 氢氯噻嗪
- D: 阿托伐他汀

答案：D

67. 5-HT

- A: 舍曲林
- B: 丁螺环酮
- C: 艾司唑仑
- D: 阿米替林

答案：B

68. 表现为“牛肉样舌”的疾病为()

- A: 白血病
- B: 缺铁性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 巨幼细胞性贫血

答案：D

69. 严重肝功能减退者服用经肝、肾两种途径清除的药物时

- A: 一般无需调整剂量
- B: 须谨慎使用，必要时减量给药
- C: 避免使用
- D: 必须减量应用

答案：D

70. 关于乙型肝炎病毒表面抗体的描述错误的是

- A: 大多数 HBsAg 的消失和 HBsAb 的出现，意味着 HBV 感染的恢复期和人体产生了免疫力
- B: HBsAb 是一种保护性抗体
- C: 乙型肝炎恢复期可出现 HBsAb 阳性
- D: HBsAb 是 HBsAg 的对应抗体，但非中和抗体

答案：D

71. 据统计，妊娠期和哺乳期妇女不合理用药高达 80% 左右。故临床药师应熟悉妊娠期和哺乳期妇女用药原则，以确保胎儿及乳儿的安全。

- A: 氯化钾
- B: 阿昔洛韦
- C: 洛伐他汀

D: 氯霉素

答案: C

72. 处方的法律性质主要是指 ()。

A: 药师具有审核、调配处方权和开具处方权

B: 医师具有诊断权和开具处方权和调配处方权

C: 因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故，医师和药师分别负有相应的法律责任

D: 因处方所造成的医疗差错或事故，医师负有法律责任

答案: C

73. “-巴坦”的药名词干缩写是

A: eef-

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案: D

74. 用于对洋地黄治疗无效的顽固性充血性心力衰竭，长期使用可增加死亡率的磷酸二酯酶III抑制剂是

A: 多巴胺

B: 去乙酰毛花苷

C: 米力农

D: 维拉帕米

答案: C

75. 抗结核化学药物治疗的主要适应证为

A: 肺结核病灶硬结已久

- B: 有活动性肺结核病灶
- C: 痰菌阴性，无明显结核毒性症状
- D: 病灶部分硬结，痰菌阴性

答案：B

76. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

- A: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv
- B: 尼莫地平注射液 20mgqdiv
- C: 甘露醇注射液 250mlq6hiv
- D: 呋塞米片 200mgqdp0

答案：C

77. 对防范用药错误的策略而言, 个人观认为发生用药错误的原因主要是

- A: 人员短缺
- B: 环境缺陷
- C: 工作流程不规范
- D: 人的行为失常

答案：D

78. 铁剂联用维生素 C

- A: 作用不同的靶点
- B: 协同作用
- C: 促进机体的利用
- D: 延缓或降低抗药性

答案：C

79. 根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性避免导致肾上腺皮质功能下降的是

- A: 清晨服利尿药
- B: 清晨服氨基糖苷类
- C: 清晨服糖皮质激素
- D: 清晨服抗抑郁药

答案：C

80. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

- A: 哌唑嗪
- B: 普伐他汀
- C: 曲美他嗪
- D: 左旋氨氯地平

答案：D

81. 患者，男，72 岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打 120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

- A: 普伐他汀
- B: 比索洛尔
- C: 硝酸异山梨酯舌下片
- D: 氯吡格雷

答案：C

82. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

- A: 复方片仔癀软膏
- B: 异维 A 酸软膏
- C: 复方樟脑软膏
- D: 氢化可的松软膏

答案：D

83. 属于拓扑异构酶抑制剂是

- A: 放线菌
- B: 依托泊苷
- C: 顺铂
- D: 培美曲塞

答案：B

84. 急需查询输液剂的配伍禁忌，首选的书籍是

- A: 《药物治疗学：病理生理学的方法》
- B: 《注射药物手册》
- C: 《药物流行病学》
- D: 《新编药理学》

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/305030312121012033>