

2024 福建省平潭县《执业药师之西药学专业二》资格考试含答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可使呋达帕胺利尿作用增强的是

- A: 考来烯胺
- B: 多巴胺
- C: 拟交感药
- D: 胺碘酮

答案：B

2. 对铜绿假单胞菌有较强作用的药物是

- A: 哌拉西林
- B: 美西林
- C: 阿莫西林
- D: 氯唑西林

答案：A

3. 阿哌沙班属于()

- A: 环氧酶抑制剂
- B: 维生素 K 拮抗剂
- C: 凝血因子 X 抑制剂
- D: 直接凝血酶抑制剂

答案：C

4. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

- A: 阿替普酶
- B: 尿激酶
- C: 瑞替普酶
- D: 链激酶

答案：D

5. 下列哪项不是血管紧张素转化酶抑制药的主要临床应用()

- A: 高血压
- B: 充血性心力衰竭
- C: 心肌梗死
- D: 心律失常

答案：D

6. 联合应用可使部分患者血压升高的药物是

- A: 磷霉素钠+万古霉素
- B: 利奈唑胺+哌替啶
- C: 磷霉素氨丁三醇
- D: 利奈唑胺+苯丙醇胺

答案：D

7. 频繁、剧烈无痰干咳患者宜选用

- A: 右美沙芬
- B: 地关索酯
- C: 喷托维林
- D: 可待因

答案：D

8. (2021 年真题) 对角鲨烯环氧酶有非竞争性和可逆性抑制作用，属于丙烯胺类的抗真菌药物 ()

- A: 米卡芬净
- B: 克霉唑
- C: 环吡酮胺
- D: 特比萘芬

答案: D

9. 以下关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是

- A: 可杀灭痤疮丙酸杆菌
- B: 为强还原剂，极易分解
- C: 可导致皮肤干燥，脱屑
- D: 可分解出新生态氧而发挥作用

答案: B

10. 患者女，59 岁，既往高脂血症病史 5 年，心功能 II 级。因发现血压升高 7 天入院。入院查体血压 172/95mmHg，心率 62 次 / 分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

- A: 特拉唑嗪
- B: 双氯芬酸
- C: 美托洛尔
- D: 氢氯噻嗪

答案: D

11. 属于抗雌激素类的抗肿瘤药是

- A: 他莫昔芬
- B: 氟他胺

C: 阿那曲唑

D: 炔雌醇

答案: A

12. 属于 β_2 受体激动剂的是

A: 福莫特罗

B: 孟鲁司特

C: 乙酰胆碱

D: 异丙托溴铵

答案: A

13. 属于第三代氨基二膦酸盐类骨代谢调节药，与骨内的羟基磷灰石有强亲和力的药物是()

A: 氯屈膦酸二钠

B: 依替膦酸二钠

C: 阿仑膦酸钠

D: 帕米膦酸二钠

答案: C

14. (2020 年真题) 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

A: 阿奇霉素

B: 米诺环素

C: 万古霉素

D: 利奈唑胺

答案: C

15. 因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是()

- A: 吲哚美辛
- B: 阿司匹林
- C: 双氯芬酸
- D: 塞来昔布

答案: D

16. 能降低血压但伴有反射性心率加快,易导致心肌缺血的药物是

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 氯沙坦

答案: C

17. 与呋喃妥因特性不符的叙述是()

- A: 碱性尿液中杀菌作用增强
- B: 有广谱抗菌活性
- C: 在小肠吸收迅速
- D: 主要用于泌尿系感染

答案: A

18. 没有镇静和"宿醉"现象,不属于巴比妥类和苯二氮

- A: 阿普唑仑
- B: 地西泮
- C: 异戊巴比妥
- D: 佐匹克隆

答案: D

19. 下列不属于双膦酸盐类药物的是

- A: 阿法骨化醇
- B: 依替膦酸二钠
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 帕米膦酸二钠

答案：A

20. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 血栓性静脉炎
- B: 视神经损害
- C: 红人综合征
- D: 听力损害

答案：B

21. （2017 年真题）患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 硝酸甘油+美托洛尔
- B: 氨氯地平+氢氯噻嗪
- C: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪
- D: 利血平+氨苯蝶啶

答案：B

22. 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：B

23. 催产和引产不适用麦角新碱的原因是

- A: 孕妇血压升高
- B: 维持时间短
- C: 抑制胎儿呼吸
- D: 子宫强直性收缩

答案：D

24. 硫脲类的严重不良反应是

- A: 药疹、瘙痒
- B: 甲状腺肿大
- C: 粒细胞缺乏症
- D: 关节痛

答案：C

25. 肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

- A: 抗病毒
- B: 免疫抑制
- C: 抗休克
- D: 抗炎

答案：A

26. 属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是()

- A: 曲伏前列素
- B: 噻吗洛尔
- C: 甘露醇
- D: 毛果芸香碱

答案: D

27. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可作用与慢性心力衰竭治疗的利尿剂是

- A: 乙酰唑胺
- B: 呋塞米
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案: C

28. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 餐后半小时
- B: 餐时
- C: 餐前半小时
- D: 餐后 1 小时

答案: B

29. 可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

- A: 利多卡因
- B: 苯妥英钠
- C: 普萘洛尔

D: 奎尼丁

答案: C

30. 用于治疗焦虑、镇静、催眠、惊厥症、肌紧张性头痛的药物是

A: 地西泮

B: 卡马西平

C: 唑吡坦

D: 苯巴比妥

答案: A

31. 用于较严重的频繁干咳，极量一次 100mg 的药物是

A: 可待因

B: 地塞米松

C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案: A

32. 丙烯胺类抗真菌药()

A: 阿莫罗芬

B: 特比萘芬

C: 氟康唑

D: 两性霉素

答案: B

33. 可以引起低钾血症和低镁血症，增加洋地黄中毒危险的是

A: 硫酸镁

B: 克拉霉素

C: 呋塞米

D: 胺碘酮

答案: C

34. 对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

A: 阿昔洛韦

B: 庆大霉素

C: 红霉素

D: 咪康唑

答案: D

35. 可调节表皮细胞有丝分裂和更新()

A: 异维 A 酸

B: 过氧苯甲酰

C: 维 A 酸

D: 阿达帕林

答案: C

36. 抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是()

A: 塞替派

B: 奥沙利铂

C: 环磷酰胺

D: 丝裂霉素

答案: C

37. (2017 年真题) 易发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁肿瘤病是()

A: 紫杉醇注射液

- B: 注射用盐酸博来霉素
- C: 注射用柔红霉素
- D: 注射用硫酸长春新碱

答案：A

38. 巨幼细胞贫血可选用

- A: 肝素
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 K1
- D: 香豆素类

答案：B

39. (2018 年真题) 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性, 临床应用的解毒方案是 ()

- A: 在用柔红霉素同时, 使用柔红霉素等量的右雷佐生
- B: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生
- C: 在用柔红霉素后 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼

答案：B

40. 避孕药的作用机制不包括

- A: 使子宫腺体制造糖原减少
- B: 改变子宫颈黏液
- C: 抑制排卵
- D: 使子宫黏膜内腺体生长

答案：D

41. 治疗急性阿米巴痢疾和阿米巴肝脓肿应首选

- A: 依米丁
- B: 氯喹
- C: 二氯尼特
- D: 甲硝唑

答案：D

42. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是()

- A: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用
- B: 属于蒽环类抗肿瘤药物
- C: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- D: 典型不良反应为骨髓抑制和心脏毒性

答案：C

43. 利福平联用伏立康唑使

- A: 疗效减弱
- B: 月经不规则
- C: 吸收减少
- D: 肝毒性增加

答案：A

44. 大环内酯类的主要清除途径是

- A: 经肝、肾双途径清除
- B: 主要经肾脏排泄
- C: 主要经肝脏清除
- D: 主要经呼吸道排泄

答案：C

45. 阿司匹林的作用是()

- A: 抑制纤维蛋白溶解
- B: 促凝血因子合成
- C: 抑制血小板聚集
- D: 促进纤维蛋白溶解

答案：C

46. 成人使用乙胺嘧啶用于疟疾的预防，服用的时间是

- A: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 周
- B: 应于进入疫区前 1~2 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 1~2 天
- C: 应于进入疫区前 1~2 周开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 周
- D: 应于进入疫区前 6~8 天开始服用，一般宜服至离开疫区后 6~8 天

答案：C

47. 组胺 H

- A: 法莫替丁>雷尼替丁>西咪替丁
- B: 雷尼替丁>西咪替丁>法莫替丁
- C: 西咪替丁>雷尼替丁>法莫替丁
- D: 雷尼替丁>法莫替丁>西咪替丁

答案：A

48. 通过抑制血管紧张素转化酶产生作用，长期应用有可能导致血钾升高的降压药是

- A: 哌唑嗪
- B: 卡托普利
- C: 维拉帕米

D: 硝酸甘油

答案: B

49. 血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 应避免与 () 联合应用。

A: 噻嗪类利尿剂

B: 留钾利尿剂

C: β 受体阻断剂

D: 人促红素

答案: B

50. 口腔黏膜溃疡、牙龈炎及冠周炎可选用

A: 9%硼酸冰片滴耳液

B: 曲伏前列素

C: 1%碘甘油

D: 四环素

答案: C

51. 沙丁胺醇用于预防治疗时，宜选用

A: 干粉吸入方法

B: 雾化吸入溶液

C: 口服制剂

D: 气雾剂

答案: C

52. 主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

A: 利血平

B: 依折麦布

C: 阿昔莫司

D: 瑞舒伐他汀

答案: D

53. 重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松

B: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松

C: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

D: 奥美拉唑+口服地塞米松

答案: C

54. 联用治疗布氏杆菌感染的是

A: 青霉素和磺胺嘧啶

B: 链霉素和磺胺嘧啶

C: 链霉素和异烟肼

D: 青霉素和链霉素

答案: B

55. 通过增强 AT-III 的活性发挥抗凝作用的是

A: 肝素

B: 维生素 K₁

C: 香豆素类

D: 维生素 B₁₂

答案: A

56. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

A: 克拉霉素

B: 红霉素

C: 万古霉素

D: 克林霉素

答案：A

57. (2020 年真题) 患者，女，72 岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

A: 氯吡格雷

B: 双氯芬酸

C: 奥美拉唑

D: 华法林

答案：D

58. 主要用于疟疾的预防，也可用于治疗弓形虫病的药物是

A: 奎宁

B: 蒿甲醚

C: 双氢青蒿素

D: 乙胺嘧啶

答案：D

59. ACEI 与 () 联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸及血糖的不良影响。

A: β 受体阻断剂

B: 人促红素

C: 留钾利尿剂

D: 噻嗪类利尿剂

答案：D

60. 适用于治疗精神分裂症、躁狂症的药物是

A: 阿立哌唑

B: 碳酸锂

C: 利培酮

D: 氯氮平

答案: D

61. 属于 GLP-1 受体激动剂的药物是

A: 伏格列波糖

B: 阿格列汀

C: 利拉鲁肽

D: 那格列奈

答案: C

62. 临床口服最常用的、唯一经过安慰剂对照临床试验评估的强心苷药物是()

A: 洋地黄毒苷

B: 去乙酰毛花苷

C: 地高辛

D: 毒毛花苷 K

答案: C

63. 痛风急性发作时首选的药物是

A: 非布司他

B: 秋水仙碱

C: 碳酸氢钠

D: 苯溴马隆

答案: B

64. 有性激素样副作用的是()

- A: 螺内酯
- B: 氨苯蝶啶
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案：A

65. 可能导致牙龈出血的药物是

- A: 普伐他汀
- B: 依诺肝素
- C: 拉西地平
- D: 普萘洛尔

答案：B

66. 以下不属于强心苷的禁忌证的是()

- A: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- B: 慢性收缩性心力衰竭
- C: 梗阻性肥厚型心脏病
- D: 室性心动过速、心室颤动

答案：B

67. 下列关于血凝酶的描述，错误的是

- A: 在完整无损的血管内无促进血小板聚集的作用
- B: 用于新生儿出血时，宜在补充维生素 K
- C: 妊娠期妇女出血时，应避免使用维生素 K
- D: 易引起弥散性血管内凝血(DIC)

答案：D

68. 作用于髓袢升支粗段的利尿剂是

- A: 醛固酮受体阻断剂
- B: 袢利尿剂
- C: 噻嗪类和类噻嗪类利尿剂
- D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：B

69. 患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

- A: 普萘洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 赖诺普利
- D: 吧达帕胺

答案：A

70. 无孕激素活性具有抗着床作用的避孕药是

- A: 溴隐亭
- B: 绒促性素
- C: 戈那瑞林
- D: 双炔失碳酯

答案：D

71. （2018 年真题）属于胆固醇吸收抑制剂的调节血脂药是（）

- A: 依折麦布
- B: 烟酸
- C: 非诺贝特
- D: 辛伐他汀

答案：A

72. 硫酸亚铁的适应症是

- A: 产后大出血
- B: 恶性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 巨幼细胞贫血

答案: C

73. 可掩盖顺铂所致的耳鸣、眩晕等症状的药物是

- A: 苯海拉明
- B: 丙磺舒
- C: 甲氨蝶呤
- D: 呋塞米

答案: A

74. 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐,宜选用的止吐治疗方案是
()

- A: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- B: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药
- C: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

答案: C

75. 关于地西泮的作用特点,叙述错误的是

- A: 有良好的抗癫痫作用
- B: 小于镇静剂量时即有抗焦虑作用
- C: 剂量加大可引起麻醉

D: 可增强其他中枢抑制药的作用

答案: C

76. 夜盲症患者应选用的维生素是

A: 维生素 D

B: 维生素 A

C: 维生素 B

D: 维生素 B

答案: B

77. 骨化三醇可引起高钙血症，在服药后应监测血钙和血肌酐浓度，首次监测的时间建议是

A: 服药后第 4 周

B: 服药后第 6 个月

C: 服药后第 2 周

D: 服药后第 3 个月

答案: A

78. 奥美拉唑抑制胃酸分泌的机制是()

A: 抑制胃壁细胞 H

B: 阻断 M 受体

C: 阻断促胃液素受体

D: 阻断 H

答案: A

79. 关于蒙脱石散的作用特点及临床使用的说法错误的是 ()

A: 对伴有感染的腹泻患者应联合应用有效的抗菌药物治疗

B: 不被胃肠道吸收对中枢神经及心血管系统无不良影响

C: 直接服用或调成糊状、丸状服用

D: 腹泻患者宜在两餐之间服用

答案: C

80. 秋水仙碱的注意事项错误的是

A: 肾功能下降时可造成蓄积

B: 不可用于长期痛风的预防

C: 尽量避免静脉注射和长期口服给药

D: 可致可逆性维生素 B

答案: D

81. 属于硝基呋喃类的是

A: 夫西地酸

B: 呋喃妥因

C: 磺胺甲

D: 甲硝唑

答案: B

82. 滴眼后可能导致再生障碍性贫血的抗菌药物是

A: 氯霉素

B: 左氧氟沙星

C: 庆大霉素

D: 妥布霉素

答案: A

83. 下列药物中不属于凝血因子 X 抑制剂的是

A: 阿哌沙班

B: 依诺肝素

C: 依达肝素

D: 磺达肝癸钠

答案: B

84. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是 ()。

A: 那格列奈

B: 艾塞那肽

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案: D

85. 属于促凝血因子合成药的是

A: 氨甲环酸

B: 甲萘氢醌

C: 酚磺乙胺

D: 鱼精蛋白

答案: B

86. 患者，男，25 岁。上腹灼痛、反酸，疼痛多出现在早上 10 点及下午 4 点左右，有时夜间痛醒，进食后缓解。X 线钡餐检查：十二指肠溃疡。

A: 阿莫西林和四环素

B: 米索前列醇和四环素

C: 哌仑西平和西咪替丁

D: 兰索拉唑和阿莫西林

答案: D

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 下列关于氟尿嘧啶的说法，错误的是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/305130131114012033>