

2024 甘肃省会宁县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题真题题库【名师系列】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 氯霉素在新生儿体内蓄积可导致灰婴综合征
- B: 口服避孕药致阿米替林清除率下降
- C: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎
- D: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

答案：B

2. 须在凉暗处保存的常用药品是

- A: 双歧三联活菌制剂
- B: 多巴胺
- C: 硫酸阿托品
- D: 复方甘草合剂

答案：D

3. 躯干部出现鞭打状色素沉着

- A: 柔红霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 白消安

D: 博来霉素

答案：D

4. 常用的抗肿瘤药给药途径有:动脉、静脉、肌肉、腔内、口服五种途径用于癌性胸水

A: 腔内注射

B: 肌肉注射

C: 动脉注射

D: 静脉注射

答案：A

5. 抗结核联合治疗方案中,可引起球后视神经炎不良反应的药物是()

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 左氧氟沙星

D: 吡嗪酰胺

答案：A

6. 据统计,全国高血压患者已经超过 2 亿,高血压患者中不足三成的人知道自己患病;而知道自己患有高血压的患者中,一半多没有应用药物治疗;而接受治疗的患者中,能达到治疗要求的仅占三成左右。高血压死亡率不断升高,因此熟悉高血压及其相关治疗用药,对更有效地防治高血压非常重要。

A: 依那普利

B: 哌唑嗪

C: 美托洛尔

D: 氢氯噻嗪

答案：C

7. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g / L。临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片。下列向患者交代的用药注意事项，错误的是

- A: 不宜与钙剂同时服用
- B: 宜空腹服用
- C: 不宜同时进食牛奶和蛋类
- D: 宜同时补充维生素 C 或稀盐酸

答案：B

8. 布噻嗪属于

- A: 血管扩张药
- B: 抗组胺药
- C: 利尿剂
- D: 镇痛药

答案：C

9. 患者，女，48 岁，因进食高蛋白食物过多导致消化不良、胃胀气到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A: 多潘立酮片
- B: 甲氧氯普胺片
- C: 酵母片
- D: 乳酶生片

答案：D

10. 在药师应该具备的诸项专业技能中，作为药师的最基本工作的是

- A: 处方点评
- B: 药品警戒技能
- C: 处方调剂

D: 处方审核

答案：C

11. 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“必要时”用药的缩写是()

A: prn

B: qn

C: qd

D: qid

答案：A

12. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径

A: 静脉滴注给药

B: 每个半衰期给药 1 次

C: 每 2~3 个半衰期给药 1 次

D: 每日给药 1 次

答案：B

13. (2021 年真题) 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

A: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用

B: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用

C: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药

D: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用

答案：B

14. 需要适当增加苯妥英、苯巴比妥的给药剂量，是由于

- A: 妊娠晚期血流动力学发生改变
- B: 激素分泌改变，药物代谢也受影响
- C: 胃肠活动减弱，使吸收减慢
- D: 血容量增加使血浆白蛋白浓度降低

答案：B

15. 应贮存在阴凉处的药物是

- A: 硫酸亚铁片
- B: 托烷司琼注射剂
- C: 头孢拉定
- D: 重组人促红细胞生成素

答案：C

16. 关于左甲状腺素（L-T₄）的用药注意事项，错误的是

- A: 不能与钙剂、胆酸螯合剂（消胆胺）合用
- B: 一般从 250~500 μg/d 开始，每 1~2 周增加 250 μg，直至达到治疗目标
- C: 每天早餐前 60 分钟服药 1 次
- D: 需终生服药

答案：B

17. 可出现躯体依赖性的是

- A: 呋喃妥因
- B: 双嘧达莫
- C: 苯巴比妥
- D: 氯苯那敏

答案：C

18. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

- A: 25~50mg/d
- B: 150~300mg/d
- C: 25~75mg/d
- D: 75~150mg/d

答案：D

19. 新生儿肾脏有效循环血量及肾小球滤过率较成人低

- A: 10%~20%
- B: 20%~30%
- C: 30%~40%
- D: 40%~50%

答案：C

20. 收缩血管平滑肌，引起高血压的药物是

- A: 咖啡因
- B: 伪麻黄碱
- C: 重组人促红细胞生成素
- D: 糖皮质激素

答案：B

21. 患者，男，57岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是()

- A: 金刚乙胺
- B: 金刚烷胺
- C: 利巴韦林

D: 奥司他韦

答案: D

22. 给予铁剂的依据是

A: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D

B: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素

C: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

D: 有助于合成红细胞

答案: D

23. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

B: 停用二甲双胍肠溶片

C: 停用阿托伐他汀钙片

D: 停用瑞格列奈片

答案: C

24. 患者，男，61 岁，查体空腹血糖升高来诊，中等体型，无烟酒等不良嗜好。该患者既往慢性肾炎病史，伴轻中度肾功能不全。

A: 二甲双胍

B: 格列美脲

C: 胰岛素

D: 格列喹酮

答案: C

25. 分娩前应用可引起新生儿循环障碍和灰婴综合征的药物是

- A: 维生素 D
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 维生素 A
- D: 氯霉素

答案：D

26. 急性荨麻疹的治疗首选药物是

- A: 1: 1000 肾上腺素注射液
- B: 第一代抗组胺药
- C: 肾上腺糖皮质激素
- D: 第二代非镇静抗组胺药

答案：D

27. 2 级高血压是指

- A: 收缩压 140~159mmHg 和（或）舒张压 90~99mmHg
- B: 收缩压 160~179mmHg 和（或）舒张压 100~109mmHg
- C: 收缩压 <120mmHg 和舒张压 <80mmHg
- D: 收缩压 ≥180mmHg 和（或）舒张压 ≥110mmHg

答案：B

28. 急性感染、急性化学药物中毒如汞中毒可呈现

- A: 血小板减少
- B: 淋巴细胞增多
- C: 白细胞增多
- D: 红细胞计数减少

答案：C

29. 患者通过电话、网络或信件询问是

- A: 质问方式
- B: 被动方式
- C: 指令方式
- D: 主动方式

答案：B

30. (2016 年真题) 患者接受顺铂化疗时，药师应重点监测的不良反应是 ()。

- A: 肝脏毒性
- B: 肺纤维化
- C: 心脏毒性
- D: 肾脏毒性

答案：D

31. 吸烟后易出现头晕、嗜睡、疲乏等不良反应的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 氯丙嗪
- C: 呋塞米
- D: 胰岛素

答案：B

32. 下列治疗良性前列腺增生症的药物中，可以引起性功能减退的是

- A: 非那雄胺
- B: 奥昔布宁
- C: 托特罗定
- D: 索利那新

答案：A

33. 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L(正常值:3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L(正常值:<7.8mmol/L)，血尿酸 580 μ mol/L(正常值:男性 180~440 μ mol/L)，血 LDL-C 3.7mmol/L(正常值:2.1~3.1mmol/L)肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 适量运动
- B: 低嘌呤饮食
- C: 应用阿司匹林
- D: 控制体重

答案: C

34. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A: 餐前 0.5~1h
- B: 餐后 1h
- C: 餐后
- D: 餐前

答案: A

35. 二甲双胍的最佳服用时间是

- A: 餐后
- B: 餐中
- C: 清晨空腹
- D: 餐前

答案: B

36. 弥漫性青铜色色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 白消胺
- D: 柔红霉素

答案：C

37. (2016 年真题) 因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是 ()。

- A: 6 个月内有静脉血栓栓塞史的患者
- B: 合并高胆固醇血症的患者
- C: 合并轻度高血压的患者
- D: 甲状腺切除后的患者

答案：A

38. 下列药物使用方式，正确的是

- A: 维生素 C 泡腾片用 150ml 温开水浸泡溶解后服用
- B: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用水送服
- C: 酵母片在餐后整片用水送服
- D: 滴眼液打开使用后，可以连续使用 3 个月

答案：A

39. “加”的外文缩写为 ()。

- A: Add
- B: qod
- C: Ad
- D: gtt

答案：C

40. 下列病原体中，可导致沙眼的是

- A: 变形杆菌
- B: 沙眼衣原体
- C: 豚解支原体
- D: 大肠埃希菌

答案：B

41. 结肠癌
- A: 红细胞
 - B: 真菌
 - C: 白细胞增多
 - D: 上皮细胞

答案：A

42. 治疗病毒性腹泻宜选用的药物是
- A: 庆大霉素
 - B: 泛昔洛韦
 - C: 山莨菪碱
 - D: 双歧杆菌

答案：B

43. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是
- A: 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小
 - B: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗
 - C: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
 - D: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效

答案：D

44. 最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

- A: 粪肠球菌
- B: 葡萄球菌
- C: 大肠杆菌
- D: 变形杆菌

答案：C

45. 能够给予当即解答的就当即解答

- A: 解释的技巧
- B: 及时回答不拖延
- C: 特别关注特殊人群
- D: 保护患者的隐私

答案：B

46. 不属于用药错误在药师发药环节技术层面的防范措施是

- A: 正确交代药物用量
- B: 良好的服务态度和服务语言标准化
- C: 保持清新、整齐、干净和安静的环境
- D: 交代正确的给药时间

答案：C

47. 下列是 5 位患者血常规检查的结果，其中白细胞计数异常的是

- A: 成人静脉血 $4.3 \times 10^9 / L$
- B: 6 个月~2 岁婴儿 $11.0 \times 10^9 / L$
- C: 成人静脉血 $13.0 \times 10^9 / L$
- D: 成人末梢血 $8.0 \times 10^9 / L$

答案：C

48. 放射性碘的不良反应是

- A: 甲状腺功能亢进
- B: 甲状腺功能低下
- C: 中枢抑制
- D: 粒细胞缺乏

答案：B

49. 适宜于餐中给药的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 缬沙坦
- C: 复方铝酸铋
- D: 法莫替丁

答案：A

50. 尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

- A: 依地酸钙钠
- B: 二巯丁二钠
- C: 二巯丙醇
- D: 青霉胺

答案：A

51. 重症、急救治疗时，要求药物迅速起效，最不适宜选用的给药途径是

- A: 静脉滴注
- B: 吸入给药
- C: 喷雾给药
- D: 腔道给药

答案：D

52. 有关血清丙氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 与谷丙转氨酶 (GPT) 是两个反映肝脏功能的指标
- B: 血清丙氨酸氨基转移酶增高的程度与肝细胞被破坏的程度呈正比
- C: 丙氨酸氨基转移酶只存在于肝脏中
- D: 丙氨酸氨基转移酶是一组催化氨基酸之间氨基转移反应的酶类

答案：B

53. 常用缓泻药的作用机制不包括

- A: 润湿性
- B: 刺激性
- C: 膨胀性
- D: 容积性

答案：A

54. 关于药物作用相加或增加疗效的举例, 克拉维酸钾、舒巴坦为 β -内酰胺酶抑制剂, 使青霉素类、头孢菌素类等 β -内酰胺类抗生素免受开环破坏, 抗菌疗效增强。是属于

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 作用于不同的靶位
- C: 促进机体的吸收利用
- D: 保护药品免受破坏

答案：D

55. 不得将咨询档案等患者的资料用于商业目的

- A: 特别关注特殊人群
- B: 保护患者的隐私
- C: 及时回答不拖延

D: 解释的技巧

答案：B

56. 能降 LDL 也降 HDL 的药物是

A: 烟酸

B: 普罗布考

C: 塞伐他汀

D: 非诺贝特

答案：B

57. 前记

A: 主要实验室数据

B: 对药物治疗的建设性意见与结果评价

C: 医师签名、药品金额

D: 临床诊断、费别

答案：D

58. 为了与生物钟同步，适宜于睡前服用的是

A: 维生素 C

B: 普伐他汀

C: 多潘立酮

D: 二甲双胍

答案：B

59. 乙型肝炎病毒核心抗体为

A: 不能抑制 HBV 的增殖，可反映肝细胞受到 HBV 侵害后的一项指标

B: 为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标

C: 乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物

D: 不能抑制 HBV 的增殖，出现在 HBsAg 转阴之后，证明人体对 HBsAg 有一定的免疫清除率的指标

答案：A

60. 告知"坦洛主要用于良性前列腺增生症，不能作为抗高血压药"属于

A: 药物相互作用

B: 药品不良反应

C: 新药信息

D: 禁忌证

答案：D

61. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 右眼

A: NS

B: DOL

C: O

D: LD

答案：C

62. 属于非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是

A: 扎西他滨

B: 沙奎那韦

C: 奈韦拉平

D: 恩夫韦替

答案：C

63. 早餐前半小时服用的药物是 ()

A: 吉法酯

B: 瑞巴派特

C: 枸橼酸铋钾

D: 雷贝拉唑

答案: D

64. 对于围手术期抗菌药物的预防性应用原则，说法错误的是

A: 若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）定植的可能或者该医疗机构 MRSA 发生率高，可选用氨曲南预防感染

B: 对于清洁手术（I 类切口），通常不需预防用抗菌药物

C: 应尽量选择单一抗菌药物预防用药，避免不必要的联合使用

D: 针对革兰阴性杆菌可用氨曲南、磷霉素或氨基糖苷类

答案: A

65. 口服避孕药可能导致

A: 血白细胞减少

B: 粪便细胞显微镜检查检出真菌

C: 血清血红蛋白升高

D: 血清总胆固醇升高

答案: D

66. 孟鲁司特平喘的主要机制是

A: 抑制白三烯受体

B: 激动肾上腺素 β_2 受体

C: 阻断腺苷受体

D: 拮抗 M 胆碱受体

答案: A

67. 有机磷农药重度中毒时，血胆碱酯酶的活力下降至

A: 0.7

B: 70%~50%

C: 30%以下

D: 50%~30%

答案：C

68. 肾功能不全而肝功能正常者宜选用的药物是

A: 肝毒性小、经肾排泄的药物

B: 经肝肾双途径消除的药物

C: 肾毒性小、经肝排泄的药物

D: 经肝肠循环消除的药物

答案：B

69. (2015 年真题) 患者，女。62 岁，医师处方如下：

A: 氨氯地平

B: 阿卡波糖

C: 氯吡格雷

D: 二甲双胍

答案：C

70. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是()

A: 心力衰竭

B: 冠心病

C: 双侧肾动脉狭窄

D: 痛风

答案：A

71. #NAME?

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案：D

72. 药学服务的具体工作不包括

A: 治疗药物监测

B: 处方审核

C: 关注特殊人群

D: 参与临床药物治疗

答案：C

73. COPD 气流受限严重程度分级的方法是

A: CHA, DS, -VAsE 评分

B: HAS-BLED 评分

C: FEV1 占预计值%

D: CTP 分级

答案：C

74. (2019 年真题) 患者，男，72 岁。诊断：高血压，心力衰竭，肋软骨炎。

A: 不应使用红霉素缓释胶囊

B: 地高辛不宜选用

C: 地高辛剂量偏小

D: 比索洛尔给药频次不合理

答案：A

75. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 氯化钾
- B: 奥美拉唑
- C: 卡马西平
- D: 红霉素

答案：D

76. 洗胃液 1:5000 高锰酸钾溶液可用于解救哪类药物中毒

- A: 3911 中毒
- B: 1605 中毒
- C: 乐果中毒
- D: 巴比妥类中毒

答案：D

77. 具有缩瞳和降低眼压的拟 M 胆碱药是

- A: 噻吗洛尔
- B: 溴莫尼定
- C: 毛果芸香碱
- D: 拉坦前列素

答案：C

78. 严重烧伤患者尿常规检查可发现

- A: 尿葡萄糖阳性
- B: 尿血红蛋白阳性
- C: 尿淀粉酶增高

D: 尿胆红素阳性

答案：B

79. 通过渗入 LDL 颗粒核心中，影响脂蛋白代谢，尤其用于纯合子型家族性高胆固醇血症及黄色瘤患者的是（）

A: 烟酸类

B: 普罗布考

C: 依折麦布

D: 他汀类

答案：B

80. 能监测用药过程错误的真实发生率的是

A: 直接观察

B: 病历审查

C: 岗位工作问责

D: 计算机检测方法

答案：A

81. 用药方法

A: 中午忘吃药了怎么办

B: 这药能治我这种病吗

C: 这种药能报销吗

D: 这次拿的“×××”（商品名）是我以前一直服用的“格列齐特”吗

答案：A

82. 医师无权调配处方

A: 有效性

- B: 经济性
- C: 法律性
- D: 技术性

答案：C

83. 心力衰竭的支气管哮喘禁用

- A: β 受体阻断剂
- B: 强心苷
- C: 利尿剂
- D: RAAS 抑制剂

答案：A

84. 会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生欣快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力的药物是

- A: 利血平
- B: 可卡因
- C: 异戊巴比妥
- D: 阿米替林

答案：B

85. 患者，男，25 岁，咳嗽、咳痰伴胸痛，发热，体温 38.5℃，入院检查肺部湿啰音，WBC $12 \times 10^9 / L$ ，X 线显示片状、斑片状浸润性阴影及间质性改变，不伴胸腔积液。

- A: 胃肠道反应
- B: 过敏，白细胞减少
- C: 静脉炎
- D: 宜空腹服用

答案：A

86. 可导致体重增加的抗焦虑药物为（）

- A: 米氮平
- B: 文拉法辛
- C: 氟西汀
- D: 舍曲林

答案：A

87. 患者，女，63 岁，因“突发左上肢麻木，伴头晕 2 小时”入院，诊断为缺血性脑卒中，患者既往有高血压病史 20 年，可选用哪种药物进行溶栓治疗

- A: 巴曲酶
- B: 阿司匹林
- C: 阿替普酶
- D: 华法林

答案：C

88. 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是

- A: 酮康唑乳膏
- B: 氢化可的松乳膏
- C: 复方苯甲酸软膏
- D: 联苯苄唑乳膏

答案：B

89. 雷尼替丁

- A: 可导致驾驶员多尿或多汗
- B: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/305143341114012033>