

SOLD

@备考首选

## 通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

## 外科护理模拟题与答案

1、破伤风病人采用人工冬眠,主要目的是( )

- A、 控制炎症扩散
- B、 减少抽搐
- C、 便于护理
- D、 降低体温
- E、 防止合并症发生

答案: B

2、疖的处理应禁忌( )

- A、 热敷
- B、 挤压
- C、 2%的碘酊涂抹
- D、 碳酸烧灼顶部
- E、 待其自行吸收

答案: B

3、备皮范围原则上应超出切口四周的距离至少( )

- A、 10cm
- B、 15cm
- C、 20cm
- D、 25cm
- E、 30cm

答案: C

4、下列对破伤风抽搐病人的护理哪项是错误的( )

- A、 为减少刺激,不需专人护理
- B、 病床上加床栏,防止坠床
- C、 床边备有气管切开包
- D、 床边备有吸引器
- E、 可在病人牙间放入一小卷纱布

答案: A

5、胃肠道手术后病人常需禁食 1~2 天,一般成人每日输液量为:( )

- A、 1000ml
- B、 3500ml
- C、 1500ml
- D、 4000ml
- E、 2500ml

答案: E

6、下列哪项符合早期休克( )

- A、面色苍白,烦躁不安
- B、脉弱无力
- C、血压降低
- D、代谢性酸中毒
- E、皮肤粘膜出现瘀斑

答案: D

7、以下术后卧位,哪项不正确( )

- A、颈、胸部术后高半坐卧位
- B、腹部术后低半坐卧位
- C、脊柱、臀部术后俯卧或仰卧位
- D、肥胖病人可取侧卧位
- E、颅脑术后可取头低脚高位

答案: E

8、吸入性全身麻醉前必须给病人使用( )

- A、安定
- B、吗啡
- C、阿托品
- D、异丙嗪
- E、苯巴比妥钠

答案: C

9、手术过程中,清点核对器械,敷料的时间是( )

- A、手术开始前和准备关体腔前
- B、手术进行中
- C、手术开始前
- D、开始缝合皮肤前
- E、手术完毕后

答案: A

10、反映休克病人危重征象的指标是( )

- A、收缩压低于 80mmHg
- B、伴代谢性酸中毒
- C、脉搏细速 120 次/分
- D、神志淡漠
- E、皮肤出现多处瘀点、瘀斑

答案: E

11、局部浸润麻醉时普鲁卡因的浓度为( )

- A、 0.25%~1%
- B、 0.25%~0.5%
- C、 1%~2%
- D、 2%~4%
- E、 4%~6%

答案: A

12、患者,女性,30岁,哮喘持续状态2天,动脉血气分析

pH7.35, PaCO<sub>2</sub>9.3kPa, PaO<sub>2</sub>6.6kPa, BE+2mmol/L, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>26mmol/L, 其酸碱失衡的类型是( )

- A、 呼吸性碱中毒
- B、 代谢性酸中毒
- C、 呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
- D、 呼吸性酸中毒代偿期
- E、 代谢性碱中毒

答案: D

13、脓性指头炎切开的时机为( )

- A、 指头红肿明显
- B、 局部张力显著增高, 出现跳痛
- C、 出现波动感
- D、 疼痛减轻时
- E、 指骨坏死时

答案: B

14、人体每日钾的生理需要量如以氯化钾计需要多少克?( )

- A、 1~2g
- B、 2~3g
- C、 3~4g
- D、 4~6g
- E、 8~10g

答案: C

15、患者,男性,严重创伤后,血压降低,脉搏细速,面色苍白,诊断为休克。

治疗时重点应注意( )

- A、 急性肾功能衰竭的发生
- B、 及时扩充血容量

- C、 及时使用甘露醇
- D、 避免使用血管收缩药
- E、 药物对各脏器的毒性

答案: B

16、 某病人体重 60kg, 体温持续 39℃, 晚间用退烧药后, 大汗淋漓, 渗湿一身衬衣裤, 估计以上两项额外失水量是 ()

- A、 500ml
- B、 800ml
- C、 1000ml
- D、 1500ml
- E、 2000ml

答案: D

17、 病人痰液有恶臭味, 提示哪种细菌感染 ()

- A、 肺炎链球菌
- B、 绿脓杆菌
- C、 厌氧菌
- D、 霉菌
- E、 金黄色葡萄球菌

答案: C

18、 甲沟炎出现甲下脓肿时下列最有效的处理措施是 ()

- A、 局部理疗
- B、 外敷硫酸镁溶液
- C、 应用抗菌药
- D、 温盐水浸泡
- E、 行拔甲术

答案: E

19、 男性病人, 30 岁, 在普鲁卡因局部浸润麻醉下行双侧腋臭皮肤切除, 两侧同时手术。手术中, 病人突然大叫, 惊厥, 紫绀, 心率 120 次/min, 处理应 ()

- A、 静脉输液
- B、 静脉注射间羟胺
- C、 静脉注射硫喷妥钠
- D、 吸氧
- E、 静脉注射肾上腺素

答案: C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/305331201022011211>