

外科护理学考试题库含答案

1、罗某,男,25岁,车祸造成多发性损伤,急救时首先要处理的情况是

- A、窒息
- B、腹部损伤
- C、股骨干开放性骨折
- D、休克
- E、胸部损伤

答案：A

2、甲状腺大部分切除术后患者最危急的并发症是()

- A、呼吸困难和窒息
- B、甲状腺危象
- C、喉上神经损伤
- D、甲状旁腺损伤
- E、喉返神经损伤

答案：A

3、甲状腺大部切除术后伤口内出血,引起呼吸困难。应紧急采取

- A、注射止血剂
- B、氧气吸入
- C、拆除缝线,去除血块
- D、气管插管
- E、加压包手

答案：C

4、原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是

- A、腹腔内有无原发病灶
- B、病原菌的种类
- C、腹肌紧张的程度
- D、腹痛的性质不同
- E、有无内脏损伤

答案：A

5、患者男性,50岁,间歇无痛性肉眼血尿3个月,经检查诊断为左侧肾癌,该患者出现血尿表现为()

- A、早期肾癌
- B、晚期肾癌
- C、肿瘤内出血
- D、肾癌已侵入肾盏、肾盂黏膜

E、肾癌已侵入肾门

答案：D

6、受伤当时无明显症状，几天后突然出现急性大出血的危险情况的内脏损伤是

A、 肝脾破裂

B、 小肠穿孔

C、 大肠破裂

D、 十二指肠破裂

E、 胆囊穿孔

答案：A

7、患者男性，60岁，患左下肢静脉曲张20年，行大隐静脉高位结扎，加小腿静脉分段结扎。术后3小时起立行走时，小腿处伤口突然出血不止。紧急处理应（）

A、就地站立位包扎

B、指压止血

C、用止血带

D、钳夹止血

E、平卧，抬高患肢，加压包扎

答案：E

8、膀胱癌术后最重要的治疗是（）

A、放疗

B、免疫治疗

C、介入治疗

D、膀胱内灌注治疗

E、药物治疗

答案：D

9、患者男性，35岁，阴茎的冠状沟内可见一个2cm大小的圆形皮损，稍高于皮面，境界清楚，边缘隆起，质地较硬，表面有少量浆液性渗出物。关于该患者皮损最恰当的是（）

A、丘疹

B、斑丘疹

C、斑疹

D、硬下疳

E、扁平疣

答案：D

10、直肠肛管手术后最常见的并发症是

- A、 伤口出血
- B、 大便失禁
- C、 肛门狭窄
- D、 切口感染
- E、 切口裂开

答案：A

11、 甲状腺大部分切除手术后第三天，出现手足疼痛，指尖针刺感并有轻微抽搐，护士应备好（ ）

- A、 氯化钾
- B、 苯巴比妥
- C、 碘化钠
- D、 碳酸氢钠
- E、 葡萄糖酸钙

答案：E

12、脑室引流术后患者引流管护理方法不妥的是（ ）

- A、 引流管开口高于侧脑室平面 15 cm
- B、 妥善固定引流管
- C、 每日引流量不超过 500ml
- D、 定时无菌生理盐水冲洗
- E、 观察并记录引流液的量、性状

答案：D

13、腹外疝的疝环位置相当于疝囊的

- A、 底部
- B、 体部
- C、 颈体交界部
- D、 颈部
- E、 以上都不对

答案：D

14、诊断腹腔内实质性脏器破裂的主要依据是（ ）

- A、 腹肌紧张
- B、 腹式呼吸消失
- C、 X线片示结肠充气影
- D、 腹腔穿刺抽出不凝血
- E、 腹腔B超示腹腔积液

答案：D

15、腹部损伤最常累及的脏器是

- A、 胰腺
- B、 胃
- C、 结肠
- D、 脾
- E、 肝

答案：D

16、老年男性出现进行性排尿困难, 最常见的原因是

- A、 前列腺增生
- B、 尿道结石
- C、 尿道狭窄
- D、 膀胱结石
- E、 膀胱颈纤维增生

答案：A

17、手术人员洗手消毒完毕, 应保持

- A、 双手上举姿势
- B、 双手下垂姿势
- C、 拱手姿势
- D、 双手与肘平衡姿势
- E、 双手交叉姿势

答案：D

18、全麻术后未清醒患者, 最适宜的体位是

- A、 仰卧位
- B、 平卧位头偏向一侧
- C、 头低足高位
- D、 侧卧位
- E、 半坐卧位

答案：B

19、中心静脉压（CVP）可反映全身血容量及心功能的变化，若
CVP<0.49kpa(5cmH2O)说明（ ）

- A、 血容量不足
- B、 心功能不全
- C、 输液过多
- D、 心排量过多

E、 体液处于平衡状态

答案： A

20、 形成腹股沟管外环的是

A、 联合肌腱

B、 腹横肌

C、 腹内斜肌

D、 腹外斜肌腱

E、 皮下浅筋膜

答案： D

21、 患者男性, 55 岁, 车祸造成多发性损伤, 急救车首先要处理的情况是()

A、 开放性骨折

B、 腹部外伤后肠管脱出

C、 外伤性大出血

D、 颅脑外伤

E、 膀胱破裂

答案： C

22、 微血栓形成在

A、 微循环痉挛期

B、 微循环扩展期

C、 微循环衰竭期

D、 休克早期

E、 休克期

答案： C

23、 患者女性, 17 岁, 因车祸致腹部开放性损伤, 伴部分肠管脱出, 正确的紧急处理措施 2 是()

A、 敞开伤口, 急诊手术

B、 用消毒棉垫加压包扎

C、 迅速将肠管还纳入腹腔

D、 用凡士林纱布覆盖, 腹带包扎

E、 用等渗盐水无菌纱布覆盖

答案： E

24、 某颅脑损伤患者, 唤之睁眼, 回答问题错误, 躲避刺痛, 其 Glasgow 昏迷计分为()

A、 15 分

B、 12 分

C、 11 分

D、 8 分

E、 5 分

答案： C

25、 以下哪种蛇咬伤为神经毒()

A、 银环蛇

B、 蝮蛇

C、 竹叶青

D、 眼镜蛇

E、 五步蛇

答案： A

26、 关于尿结石的病理生理描述不正确的是()

A、 绝大多数输尿管结石发生于肾结石

B、 结石可损伤尿路黏膜导致出血

C、 结石可引起尿路梗阻

D、 结石不会导致癌变

E、 结石可引起感染

答案： D

27、 胃溃疡首选手术方式是()

A、 . 毕 I 式胃大部切除术

B、 毕 II 式胃大部切除术

C、 胃迷走神经切断术

D、 胃、空肠吻合术

E、 胃、回肠吻合术

答案： A

28、 原发性下肢静脉曲张的典型表现为()

A、 久立后有酸胀感

B、 足背部水肿、色素沉着

C、 皮肤脱屑、瘙痒

D、 游走性浅静脉炎

E、 下肢浅静脉曲张, 蜿蜒扩张、迂曲

答案： E

29、 确定乳腺肿块性质最可靠的方法是()

A、 乳房触诊

B、 乳头溢液涂片

- C、乳房钼靶 X 线检查
- D、B. 超
- E、活组织病理检查

答案：E

30、不属于周围血管征表现的是()

- A、脉压增大
- B、大动脉枪击音
- C、毛细血管搏动征
- D、水冲脉
- E、细迟脉

答案：E

31、某男, 27 岁, 右腰部撞伤 2h, 局部疼痛, 肿胀, 有淡红色血尿, 诊断为右肾挫伤, 采用非手术治疗。下列哪项能及时反映肾出血情况

- A、面色、意识
- B、腰部疼痛
- C、血压、脉搏
- D、肢体温度
- E、尿量、尿色

答案：E

32、胆道 T 型管引流期间, 胆总管远端有阻塞时的表现是

- A、胆汁量过多
- B、胆汁量过少
- C、胆汁浑浊
- D、胆汁清淡
- E、胆汁棕色、稠厚

答案：A

33、男性, 23 岁, 双下肢挤压伤, 神志尚清楚, 表情淡漠, 很口渴, 面色苍白, 皮肤湿冷, 脉搏 112 次/min, 血压 90/70mmHg。毛细管充盈迟缓。血 pH 值为 7.32。其循环系统的病理生理改变是

- A、血容量严重不足
- B、心功能不全
- C、血容量相对过多
- D、血容量不足
- E、容量血管过度收缩

答案：D

34、病人 60kg 烧伤面积 50%，其第 1 个 24h 补液总量为

- A、 2500ml
- B、 3500ml
- C、 4500ml
- D、 5500ml
- E、 6500ml

答案： E

35、食管癌术后饮食护理措施中正确的是()

- A、 术后肠蠕动恢复即可进食
- B、 鼓励患者多吃花生、豆类等
- C、 胃管拔除三周后若无不适可进普食
- D、 多吃粗粮以避免便秘
- E、 嘱患者饭后 2 小时内平卧

答案： C

36、颅脑损伤的患者现场急救措施下列正确的是

- A、 无外出血表现而有休克征象者，可不补充血容量
- B、 保持呼吸道通畅
- C、 用吗啡止痛
- D、 开放性脑损伤脑组织从伤口膨出时，尽快将膨出的脑组织回纳
- E、 昏迷患者采取斜坡卧位，有利于颅内静脉回流

答案： B

37、下面哪一项不是中心静脉压测定的适应证()

- A、 各类大中型手术，尤其是心血管，颅脑和胸部大而复杂的手术
- B、 各种类型的休克
- C、 脱水，失血和血容量不足
- D、 左心功能不全
- E、 大量静脉输血、输液

答案： D

38、多器官功能衰竭综合征并发于()

- A、 急性单纯性胆管炎
- B、 急性梗阻性化脓性胆管炎
- C、 急性胆管炎
- D、 亚急性化脓性胆管炎
- E、 慢性梗阻性胆管炎

答案： B

39、某男, 20 岁, 不慎从高处掉下, 头部着地, 伤后数小时出现头痛, 眼睑青紫, 鼻孔有血性水样液体流出, 应诊断为

- A、 颅前窝骨折
- B、 颅中窝骨折
- C、 颅后窝骨折
- D、 鼻骨骨折
- E、 面部外伤

答案: A

40、肝、脾破裂首选的辅助检查措施是

- A、 B. 超检查
- B、 CT 检查
- C、 淀粉酶测定
- D、 立位 X 线检查
- E、 MRI 检查

答案: A

41、小于 2.5cm 的结石最适宜

- A、 体外冲击波碎石
- B、 输尿管肾镜取石
- C、 输尿管肾镜碎石
- D、 经皮肾镜取石
- E、 输尿管切开取石

答案: A

42、洪某, 男, 45 岁, 餐后 1h 突然上腹部持续性刀割样剧痛 48h, 伴恶心、未吐, 全腹压痛、反跳痛, 肌紧张, 以上腹为甚, 腹式呼吸消失, 有移动性浊音。初步诊断为

- A、 胃十二指肠溃疡急性穿孔
- B、 胃出血
- C、 十二指肠出血
- D、 胃癌
- E、 胆囊炎

答案: A

43、青年男性, 体重 60kg, 双上肢及躯干 II 度烧伤, 该患者第一个 24 小时需要补的晶体和胶体总量约为()

- A、 2000ml
- B、 3000ml

C、 4000ml

D、 5000ml

E、 6000ml

答案： C

44、放置胸腔闭式引流管的患者在无异常情况下，其长玻璃管水柱上下波动的幅度约（ ）

A、 1-2cm

B、 2-4cm

C、 4-6cm

D、 6-8cm

答案： C

45、 壶腹部癌的临床特点是较早出现（ ）

A、 转移症状

B、 上腹痛及脊背痛

C、 黄疸、寒战、发热

D、 消化道症状

E、 贫血消瘦

答案： C

46、阿米巴性肝脓肿的主要感染途径是

A、 阿米巴滋养体从胆道上行进入肝

B、 阿米巴滋养体从肠穿孔进入腹腔再进入肝

C、 阿米巴滋养体从淋巴系统进入肝

D、 阿米巴滋养体从肝动脉进入肝

E、 阿米巴滋养体从结肠溃疡侵入门静脉所属分支进入肝

答案： E

47、Charcot 三联征表现是（ ）

A、 腹痛、畏寒发热、呕吐

B、 腹痛、黄疸、胆囊肿大

C、 腹痛、寒战高热、黄疸

D、 腹痛、寒战高热、低血压

E、 腹痛、黄疸、休克

答案： C

48、王某，女，25岁，排便时及排便后剧烈疼痛，粪便表现为带少量鲜血，应考虑为

A、 I 期内痔

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/306013215213011025>